

Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды Актюбинской области

За 1 полугодие 2022 год



Филиал РГП «Казгидромет» по Актюбинской области

приро
стан
лет"
монн

	СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
1	Предисловие	3
2	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
3	Состояние качества атмосферного воздуха	4
4	Состояние качества поверхностных вод	12
5	Радиационная обстановка	13
6	Химический состав атмосферных осадков	14
7	Химический состав снежного покрова 2021-2022 гг.	14
8	Состояние загрязнения почв тяжелыми металлами	15
9	Приложение 1	15
10	Приложение 2	19
11	Приложение 3	22
12	Приложение 4	23

Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых Филиалом РГП «Казгидромет» по Актюбинской области.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Актюбинской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

Оценка качества атмосферного воздуха

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Загрязнение воздушного бассейна области обусловлено в основном крупными предприятиями: АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «КазахойлАктобе», Актюбинский завод ферросплавов и ДГОК филиалы АО «ТНК «Казхром», АО «Интергаз Центральная Азия», УМГ «Актобе», АО «Актобе ТЭЦ». Из общего объема выбросов от стационарных источников доля выбросов от сжигания попутного газа на факелах составляет 11,67 тыс. тонн 97% всех выбросов от факельных установок приходится на 3 нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия: АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «КазахойлАктобе» и ТОО «Аман Мунай».

Кроме этого, одними из основных загрязнителей атмосферного воздуха Актюбинской области являются выхлопные газы от передвижных источников. В 2019 году количество автотранспортных средств по сравнению с 2018 годом уменьшилось на 7134 ед. Количество автотранспортных средств с бензиновым двигателем в 2019 году уменьшилось на 23 175 ед., на газовом топливе наоборот увеличилось – на 2 292 ед.

2. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Актобе.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Актобе проводятся на 6 постах наблюдения, в том числе на 3 постах ручного отбора проб и на 3 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 10 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3) взвешенные частицы РМ-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) сероводород; 9) формальдегид; 10) хром.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	ручной отбор проб	Авиагородок 14, район аэропорта	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, формальдегид, хром, сероводород.
2		ул. Белинский 5, район Жилгородка	
3		ул. Ломоносова 7, район ЖД вокзала	
4	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул. Рыскулова 4, район Шанхай	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород
5		ул. Есет батыра 109	
6		ул. Жанкожа батыра 89, район Курмыш	

Помимо стационарных постов наблюдений в городе Актобе действует передвижная лаборатория, с помощью которой измерение качества воздуха проводится дополнительно по 3 точкам области по 8 показателям: 1) взвешенные частицы РМ-10; 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота; 6) сероводород; 7) аммиак; 8) формальдегид.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Актобе за полугодие 2022 года.

По данным сети наблюдений г. Актобе, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **очень высокий**, он определялся значением СИ=14 (**очень высокий уровень**) и НП=4% (**повышенный уровень**) по сероводороду в районе поста №2 (ул. Рыскулова 4).

**Согласно РД 52.04.667-2005 Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.*

Максимально-разовая концентрация сероводорода составила 14,1 ПДК_{м.р.}, диоксид азота – 3,2 ПДК_{м.р.}, диоксид серы – 1,2 ПДК_{м.р.}, оксид азота – 1,8 ПДК_{м.р.}, оксид углерода – 2,7 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Превышения по среднесуточным нормативам не наблюдались.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ): (более 10 ПДК) были отмечены:

*16 апреля 2022 года по данным автоматического поста №6 (ул. Жанкожа батыра 89) было зафиксировано 3 случая ВЗ (10,4-13,5 ПДК) по сероводороду.

*17 апреля 2022 года по данным автоматического поста №2 (ул. Рыскулова, 4Г) был зафиксирован 5 случаев ВЗ (11,4-14,1 ПДК) по сероводороду.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.

Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
г. Актобе								
Взвешенные частицы (пыль)	0,0035	0,0235	0,1000	0,2000		0	0	0
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0018	0,0509	0,0190	0,1188		0	0	0
Взвешенные частицы РМ-10	0,0007	0,0110	0,0243	0,0810		0	0	0
Диоксид серы	0,0180	0,3607	0,5755	1,1510		20	0	0
Оксид углерода	0,4467	0,1489	13,5007	2,7001		2	0	0
Диоксид азота	0,0267	0,6666	0,6475	3,2375		93	0	0
Оксид азота	0,0198	0,3296	0,7235	1,8088		1	0	0
Сероводород	0,0011		0,1127	14,0875		803	78	8
Формальдегид	0,0034	0,3421	0,0200	0,4000		0	0	0

Хром	0,0003	0,2176	0,0020			0	0	0
Гамма фон	0,1217		0,1800					

Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Хромтау.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Хромтау проводятся на 1 посту наблюдения.

В целом по городу определяется до 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) диоксид азота; 6) сероводород.

В таблице 3 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 3

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	Ул. Горького 9	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Хромтау за полугодие 2022 года.

По данным сети наблюдений г. Хромтау, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **высокий**, он определялся значением СИ=9 (**высокий уровень**) и НП=2% (**повышенный** уровень) по диоксиду серы.

Максимально-разовая концентрация сероводорода составила 7,0 ПДК_{м.р.}, диоксид серы – 8,6 ПДК_{м.р.}, оксид углерода – 2,0 ПДК_{м.р.}, диоксид азота – 1,2 ПДК_{м.р.}, взвешенные вещества РМ-10 – 2,2 ПДК_{м.р.}, взвешенные вещества РМ-2,5 – 2,6 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточная концентрация диоксида азота составила 1,4 ПДК_{с.с.}, остальные загрязняющие веществ не превышали ПДК.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 4.

Таблица 4

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация	Максимальная разовая концентрация	НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}
---------	----------------------	-----------------------------------	----	--

	мг/м ³	Кратнос ть ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратнос ть ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
г. Хромтау								
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0052	0,1472	0,4216	2,6350		5	0	
Взвешенные частицы РМ-10	0,0151	0,2519	0,6461	2,1537		26	0	
Диоксид серы	0,0361	0,7216	4,3158	8,6316		176	2	
Оксид углерода	0,3312	0,1104	10,1140	2,0228		7	0	
Диоксид азота	0,0574	1,4359	0,2346	1,1730		9	0	
Сероводород	0,0001		0,0562	7,0250		54	4	

Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Кандыагаш.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Хромтау проводятся на 1 посту наблюдения.

По городу определяется 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) диоксид азота; 6) сероводород.

В таблице 5 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 5

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	Ул. Жабаяева 64А	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Кандыагаш за полугодие 2022 года.

По данным сети наблюдений г. Кандыагаш, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **высокий**, он определялся значением СИ=8 (**высокий уровень**) и НП=15% (**повышенный** уровень) по диоксиду серы.

Максимально-разовая концентрация диоксида серы – 8,4 ПДК_{м.р.}, диоксида азота – 1,6 ПДК_{м.р.}, оксид углерода – 1,3 ПДК_{м.р.}, взвешенные вещества РМ-2,5 – 2,8 ПДК_{м.р.}, взвешенные вещества РМ-10 – 2,3 ПДК_{м.р.}, сероводород – 6,3 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточная концентрация диоксида серы составила 3,1 ПДК_{с.с.}, диоксид азота – 3,4 ПДК_{с.с.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 6.

Таблица 6

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
г. Кандыгаши								
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0083	0,2371	0,4467	2,7919		15	0	0
Взвешенные частицы РМ-10	0,0220	0,3672	0,7002	2,3340		50	0	0
Диоксид серы	0,1527	3,0532	4,1950	8,3900		1080	8	0
Оксид углерода	0,6976	0,2325	6,4101	1,2820		10	0	0
Диоксид азота	0,1379	3,4475	0,3241	1,6205		231	0	0
Сероводород	0,0005		0,0506	6,3250		243	5	0

Мониторинг качества атмосферного воздуха в п.Шубарши

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории п.Шубарши проводятся на 1 посту наблюдения.

На точке наблюдения определяется 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) диоксид азота; 6) сероводород.

В таблице 7 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 7

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул.Геолог 25Д	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п.Шубарши за полугодие 2022 года.

По данным сети наблюдений п.Шубарши, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением СИ=3 (**повышенный уровень**) и НП=19 % (**повышенный уровень**) по диоксиду серы.

Максимально-разовая концентрация сероводорода составила 1,8 ПДК_{м.р.}, взвешенные вещества РМ-2,5 – 1,3 ПДК_{м.р.}, взвешенные вещества РМ-10 – 2,3 ПДК_{м.р.}, диоксид азота – 3,1 ПДК_{м.р.}, оксид углерода – 1,1 ПДК_{м.р.}, диоксида серы – 2,9 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточная концентрация диоксида азота составила 3,5 ПДК_{с.с.}, диоксид серы – 1,5 ПДК_{с.с.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 8.

Таблица 8

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
п.Шубарши								
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0096	0,2745	0,2116	1,3225		1	0	0
Взвешенные частицы РМ-10	0,0152	0,2535	0,6862	2,2873		13	0	0
Диоксид серы	0,0727	1,4547	1,4290	2,8580		400	0	0
Оксид углерода	0,0588	0,0196	5,7432	1,1486		1	0	0
Диоксид азота	0,1392	3,4793	0,6289	3,1445		475	0	0
Сероводород	0,0006		0,0140	1,7500		1	0	0

Мониторинг качества атмосферного воздуха в п.Кенкияк

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории п.Кенкияк проводятся на 1 посту наблюдения.

На точке наблюдения определяется 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) диоксид азота; 6) сероводород.

В таблице 9 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 9

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул. Алтынсарина 11 Б	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п.Кенкияк за полугодие 2022 года.

По данным сети наблюдений п.Кенкияк, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **высокий**, он определялся значением СИ=5 (**высокий уровень**) и НП=25% (**высокий уровень**) по сероводороду.

Максимально-разовая концентрация сероводорода составила 5,2 ПДК_{м.р.}, диоксид серы – 1,4 ПДК_{м.р.}, диоксид азота - 2,5 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточная концентрация диоксида серы составила 3,6 ПДК_{с.с.}, диоксид азота – 3,3 ПДК_{с.с.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 10.

Таблица 10

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
п.Кенкияк								
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0008	0,0217	0,1368	0,8550		0	0	0
Взвешенные частицы РМ-10	0,0019	0,0312	0,2002	0,6673		0	0	0
Диоксид серы	0,1789	3,5784	0,7076	1,4152		8	0	0
Оксид углерода	0,0155	0,0052	2,0170	0,4034		0	0	0
Диоксид азота	0,1311	3,2779	0,4954	2,4770		210	0	0
Сероводород	0,0047		0,0412	5,1500		1239	1	0

Результаты экспедиционных измерений качества атмосферного воздуха

Определяемые примеси	п. Кирпичный	
	Точка №1	
	мг/м ³	ПДК
Взвешенные частицы (РМ-10)	0,0950	0,3167
Сероводород	0,0169	2,1125
Формальдегид	0,0000	0,0000
Аммиак	0,0077	0,0385
Оксид азота	0,0059	0,0148
Диоксид серы	0,1750	0,3500
Диоксид азота	0,0071	0,0355
Оксид углерода	2,0975	0,4195

Максимально-разовая концентрация сероводорода на точке №1 составила 2,1 ПДК, концентрации остальных загрязняющих веществ находились в пределах допустимой нормы.

Результаты экспедиционных измерений качества атмосферного воздуха

Определяемые примеси	п. Ясный	
	Точка №1	
	мг/м ³	ПДК
Взвешенные частицы (PM-10)	0,0072	0,0240
Сероводород	0,0059	0,7375
Формальдегид	0,0035	0,0700
Аммиак	0,0042	0,0210
Оксид азота	0,0221	0,0553
Диоксид серы	0,0039	0,0078
Диоксид азота	0,0044	0,0220
Оксид углерода	2,0981	0,4196

Концентрации загрязняющих веществ находились в пределах допустимой нормы.

Определяемые примеси	Батыс-2	
	Точка №1	
	мг/м ³	ПДК
Взвешенные частицы (PM-10)	0,0044	0,0147
Сероводород	0,0052	0,6500
Формальдегид	0,0045	0,0900
Аммиак	0,0045	0,0225
Оксид азота	0,0080	0,0200
Диоксид серы	0,0065	0,0130
Диоксид азота	0,0084	0,0420
Оксид углерода	1,9587	0,3917

Концентрации загрязняющих веществ находились в пределах допустимой нормы.

Метеоусловия

В начале и конце 1 квартала область находилась под влиянием циклона, наблюдалась погода с осадками, с ветрами юго-западного и юго-восточного направления 15-24 м/с. В середине 1 квартала область находилась под влиянием антициклона, когда наблюдалась погода без осадков с ветрами восточного направления. В середине и конце 1 квартала наблюдался туман с дальностью видимости 500-200 метров, связанные с прохождением антициклонов. За 1 квартал в сумме выпало 497,3 мм осадков. В конце 1 квартала прошел сильный снег, наблюдалась метель и порывы ветра.

В начале 2 квартала область находилась под влиянием антициклона, наблюдалась погода без осадков. В середине и в конце квартала погода носила неустойчивый характер, выпало почти 3 месячных нормы осадков. Наблюдались порывы ветра 15-20 м/с. В первой половине квартала направление ветра восточное, юго-восточное, во второй половине западное, северо-западное с усилениями в отдельные дни месяца.

3. Мониторинг качества поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Актюбинской области проводились на 19 створах 12 водных объектах (11 рек: Елек, Каргалы, Эмба, Темир, Орь, Актасты, Косестек, Ойыл, Улькен Кобда, Кара Кобда, Ыргыз; 1 озеро: Шалкар).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 42 физико-химических показателей качества: *температура, взвешенные вещества, прозрачность, водородный показатель (рН), растворенный кислород, БПК₅, ХПК, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы.*

Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Актюбинской области

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 3

	Класс качества воды		Параметры	ед. изм.	концентрация
	1 полугодие 2021 г.	1 полугодие 2022 г.			
р. Елек	не нормируется (>3 класса)	4-класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,34
			Магний	мг/дм ³	39
			Фенолы*	мг/дм ³	0,0015
			Взвешенные вещества	мг/дм ³	14,72
			Хром (6+)	мг/дм ³	0,087
р. Каргалы	не нормируется (>3 класса)	4-класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,52
			Магний	мг/дм ³	46
			Фенолы*	мг/дм ³	0,0014
			Взвешенные вещества	мг/дм ³	14,76
р. Эмба	не нормируется (>3 класса)	4-класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,34
			Магний	мг/дм ³	42
			Фенолы*	мг/дм ³	0,0016
р. Темир	4-класс	5-класс	Взвешенные вещества	мг/дм ³	18,58
р. Орь		4-класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,38

	4-класс		Магний	мг/дм3	41
			Фенолы*	мг/дм3	0,0016
р. Актасты	не нормируется (>3 класса)	4-класс	Аммоний-ион	мг/дм3	1,43
			Магний	мг/дм3	43
			Фенолы*	мг/дм3	0,0014
р. Косестек	4-класс	5-класс	Взвешенные вещества	мг/дм3	17,34
р.Ойыл	4-класс	4-класс	Аммоний-ион	мг/дм3	1,51
			Магний	мг/дм3	46
			Фенолы*	мг/дм3	0,0015
р.Улькен Кобда	4-класс	4-класс	Аммоний-ион	мг/дм3	1,61
			Магний	мг/дм3	42
			Фенолы*	мг/дм3	0,0017
			Взвешенные вещества	мг/дм3	13,94
р. Кара Кобда	5- класс	4-класс	Аммоний-ион	мг/дм3	1,6
			Магний	мг/дм3	42
			Фенолы*	мг/дм3	0,0018
			Взвешенные вещества	мг/дм3	14,57
р.Ыргыз	не нормируется (>5 класса)	4-класс	Аммоний-ион	мг/дм3	1,55
			Магний	мг/дм3	34
			Фенолы*	мг/дм3	0,0018

* - вещества для данного класса не нормируется

Как видно из таблицы, в сравнении с 1 полугодием 2021 года качество поверхностных вод в реке Кара Кобда перешло с 5 класса в 4 класс, Ыргыз перешло с выше 5 класса в 4 класс - улучшилось, Елек, Каргалы, Эмба, Актасты перешло с выше 3 класса в 4 класс, Темир, Косестек перешло с 4 класса в 5 класс - ухудшилось. Качество поверхностных вод реках Орь, Ойыл, Улькен Кобда, существенно не изменилось.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах Актюбинской области являются аммоний-ион, магний, взвешанные вещества, фенолы, хром(6+).

За 1 полугодие 2022 года на территории Актюбинской области в реке Елек было обнаружено 8 случая ВЗ по хрому (+6).

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

Информация по результатам качества поверхностных вод озера Шалкар указана в Приложении 3.

4. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма-излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7 метеорологических станциях (Актобе, Караул-Кельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабулак).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы в Актюбинской области находились в пределах 0,03–0,26 мкЗв/ч (норматив–до 5 мкЗв/ч).

Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области проводилась на метеостанциях Актобе, Караул-Кельды, Шалкар путем пятисуточного отбора проб воздуха горизонтальными планшетами.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы Актюбинской области колебалась в пределах 0,8–6,6 Бк/м². Средняя величина плотности выпадений составила 1,8 Бк/м², что не превышает предельно-допустимый уровень.

5.Химический состав атмосферных осадков на территории Актюбинской области

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 6 метеостанциях (Актобе, Аяккум, Жагабулак, Мугоджарская, Новороссийское, Шалкар). Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ, в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).

В пробах осадков преобладало содержание сульфатов 26,74 %, гидрокарбонатов 34,73 %, хлоридов 9,09%, ионов кальция 13,84 %, ионов натрия 5,73 % и ионов калия 2,92 %.

Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Аяккум – 148,7 мг/л, наименьшая – 34,9 мг/л на МС Жагабулак.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась в пределах от 62,7 мкСм/см (МС Жагабулак) до 223,4 мкСм/см (МС Мугоджарская).

Кислотность выпавших осадков имеет характер слабокислой и нейтральной и находится в пределах от 5,7 (МС Мугоджарская) до 7,1 (МС Аяккум).

6.Химический состав снежного покрова 2021-2022 гг. на территории Актюбинской области

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 6 метеостанциях (Актобе, Иргиз, Жагабулак, Мугоджарская, Новороссийское, Шалкар). Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ, в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).

В пробах осадков преобладало содержание сульфатов 13,01 %, гидрокарбонатов 21,56 %, хлоридов 7,90%, ионов кальция 5,97 %, ионов натрия 4,99 % и ионов калия 1,97 %.

Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Шалкар – 94,90 мг/л, наименьшая – 57,90 мг/л на МС Актобе.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась в пределах от 27,0 мкСм/см (МС Мугоджарская) до 96,4 мкСм/см (МС Шалкар).

Кислотность выпавших осадков имеет характер слабокислой и слабощелочной и находится в пределах от 5,12 (МС Жагабулак) до 7,99 (МС Шалкар).

7. Состояние загрязнения почв тяжелыми металлами по Актюбинской области за весенний период 2022г

За весенний период в городе Актобе в пробах почв содержание цинка находилось в пределах - 1,71 - 2,49 мг/кг, меди - 0,21 - 0,39 мг/кг, хрома - 0,04 - 0,09 мг/кг, свинца - 0,04 - 0,1 мг/кг, кадмия - 0,06 - 0,12 мг/кг.

В пробах почв отобранных в Актюбинской области на территории школы № 16, ул. Тургенева, район авиагородка, район Железнодорожного вокзала, район завода АЗФ содержание цинка находилось в пределах 0,074 - 0,108 ПДК, содержание меди - 0,071 - 0,129 ПДК, хрома - 0,007 - 0,015 ПДК, свинца - 0,001 - 0,003 ПДК, кадмия - 0,12 - 0,24 ПДК.

Все определяемые тяжелые металлы находились в пределах нормы.

Приложение 1




Карта мест расположения постов наблюдения и метеостанции г. Актобе



Карта места расположения точки отбора п. Кирпичный, район СШ №18



Карта места расположения точки отбора п. Ясный, район школы-гимназии №41



Приложение 2

Водный объект и створ	Характеристика физико-химических параметров	
река Елек	Температура воды отмечена в пределах 0 – 22,3°С, водородный показатель 7,4 – 8,3, концентрация растворенного в воде кислорода 5,02 – 12,1 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,02 – 3,19 мг/дм ³ , прозрачность 16 - 21 см, запах 0 - 1 баллов.	
створ 0,3 км выше города Алга, 1 км выше шламовых прудов Актюбинского хим. завода	5 класс	Взвешенные вещества – 13,93 мг/дм ³ . Концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
створ 15 км ниже города Алга, 0,5 км ниже выхода подземных вод	4 класс	Аммоний-ион – 1,27 мг/дм ³ . Магний – 42 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0014 мг/дм ³ . Взвешенные вещества – 12,80 мг/дм ³ . Концентрация аммоний-иона, магний и взвешенных веществ превышают фоновый класс. Концентрация фенолов не превышает фоновый класс
створ 0,5 км выше города Актобе, 8,0 км выше Новороссийского моста, 11,2 км выше впадения р.Карагалы	4 класс	Аммоний-ион – 1,25 мг/дм ³ . Магний – 36 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0013 мг/дм ³ . Взвешенные вещества – 12,98 мг/дм ³ Концентрация аммоний-иона, магний, фенолов и взвешенных веществ

		превышает фоновый класс.
створ 4,5 км ниже города Актобе, 1,5 км ниже внадеше р. Дженишке 0,5 км выше выхода подземных вод	4 класс	Аммоний-ион – 1,23 мг/дм ³ . Магний – 35 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0014 мг/дм ³ . Взвешенные вещества – 13,76 мг/дм ³ . Концентрация аммоний-иона, магний, фенолов и взвешенных веществ превышает фоновый класс.
створ 20 км ниже города Актобе, 2,0 км ниже с. Георгиевка, 0,5 км ниже выхода подземных вод.	4 класс	Аммоний-ион – 1,49 мг/дм ³ . Магний – 42 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0017 мг/дм ³ . Взвешенные вещества – 15,82 мг/дм ³ . Хром(6+) – 0,111 мг/дм ³ Концентрация аммоний-иона, магний, фенолов, взвешенных веществ и хром(6+) превышает фоновый класс.
створ, 1,0 км на юго-восток п.Целинный, на левом берегу р. Елек.	4 класс	Аммоний-ион – 1,43 мг/дм ³ . Магний – 36 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0017 мг/дм ³ . Взвешенные вещества – 16,34 мг/дм ³ . Хром(6+) – 0,062 мг/дм ³ Концентрация аммоний-иона, магний, фенолов, взвешенных веществ и хром(6+) превышает фоновый класс.
река Каргалы	Температура воды отмечена 0 - 19°C, водородный показатель 8 – 8,15, концентрация растворенного в воде кислорода 6,64-11,57 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,14 – 3,15 мг/дм ³ , запах – 0 балл.	
створ п. Каргалинский, в западной части поселка в 1 км ниже впадения правого притока р. Бутак:	4 класс	Аммоний-ион – 1,52 мг/дм ³ . Магний – 46 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0014 мг/дм ³ . Взвешенные вещества – 14,76 мг/дм ³ . Концентрация аммоний-иона, магний, фенолов и взвешенных веществ превышают фоновый класс.
река Эмба	Температура воды отмечена в пределах 0 – 21°C, водородный показатель 7,93 – 8,1, концентрация растворенного в воде кислорода 7,33 – 12,03 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,02 – 2,33 мг/дм ³ , запах – 0 балл.	
створ п. Жагабулак, 1,0 км на северо-запад отп. Жагабулак	4 класс	Аммоний-ион – 1,34 мг/дм ³ . Магний – 41 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0017 мг/дм ³ . Взвешенные вещества – 15,96 мг/дм ³ Концентрация аммоний-иона, магний и взвешенных веществ превышает фоновый класс. Фактическая концентрация фенолов не превышает фоновый класс
створ п. Сага, 1,0 км к юго-западу от поселка	4 класс	Аммоний-ион – 1,34 мг/дм ³ . Магний – 42 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0016 мг/дм ³ . Концентрация аммоний-иона и магний превышают фоновый класс.

		Концентрация фенолов не превышает фоновый класс
река Темир	Температура воды отмечена в пределах 0 – 21,3°C, водородный показатель 7,96 – 8,15, концентрация растворенного в воде кислорода 6,67 – 11,19 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,1 – 2,29 мг/дм ³ , запах – 0 баллов во всех створах.	
створ с. Покровское, вс. Покровское, в 400 м ниже впадения левого притока р. Чилисай	5 класс	Взвешенные вещества – 19,14 мг/дм ³ . Концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
створ с. Ленинское, в 9 км ниже селения, в 2 км ниже устья левобережного притока р. Кульден-Темир	5 класс	Взвешенные вещества – 18,02 мг/дм ³ . Концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
река Орь	Температура воды 0 - 17°C, водородный показатель 8 – 8,05, концентрация растворенного в воде кислорода 7,95 – 11,81 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,26 – 2,78 мг/дм ³ , прозрачность 16 – 21 см, запах 0 балл.	
створ с. Бугетсай, 0,3 км ниже села, 0,2 км ниже впадения р. Богетсай	4 класс	Аммоний-ион – 1,38 мг/дм ³ . Магний – 41 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0016 мг/дм ³ . Концентрация аммоний-иона и магния превышают фоновый класс. Концентрация фенолов не превышает фоновый класс
река Косестек , п. Кос-Естек, в юго-западной части села примерно в 1 км выше устья левого притока без названия, в 2 км ниже слияния рек Тарангул и Айтпайка	Температура воды отмечена в пределах 4,3 - 15,1°C, водородный показатель 7,95 - 8,05, концентрация растворенного в воде кислорода 8,74 – 11,79 мг/дм ³ , БПК ₅ 2,05 – 3,33 мг/дм ³ , запах – 0 балл	
	5 класс	Взвешенные вещества – 17,34 мг/дм ³ . Концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
река Актасты , п. Белогорка, на северо-восточной окраине поселка, в 9 км ниже слияния притоков Тересбутак и Теренсай, составляющих Актасты	Температура воды отмечена в пределах 3,9 – 15,1°C, водородный показатель 8 – 8,09, концентрация растворенного в воде кислорода 8,8 – 12,51 мг/дм ³ , БПК ₅ 2,24 – 2,34 мг/дм ³ , запах – 0 балл.	
	4 класс	Аммоний-ион – 1,43 мг/дм ³ . Магний – 43 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0014 мг/дм ³ . Концентрация магния превышает фоновый класс. Концентрация аммоний-иона и фенолов не превышает фоновый класс
река Ойыл п. Уил, на северо-восточной окраине поселка в 92 м выше автодорожного мост	Температура воды отмечена в пределах 5,3 - 14,2°C, водородный показатель 8 – 8,1, концентрация растворенного в воде кислорода 8,39 – 9,42 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,64 – 2,24 мг/дм ³ , запах – 0 балл.	

	4 класс	Аммоний-ион – 1,51 мг/дм ³ . Магний – 46 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0015 мг/дм ³ . Концентрация аммоний-иона, магний и фенолов превышает фоновый класс.
река Улькен Кобда, п. Кобда, 1 км к юго-востоку от окраины с. Новоалексеевка, в 400 м ниже железобетонного автодорожного моста	Температура воды отмечена в пределах 5,8 – 13,9°C, водородный показатель 8, концентрация растворенного в воде кислорода 7,31 – 11,17 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,2 – 2,81 мг/дм ³ , прозрачность 16 - 20 см, запах – 0 балл	
	4 класс	Аммоний-ион – 1,61 мг/дм ³ . Магний – 42 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0017 мг/дм ³ . Взвешенные вещества – 13,94 мг/дм ³ . Концентрация аммоний-иона, магний, фенолов и взвешенных веществ превышает фоновый класс.
река Кара Кобда, п. Альпасай, 360 м к востоку от поселка Альпасай и в 18 км от слияния с рекой Сары - Хобда	Температура воды отмечена в пределах 6 – 13,5°C, водородный показатель 7,95 – 8,05, концентрация растворенного в воде кислорода 7,89 – 8,67 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,28 – 1,78 мг/дм ³ , запах – 0 балл	
	4 класс	Аммоний-ион – 1,4 мг/дм ³ . Магний – 42 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0018 мг/дм ³ . Взвешенные вещества – 14,57 мг/дм ³ . Концентрация аммоний-иона, магний, фенолов и взвешенных веществ превышает фоновый класс.
река Ыргыз с. Шенбертал, в 8 км от селения и в 1,2 км от железобетонного моста	Температура воды отмечена в пределах 12 - 15,3 °C, водородный показатель 8 - 8,02, концентрация растворенного в воде кислорода 7,43 – 7,56 мг/дм ³ , БПК ₅ 2,08 - 2,69 мг/дм ³ , запах – 0 балл	
	4 класс	Аммоний-ион – 1,55 мг/дм ³ . Магний – 34 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0018 мг/дм ³ . Концентрация аммоний-иона, магний и фенолов превышают фоновый класс.

* - вещества для данного класса не нормируются

Приложение 3

Результаты качества поверхностных вод озер на территории Актюбинской области

	Наименование ингредиентов	Единицы измерения	1 полугодие 2022
			озеро Шалкар
1	Визуальные наблюдения		
2	Температура	°C	19,3
3	Водородный показатель		8,085
4	Растворенный кислород	мг/дм ³	8,46

5	Запах воды	балл	0,0
6	БПК5	мг/дм3	1,8
7	ХПК	мг/дм3	20,605
8	Взвешенные вещества	мг/дм3	12,555
9	Гидрокарбонаты	мг/дм3	302,5
10	Жесткость	мг/дм3	4,91
11	Минерализация	мг/дм3	673,5
12	Натрий + калий	мг/дм3	116,5
13	Сухой остаток	мг/дм3	650
14	Кальций	мг/дм3	51
15	Магний	мг/дм3	28,5
16	Сульфаты	мг/дм3	70,5
17	Хлориды	мг/дм3	104,5
18	Фосфат	мг/дм3	0,01
19	Фосфор общий	мг/дм3	0,021
20	Азот нитритный	мг/дм3	0,006
21	Азот нитратный	мг/дм3	0,009
22	Железо общее	мг/дм3	0,007
23	Аммоний солевой	мг/дм3	1,015
24	Свинец	мг/дм3	0,0055
25	Медь	мг/дм3	0,0025
26	Цинк	мг/дм3	0,0035
27	АП АВ /СП АВ	мг/дм3	0,004
28	Фенолы	мг/дм3	0,002
29	Нефтепродукты	мг/дм3	0,003

Приложение 4

Справочный раздел

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м3		Класс опасности
	максимально разовая	средне-суточная	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м ³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	
Хлористый водород	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2

Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фтористый водород	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (СанПин №168 от 28 февраля 2015 года)

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение атмосферного воздуха	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, %	0-1 0
II	Повышенное	СИ НП, %	2-4 1-19
III	Высокое	СИ НП, %	5-10 20-49
IV	Очень высокое	СИ НП, %	>10 >50

РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

Категория (вид) водопользования	Назначение/тип очистки	Классы водопользования				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Рыбохозяйственное водопользование	Лососевые	+	+	-	-	-
	Карповые	+	+	-	-	-
Хозяйственно-питьевое водопользование	Простая водоподготовка	+	+	-	-	-
	Обычная водоподготовка	+	+	+	-	-
	Интенсивная водоподготовка	+	+	+	+	-
Рекреационное водопользование (культурно-бытовое)		+	+	+	-	-
Орошение	Без подготовки	+	+	+	+	-
	Отстаивание в картах	+	+	+	+	+

Промышленность:						
технологические цели, процессы охлаждения		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
добыча полезных ископаемых		+	+	+	+	+
транспорт		+	+	+	+	+

Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №151 от 09.11.2016)

Норматив радиационной безопасности*

Нормируемые величины	Пределы доз
Эффективная доза	Население
	1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год

*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву

Наименование вещества	Предельно-допустимая концентрация (далее-ПДК) мг/кг в почве
Свинец (валовая форма)	32,0
Медь (подвижная форма)	3,0
Медь (валовая форма)	33
Хром (подвижная форма)	6,0
Хром ⁺⁶	0,05
Марганец (валовая форма)	1500
Никель (подвижная форма)	4,0
Цинк (подвижная форма)	23,0
Мышьяк (валовая форма)	2,0

*Совместный приказ Министерства здравоохранения РК от 30.01.2004 г. №99 и Министерства охраны окружающей среды РК от 27.01.2004 г. №21-п

ФИЛИАЛ РГП «КАЗГИДРОМЕТ» ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДРЕС:

ГОРОД АКТОБЕ
УЛ. АВИАГОРОДОК 14 В
ТЕЛ. 8-(7132)-22-85-72.

E MAIL:HIMLABACGM@MAIL.RU