

Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды Актюбинской области

1 полугодие 2023 год



природы
стандартов
ет"
монито

| | СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
|-----------|---|-------------|
| 1 | Предисловие | 3 |
| 2 | Основные источники загрязнения атмосферного воздуха | 4 |
| 3 | Состояние качества атмосферного воздуха | 4 |
| 4 | Состояние качества поверхностных вод | 11 |
| 5 | Радиационная обстановка | 13 |
| 6 | Химический состав атмосферных осадков | 13 |
| 7 | Состояние загрязнения почв тяжелыми металлами | 14 |
| 8 | Химический состав снежного покрова | 14 |
| 9 | Приложение 1 | 15 |
| 10 | Приложение 2 | 18 |
| 11 | Приложение 3 | 21 |
| 12 | Приложение 4 | 22 |

Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых Филиалом РГП «Казгидромет» по Актюбинской области.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Актюбинской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

Оценка качества атмосферного воздуха

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Загрязнение воздушного бассейна области обусловлено в основном крупными предприятиями: АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «КазахойлАктобе», Актюбинский завод ферросплавов и ДГОК филиалы АО «ТНК «Казхром», АО «Интергаз Центральная Азия», УМГ «Актобе», АО «Актобе ТЭЦ». Из общего объема выбросов от стационарных источников доля выбросов от сжигания попутного газа на факелях составляет 11,67 тыс.тонн 97% всех выбросов от факельных установок приходится на 3 нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия: АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «КазахойлАктобе» и ТОО «Аман Мунай».

Кроме этого, одними из основных загрязнителей атмосферного воздуха Актюбинской области являются выхлопные газы от передвижных источников.

2. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Актобе.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Актобе проводятся на 6 постах наблюдения, в том числе на 3 постах ручного отбора проб и на 3 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 10 показателей: 1) *взвешенные частицы (пыль);* 2) *взвешенные частицы PM-2,5;* 3) *взвешенные частицы PM-10;* 4) *диоксид серы;* 5) *оксид углерода;* 6) *диоксид азота;* 7) *оксид азота;* 8) *сероводород;* 9) *формальдегид;* 10) *хром.*

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

| № | Отбор проб | Адрес поста | Определяемые примеси |
|---|--|-------------------------------------|--|
| 1 | ручной отбор проб | Авиагородок 14, район аэропорта | взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, формальдегид, хром, сероводород. |
| 2 | | ул. Белинский 5, район Жилгородка | |
| 3 | | ул. Ломоносова 7, район ЖД вокзала | |
| 4 | в непрерывном режиме – каждые 20 минут | ул. Рыскулова 4, район Шанхай | взвешенные частицы PM-2,5, взвешенные частицы PM-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород |
| 5 | | ул. Есет батыра 109 | |
| 6 | | ул. Жанкожа батыра 89, район Курмыш | |

Помимо стационарных постов наблюдений в городе Актобе действует передвижная лаборатория, с помощью которой измерение качества воздуха проводится дополнительно по 3 точкам области по 8 показателям: 1) *взвешенные*

частицы РМ-10; 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота; 6) сероводород; 7) аммиак; 8) формальдегид.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Актобе за 1 полугодие 2023 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался по **как высокий**, он определялся значением СИ=6,9 (высокий уровень) и НП=3% (повышенный уровень) по сероводороду в районе поста №3.

*Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

В загрязнение атмосферного воздуха основной вклад вносит сероводород (количество превышений ПДК: 227 случаев); диоксид азота (количество превышений ПДК: 339 случаев); оксид азота (количество превышений ПДК: 337 случаев); оксид углерода (количество превышений ПДК: 13 случаев).

Максимально-разовая концентрация сероводорода составила 6,9 ПДК_{м.р.}, диоксида азота 4,0 ПДК_{м.р.}, оксида азота 4,7 ПДК_{м.р.}, оксида углерода 2,4 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи высокого загрязнения (В3) и экстремально высокого загрязнения (ЭВ3) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.

Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

| Примесь | Средняя концентрация | | Максимальная разовая концентрация | | НП | Число случаев превышения ПДК _{м.р.} | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------|--|------|--------|
| | мг/м ³ | Кратность ПДК _{с.с.} | мг/м ³ | Кратность ПДК _{м.р.} | | % | >ПДК | >5 ПДК |
| г. Актобе | | | | | | | | |
| Взвешенные частицы (пыль) | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,2 | 0 | | | |
| Взвешенные частицы РМ-2,5 | 0,002 | 0,04 | 0,004 | 0,03 | 0 | | | |
| Взвешенные частицы РМ-10 | 0,001 | 0,01 | 0,005 | 0,02 | 0 | | | |
| Диоксид серы | 0,012 | 0,23 | 0,34 | 0,7 | 0 | | | |
| Оксид углерода | 0,52 | 0,17 | 11,99 | 2,4 | 0,03 | 13 | | |
| Диоксид азота | 0,03 | 0,74 | 0,80 | 4,0 | 1,0 | 339 | | |
| Оксид азота | 0,039 | 0,65 | 1,90 | 4,7 | 1,0 | 337 | | |
| Сероводород | 0,001 | | 0,06 | 6,9 | 0,6 | 227 | 2 | |
| Формальдегид | 0,004 | 0,37 | 0,01 | 0,14 | 0 | | | |
| Хром | 0,0004 | 0,25 | 0,001 | | 0 | | | |

Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Хромтау.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Хромтау проводятся на 1 посту наблюдения.

В целом по городу определяется до 6 показателей: 1) *взвешенные частицы PM-2,5*; 2) *взвешенные частицы PM-10*; 3) *диоксид серы*; 4) *оксид углерода*; 5) *диоксид азота*; 6) *сероводород*.

В таблице 3 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 3
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

| № | Отбор проб | Адрес поста | Определяемые примеси |
|---|--|----------------|---|
| | в непрерывном режиме – каждые 20 минут | Ул. Горького 9 | взвешенные частицы PM-2,5, взвешенные частицы PM-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород |

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Хромтау за 1 полугодие 2023 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха города Хромтау оценивался **как высокий**, он определялся значением СИ=4,6 (повышенный уровень) и НП=24% (высокий уровень).

*Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

В загрязнение атмосферного воздуха основной вклад вносит диоксид серы (количество превышений ПДК: 381 случаев); оксид углерода (количество превышений ПДК: 10 случаев); диоксид азота (количество превышений ПДК: 8 случаев); сероводород (количество превышений ПДК: 484 случаев).

Максимально-разовая концентрация диоксида серы – 4,4 ПДК_{м.р.}, оксид углерода – 1,9 ПДК_{м.р.}, сероводород – 4,6 ПДК_{м.р.}, диоксид азота – 1,3 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточная концентрация диоксида серы – 1,0 ПДК_{с.с.}

Случаи высокого загрязнения (В3) и экстремально высокого загрязнения (ЭВ3) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 4.

Таблица 4
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

| Примесь | Средняя концентрация | | Максимальная разовая концентрация | | НП | Число случаев превышения ПДК _{м.р.} | | |
|---------|----------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|----|--|------|--------|
| | мг/м ³ | Кратность | мг/м ³ | Кратность | | % | >ПДК | >5 ПДК |
| | | | | | | | | |

| | | ПДК_{с.с.} | | ПДК_{м.р.} | | | в том числе |
|-------------------|-------|---------------------------|-------|---------------------------|------|-----|--------------------|
| г. Хромтау | | | | | | | |
| Диоксид серы | 0,051 | 1,0 | 2,18 | 4,4 | 3,1 | 381 | 0 0 |
| Оксид углерода | 0,06 | 0,02 | 9,796 | 1,9 | 0,0 | 10 | 0 0 |
| Диоксид азота | 0,017 | 0,4 | 0,27 | 1,3 | 0,06 | 8 | 0 0 |
| Сероводород | 0,002 | | 0,04 | 4,6 | 3,8 | 484 | 0 0 |

Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Кандыагаш.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Кандыагаш проводятся на 1 посту наблюдения.

По городу определяется 6 показателей: 1) *взвешенные частицы PM-2,5;* 2) *взвешенные частицы PM-10;* 3) *диоксид серы;* 4) *оксид углерода;* 5) *диоксид азота;* 6) *сероводород.*

В таблице 5 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 5

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

| № | Отбор проб | Адрес поста | Определяемые примеси |
|----------|--|--------------------|---|
| | в непрерывном режиме – каждые 20 минут | Ул. Жабаева 64А | взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород |

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Кандыагаш за 1 полугодие 2023 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **высокий**, он определялся значением СИ=6,0 (высокий уровень) и НП=9% (повышенный уровень) по диоксиду серы.

*Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Максимально-разовая концентрация диоксида серы – 4,3 ПДК_{м.р.}, диоксид азота – 1,8 ПДК_{м.р.}, сероводород – 6,0 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточная концентрация диоксида азота -3,5 ПДК_{с.с.}

Случаи высокого загрязнения (В3) и экстремально высокого загрязнения (ЭВ3) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 6.

Таблица 6

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

| Примесь | Средняя концентрация | Максимальная разовая | НП | Число случаев превышения |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|

| | | | концентрация | | % | ПДК _{м.р.} | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----|---------------------|--------|---------|--|
| | мг/м ³ | Кратность ПДК _{с.с.} | мг/м ³ | Кратность ПДК _{м.р.} | | >ПДК | >5 ПДК | >10 ПДК | |
| | | | | | | в том числе | | | |
| г. Кандыагаш | | | | | | | | | |
| Диоксид серы | 0,02 | 0,33 | 2,17 | 4,3 | 0,8 | 105 | 0 | 0 | |
| Оксид углерода | 0,04 | 0,01 | 4,34 | 0,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
| Диоксид азота | 0,14 | 3,5 | 0,36 | 1,8 | 1,8 | 232 | 0 | 0 | |
| Сероводород | 0,002 | | 0,05 | 6,0 | 2,8 | 360 | 6 | 0 | |

Мониторинг качества атмосферного воздуха в п.Шубарши

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории п.Шубарши проводятся на 1 посту наблюдения.

На точке наблюдения определяется 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) диоксид азота; 6) сероводород.

В таблице 7 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 7

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

| № | Отбор проб | Адрес поста | Определяемые примеси |
|---|--|---------------|---|
| | в непрерывном режиме – каждые 20 минут | ул.Геолог 25Д | взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород |

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п.Шубарши за 1 полугодие 2023 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **высокий**, он определялся значением СИ=4,0 (повышенный уровень) и НП=27% (высокий уровень) по оксиду углерода.

*Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Максимально-разовая концентрация диоксида азота – 1,5 ПДК_{м.р.}, оксид углерода – 4,0 ПДК_{м.р.}, сероводород – 2,1 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточная концентрация диоксида азота составила 3,4 ПДК_{с.с.}.

Случаи высокого загрязнения (В3) и экстремально высокого загрязнения (ЭВ3) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 8.

Таблица 8

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

| Примесь | Средняя концентрация | | Максимальная разовая концентрация | | НП | Число случаев превышения ПДК _{м.р.} | | |
|----------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----|--|------|--------|
| | мг/м ³ | Кратность ПДК _{с.с.} | мг/м ³ | Кратность ПДК _{м.р.} | | % | >ПДК | >5 ПДК |
| п.Шубарши | | | | | | | | |
| Диоксид серы | 0,002 | 0,04 | 0,17 | 0,3 | | | 0 | 0 |
| Оксид углерода | 0,49 | 0,16 | 19,78 | 4,0 | 0,1 | 12 | 0 | 0 |
| Диоксид азота | 0,14 | 3,44 | 0,30 | 1,5 | 9,1 | 1156 | 0 | 0 |
| Сероводород | 0,002 | | 0,02 | 2,1 | 0,3 | 43 | 0 | 0 |

Мониторинг качества атмосферного воздуха в п.Кенкияк

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории п.Кенкияк проводятся на 1 посту наблюдения.

Наточке наблюдения определяется 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) диоксид азота; 6) сероводород.

В таблице 9 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 9

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

| № | Отбор проб | Адрес поста | Определяемые примеси |
|---|--|----------------------|---|
| | в непрерывном режиме – каждые 20 минут | ул. Алтынсарина 11 Б | взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород |

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п.Кенкияк за 1 полугодие 2023 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **высокий**, он определялся значением СИ=2,8 (повышенный уровень) и НП=35% (высокий уровень) по диоксиду азота.

*Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Максимально-разовая концентрация диоксида азота составила 2,2 ПДК_{м.р.}, сероводорода – 2,8 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточная концентрация диоксида азота – 4,5 ПДК_{с.с.}.

Случаи высокого загрязнения (В3) и экстремально высокого загрязнения (ЭВ3) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 10.

Таблица 10

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

| Примесь | Средняя концентрация | | Максимальная разовая концентрация | | НП % | Число случаев превышения ПДК _{м.р.} | | |
|-------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------|--|--------|---------|
| | мг/м ³ | Кратность ПДК _{с.с.} | мг/м ³ | Кратность ПДК _{м.р.} | | >ПДК | >5 ПДК | >10 ПДК |
| п. Кенкияк | | | | | | | | |
| Диоксид серы | 0,010 | 0,195 | 0,07 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оксид углерода | 0,02 | 0,006 | 2,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Диоксид азота | 0,18 | 4,495 | 0,45 | 21,7 | 21.8 | 2780 | 0 | 0 |
| Сероводород | 0,004 | | 0,02 | 2,1 | 1.10 | 269 | 0 | 0 |

Результаты экспедиционных измерений качества атмосферного воздуха

| Определяемые примеси | Батыс-2 | |
|----------------------------|-------------------|-------|
| | Точка №1 | |
| | мг/м ³ | ПДК |
| Взвешенные частицы (PM-10) | 0,008 | 0,027 |
| Сероводород | 0,005 | 0,625 |
| Формальдегид | 0,017 | 0,348 |
| Оксид азота | 0,009 | 0,022 |
| Диоксид серы | 0,009 | 0,018 |
| Диоксид азота | 0,075 | 0,374 |
| Оксид углерода | 1,934 | 0,387 |


| Определяемые примеси | п.Кирпичный | |
|----------------------------|-------------------|--------|
| | Точка №1 | |
| | мг/м ³ | ПДК |
| Взвешенные частицы (PM-10) | 0,0016 | 0,0053 |
| Сероводород | 0,0027 | 0,3375 |
| Формальдегид | 0,0095 | 0,1900 |
| Оксид азота | 0,0041 | 0,0103 |
| Диоксид серы | 0,0035 | 0,0070 |
| Диоксид азота | 0,0055 | 0,0275 |
| Оксид углерода | 2,0514 | 0,4103 |

| Определяемые примеси | 41 разъезд | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | Точка №1 | |
| | мг/м ³ | мг/м ³ |
| Взвешенные частицы (PM-10) | 0,0031 | 0,0103 |

| | | |
|----------------|--------|--------|
| Сероводород | 0,0048 | 0,6000 |
| Формальдегид | 0,0060 | 0,1200 |
| Оксид азота | 0,0048 | 0,0120 |
| Диоксид серы | 0,0045 | 0,0090 |
| Диоксид азота | 0,0053 | 0,0265 |
| Оксид углерода | 2,1239 | 0,4248 |

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха за 1 полугодие



Как видно из графика, за 1 полугодие в 2019 и в 2021-2022 гг. уровень загрязнения оценивался как очень высокий уровень, в 2020 и 2023 году высокий уровень загрязнения. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит сероводород.

Метеоусловия

Большую часть полугодия область находилась под влиянием антициклонов, наблюдалась погода без осадков. С прохождением атмосферных фронтов временами наблюдались осадки. В отдельные дни наблюдалось усиление ветра 15-19 м/с.

3. Мониторинг качества поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Актюбинской области проводились на 19 створах 12 водных объектов (реки Елек, Каргалы, Эмба,

Темир, Орь, Актасты, Косестек, Ойыл, Ульген Кобда, Кара Кобда, Ыргыз; 1озеро: Шалкар).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 42 физико-химических показателей качества: *температура, взвешенные вещества, прозрачность, водородный показатель (рН), растворенный кислород, БПК₅, ХПК, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы.*

Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Актюбинской области

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 3

| | Класс качества воды | | Параметры | ед. изм. | концентрация |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|
| | 1 полугодие 2022 г. | 1 полугодие 2023 г. | | | |
| р. Елек | 4 класс | 4 класс | Аммоний-ион | мг/дм ³ | 1,184 |
| | | | Фенолы* | мг/дм ³ | 0,0016 |
| | | | Хром (6+)* | мг/дм ³ | 0,0826 |
| р. Каргалы | 4 класс | 4 класс | Аммоний-ион | мг/дм ³ | 1,139 |
| | | | Фенолы* | мг/дм ³ | 0,0015 |
| р. Эмба | 4 класс | 4 класс | Аммоний-ион | мг/дм ³ | 1,37 |
| | | | Фенолы* | мг/дм ³ | 0,0017 |
| р. Темир | 5 класс | 4 класс | Аммоний-ион | мг/дм ³ | 1,27 |
| | | | Фенолы* | мг/дм ³ | 0,0018 |
| р. Орь | 4 класс | 4 класс | Аммоний-ион | мг/дм ³ | 1,296 |
| | | | Фенолы* | мг/дм ³ | 0,0019 |
| р. Актасты | 4 класс | 4 класс | Аммоний-ион | мг/дм ³ | 1,337 |
| | | | Фенолы* | мг/дм ³ | 0,0018 |
| р. Косестек | 5 класс | 4 класс | Аммоний-ион | мг/дм ³ | 1,257 |
| | | | Магний | мг/дм ³ | 30,333 |
| | | | Фенолы* | мг/дм ³ | 0,0016 |
| р. Ойыл | 4 класс | 4 класс | Аммоний-ион | мг/дм ³ | 1,167 |
| | | | Фенолы* | мг/дм ³ | 0,0019 |
| р. Ульген Кобда | 4 класс | 4 класс | Аммоний-ион | мг/дм ³ | 1,47 |
| | | | Фенолы* | мг/дм ³ | 0,0018 |
| р. Кара Кобда | 4 класс | 4 класс | Аммоний-ион | мг/дм ³ | 1,43 |
| | | | Фенолы* | мг/дм ³ | 0,0017 |
| р. Ыргыз | 4 класс | 4 класс | Аммоний-ион | мг/дм ³ | 1,203 |
| | | | Фенолы* | мг/дм ³ | 0,0017 |

* - вещества для данного класса не нормируются

Как видно из таблицы, в сравнении с 1 полугодием 2022 года качество поверхностных вод в реках Темир, Косестек перешло с 5 класса в 4 класс – улучшилось.

Качество поверхностных вод в реках Елек, Каргалы, Эмба, Орь, Актасты, Ойыл, Ульген Кобда, Кара Кобда, Ыргыз существенно не изменилось,

Основными загрязняющими веществами в водных объектах Актюбинской области являются аммоний-ион, магний, фенолы, хром(6+).

За 1 полугодие 2023 года на территории Актюбинской области в реке Елек обнаружено 8 случая ВЗ .

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

4. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма-излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7 метеорологических станциях (Актобе, Караул-Кельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабулак).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы в Актюбинской области находились в пределах 0,04–0,22 мкЗв/ч (норматив—до 5 мкЗв/ч). В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,11 мкЗв/ч.

Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области проводилась на метеостанциях Актобе, Караул-Кельды, Шалкар путем пятисуточного отбора проб воздуха горизонтальными планшетами.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы Актюбинской области колебалась в пределах 1,1–2,7 Бк/м². Средняя величина плотности выпадений составила 1,8 Бк/м², что не превышает предельно-допустимый уровень.

5. Химический состав атмосферных осадков на территории Актюбинской области

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 6 метеостанциях (Актобе, Аяккум, Жагабулак, Мугоджарская, Новороссийское, Шалкар). Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ, в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).

В пробах осадков преобладало содержание сульфатов 29%, гидрокарбонатов 29%, хлоридов 13%, ионов кальция 13%, ионов натрия 7% ионов магния 3% и ионов калия 3%.

Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Новороссийское – 125,96 мг/л, наименьшая – 32,25 мг/л на МС Жагабулак.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась в пределах от 55,68 мкСм/см (МС Жагабулак) до 222,05 мкСм/см (МС Новороссийское).

Кислотность выпавших осадков находится в пределах от 5,9 (МС Жагабулак) до 6,93 (МС Аяккум).

6. Состояние загрязнения почв тяжелыми металлами по Актюбинской области за весенний период 2023г

За весенний период в городе Актобе в пробах почв содержание цинка находилось в пределах - 1,8 - 2,2 мг/кг, меди - 0,22 - 0,34 мг/кг, хрома - 0,06 - 0,1 мг/кг, свинца - 0,07 - 0,12 мг/кг, кадмия - 0,09 - 0,12 мг/кг.

В пробах почв отобранных в Актюбинской области на территории школы № 16, ул. Тургенева, район авиагородка, район Железнодорожного вокзала, район завода АЗФ содержание цинка находилось в пределах 0,078 - 0,096 ПДК, содержание меди - 0,073 - 0,113 ПДК, хрома - 0,010 - 0,017 ПДК, свинца - 0,002 - 0,004 ПДК, кадмия - 0,174 - 0,240 ПДК.

Все определяемые тяжелые металлы находились в пределах нормы.

7. Химический состав снежного покрова 2022-2023 гг. на территории Актюбинской области

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 6 метеостанциях (Актобе, Иргиз, Жагабулак, Мугоджарская, Новороссийское, Шалкар). Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ, в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).


В пробах осадков преобладало содержание сульфатов 26,92 %, гидрокарбонатов 19,03 %, хлоридов 15,5%, ионов кальция 12,94 %, ионов натрия 6,91 % и ионов калия 3,28 %.

Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Новороссийское – 60,28 мг/л, наименьшая – 23,69 мг/л на МС Актобе.


Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась в пределах от 43,1 мкСм/см (МС Новороссийское) до 100,9 мкСм/см (МС Мугоджарская).

Кислотность выпавших осадков имеет характер слабокислой и нейтральной среды и находится в пределах от 5,66 (МС Жагабулак) до 6,99 (МС Шалкар).

Приложение 1



Карта мест расположения постов наблюдения и метеостанции г. Актобе




Карта места расположения точки отбора п. Кирпичный, район СШ №18




Карта места расположения точки отбора п. Ясный, район школы-гимназии №41




Карта места расположения точки отбора на Батыс-2, район СШ №64




Карта места расположения поста наблюдения г. Хромтау



Карта места расположения поста наблюдения г. Кандыагаш



Карта места расположения поста наблюдения п. Шубарши



Карта места расположения поста наблюдения п. Кенкияк

Приложение 2

Информация о качестве поверхностных вод Актюбинской области по створам

| Водный объект и створ | Характеристика физико-химических параметров |
|------------------------------|--|
| река Елек | Температура воды отмечена в пределах 0 – 24°C, водородный показатель 7,63 – 8,5, концентрация растворенного в воде |

| | | |
|--|---------|--|
| | | кислорода 3,84 – 14,68 мг/дм ³ , БПК5 0,84 – 4,77 мг/дм ³ , прозрачность 17 - 21 см, запах 0 баллов. |
| 0,3 км выше города Алга, 1 км выше шламовых прудов Актюбинского хим. завода | 4 класс | Аммоний-ион – 1,121 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0015 мг/дм ³ . Концентрация фенолов превышает фоновый класс. Концентрация аммоний-иона не превышает фоновый класс. |
| 15 км ниже города Алга, 0,5 км ниже выхода подземных вод | 4 класс | Аммоний-ион – 1,191 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0015 мг/дм ³ . Концентрация аммоний-иона и фенолов превышают фоновый класс. |
| 0,5 км выше города Актобе, 8,0 км выше Новороссийского моста, 11,2 км выше впадения р.Карагалы | 4 класс | Аммоний-ион – 1,087 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0016 мг/дм ³ . Концентрация аммоний-иона и фенолов превышают фоновый класс. |
| 4,5 км ниже города Актобе, 1,5 км ниже впадение р. Дженишке 0,5 км выше выхода подземных вод | 4 класс | Аммоний-ион – 1,19 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0014 мг/дм ³ . Концентрация аммоний-иона и фенолов превышают фоновый класс. |
| 20 км ниже города Актобе, 2,0 км ниже с. Георгиевка, 0,5 км ниже выхода подземных вод. | 4 класс | Аммоний-ион – 1,25 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0018 мг/дм ³ . Хром (6+)* – 0,0999 мг/дм ³ . Концентрация аммоний-иона, фенолов и хром(6+) превышают фоновый класс. |
| 1,0 км на юго-восток п.Целинный, на левом берегу р. Елек. | 4 класс | Аммоний-ион – 1,261 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0018 мг/дм ³ . Хром (6+)* – 0,0653 мг/дм ³ . Концентрация аммоний-иона, фенолов и хром(6+) превышают фоновый класс. |
| река Каргалы | | Температура воды отмечена 0 - 22°C, водородный показатель 7,58 – 8,07, концентрация растворенного в воде кислорода 6,56 – 10,92 мг/дм ³ , БПК5 1 - 4,47 мг/дм ³ , запах – 0 балл. |
| п. Каргалинский, в западной части поселка в 1 км ниже впадения правого притока р. Бутак: | 4 класс | Аммоний-ион – 1,139 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0015 мг/дм ³ . Концентрация фенолов превышает фоновый класс. Концентрация аммоний-иона не превышает фоновый класс. |
| река Эмба | | Температура воды отмечена в пределах 0 – 25°C, водородный показатель 7,86 – 8,16, концентрация растворенного в воде кислорода 7,58 – 12,32 мг/дм ³ , БПК5 1,1 – 4,83 мг/дм ³ , запах – 0 балл. |
| п. Жагабулак, 1,0 км на северо-запад отп. Жагабулак | 4 класс | Аммоний-ион – 1,320 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0017 мг/дм ³ . Концентрация аммоний-иона превышает фоновый класс. Концентрация фенолов не превышает фоновый класс. |
| п. Сага, 1,0 км к юго-западу от поселка | 4 класс | Аммоний-ион – 1,41 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0017 мг/дм ³ . Концентрация аммоний-иона и фенолов |

| | | |
|---|---------|---|
| | | превышают фоновый класс. |
| река Темир | | Температура воды отмечена в пределах 0 - 25°C, водородный показатель 7,8 – 8,16, концентрация растворенного в воде кислорода 6,74 – 12,94 мг/дм3, БПК5 1 – 3,65 мг/дм3, запах – 0 баллов во всех створах. |
| с.Покровское, вс. Покровское, в 400 м ниже впадения левого притока р. Чилисай | 4 класс | Аммоний-ион – 1,336 мг/дм3. Магний – 30,357 мг/дм3 Фенолы* – 0,0018 мг/дм3. Концентрация аммоний-иона, магния и фенолов превышают фоновый класс. |
| с. Ленинское, в 9 км ниже селения, в 2 км ниже устья левобережного притока р. Кульден-Темир | 4 класс | Аммоний-ион – 1,2 мг/дм3. Фенолы* – 0,0018 мг/дм3. Концентрация аммоний-иона превышает фоновый класс. Концентрация фенолов не превышает фоновый класс. |
| река Орь | | Температура воды 0 - 21°C, водородный показатель 8 - 8,1, концентрация растворенного в воде кислорода 5,01 - 12,18 мг/дм3, БПК5 0,85 - 3,64 мг/дм3, прозрачность 18 - 21 см, запах 0 балл. |
| с. Бугетсай, 0,3 км ниже села, 0,2 км ниже впадения р. Богетсай | 4 класс | Аммоний-ион – 1,296 мг/дм3. Фенолы* – 0,0019 мг/дм3. Концентрация аммоний-иона и фенолов превышают фоновый класс. |
| река Косестек | | Температура воды отмечена в пределах 5 - 16,3°C, водородный показатель 7,89 – 8,05, концентрация растворенного в воде кислорода 6,47 - 10,30, БПК5 1,22 – 4,39 мг/дм3, запах – 0 балл |
| п. Кос-Естек, в юго-западной части села примерно в 1 км выше устья левого притока без названия, в 2 км ниже слияния рек Тарангул и Айтпайка | 4 класс | Аммоний-ион – 1,257 мг/дм3. Магний – 30,333 мг/дм3. Фенолы* – 0,0016 мг/дм3. Концентрация аммоний-иона, магния и фенолов превышают фоновый класс. |
| река Актасты | | Температура воды отмечена в пределах 5 - 15,8°C, водородный показатель 8 – 8,04, концентрация растворенного в воде кислорода 4,91 - 8,95 мг/дм3, БПК5 1,62 - 4,05 мг/дм3, запах – 0 балл. |
| п. Белогорка, на северовосточной окраине поселка, в 9 км ниже слияния притоков Тересбутак и Теренсай, составляющих Актасты | 4 класс | Аммоний-ион – 1,337 мг/дм3. Фенолы* – 0,0018 мг/дм3. Концентрация фенолов превышает фоновый класс. Концентрация аммоний-иона не превышает фоновый класс |
| река Ойыл | | Температура воды отмечена в пределах 3 - 17,7°C, водородный показатель 7,89 - 8,05, концентрация растворенного в воде кислорода 9,06 – 11,90 мг/дм3, БПК5 2,33 - 2,79 мг/дм3, запах – 0 балл. |

| | | |
|---|---------|---|
| п. Уил, на северо-восточной окраине поселка в 92 м выше автодорожного мост | 4 класс | Аммоний-ион – 1,167 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0019 мг/дм ³ . Концентрация аммоний-иона и фенолов превышают фоновый класс. |
| река Улькен Кобда | | Температура воды отмечена в пределах 3,5 - 17,4°C, водородный показатель 8,05 - 8,14, концентрация растворенного в воде кислорода 9,06 - 12,00 мг/дм ³ , БПК5 1,55 – 3,52 мг/дм ³ , прозрачность 17 - 21 см, запах – 0 балл |
| п. Кобда, 1 км к юго-востоку от окраины с. Новоалексеевка, в 400 м ниже железобетонного автодорожного моста | 4 класс | Аммоний-ион – 1,47 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0018 мг/дм ³ . Концентрация аммоний-иона и фенолов превышают фоновый класс. |
| река Кара Кобда | | Температура воды отмечена в пределах 2 - 16,7°C, водородный показатель 7,89 – 8,01, концентрация растворенного в воде кислорода 8,52 – 8,89 мг/дм ³ , БПК5 1,23 - 3,31 мг/дм ³ , запах – 0 балл |
| п. Альпасай, 360 м к востоку от поселка Альпасай и в 18 км от слияния с рекой Сары - Хобда | 4 класс | Аммоний-ион – 1,43 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0017 мг/дм ³ . Концентрация аммоний-иона и фенолов превышают фоновый класс. |
| река Ыргыз | | Температура воды отмечена в пределах 5 - 18°C, водородный показатель 8 – 8,01, концентрация растворенного в воде кислорода 8,9 – 11,7 мг/дм ³ , БПК5 2 – 2,8 мг/дм ³ , запах – 0 балл |
| с. Шенбертал, в 8 км от селения и в 1,2 км от железобетонного моста | 4 класс | Аммоний-ион – 1,203 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0017 мг/дм ³ . Концентрация фенолов превышает фоновый класс. Концентрация аммоний-иона не превышает фоновый класс. |

* - вещества для данного класса не нормируются

Приложение 3

Результаты качества поверхностных вод озер на территории Актюбинской области

| | Наименование ингредиентов | Единицы измерения | 1 полугодие 2023 г |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | озеро Шалкар |
| 1 | Визуальные наблюдения | | |
| 2 | Температура | °C | 23 |
| 3 | Водородный показатель | | 8,1 |
| 4 | Растворенный кислород | мг/дм ³ | 7,49 |
| 5 | Запах воды | балл | 1 |
| 6 | БПК5 | мг/дм ³ | 1,345 |
| 7 | ХПК | мг/дм ³ | 20,14 |
| 8 | Взвешенные вещества | мг/дм ³ | 5,335 |

| | | | |
|----|-----------------|--------------------|--------|
| 9 | Гидрокарбонаты | мг/дм ³ | 251 |
| 10 | Жесткость | мг/дм ³ | 4,645 |
| 11 | Минерализация | мг/дм ³ | 636,5 |
| 12 | Натрий + калий | мг/дм ³ | 106 |
| 13 | Сухой остаток | мг/дм ³ | 800 |
| 14 | Кальций | мг/дм ³ | 40 |
| 15 | Магний | мг/дм ³ | 32 |
| 16 | Сульфаты | мг/дм ³ | 121,5 |
| 17 | Хлориды | мг/дм ³ | 86 |
| 18 | Фосфат | мг/дм ³ | 0,014 |
| 19 | Фосфор общий | мг/дм ³ | 0,029 |
| 20 | Азот нитритный | мг/дм ³ | 0,015 |
| 21 | Азот нитратный | мг/дм ³ | 0,005 |
| 22 | Железо общее | мг/дм ³ | 0,009 |
| 23 | Аммоний солевой | мг/дм ³ | 1,39 |
| 24 | Свинец | мг/дм ³ | 0,0035 |
| 25 | Медь | мг/дм ³ | 0,001 |
| 26 | Цинк | мг/дм ³ | 0,0005 |
| 27 | АПАВ /СПАВ | мг/дм ³ | 0,008 |
| 28 | Фенолы | мг/дм ³ | 0,0019 |
| 29 | Нефтепродукты | мг/дм ³ | 0,008 |

Приложение 4

Справочный раздел

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест

| Наименование примесей | Значения ПДК, мг/м ³ | | Класс опасности |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|
| | максимально разовая | средне-суточная | |
| Азота диоксид | 0,2 | 0,04 | 2 |
| Азота оксид | 0,4 | 0,06 | 3 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Бенз/а/пирен | - | 0,1 мкг/100 м ³ | 1 |
| Бензол | 0,3 | 0,1 | 2 |
| Бериллий | 0,09 | 0,00001 | 1 |
| Взвешенные вещества (частицы) | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Взвешенные частицы РМ 10 | 0,3 | 0,06 | |
| Взвешенные частицы РМ 2,5 | 0,16 | 0,035 | |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Кадмий | - | 0,0003 | 1 |
| Кобальт | - | 0,001 | 2 |
| Марганец | 0,01 | 0,001 | 2 |
| Медь | - | 0,002 | 2 |
| Мышьяк | - | 0,0003 | 2 |
| Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |

| | | | |
|-------------------|-------|--------|---|
| Свинец | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Серная кислота | 0,3 | 0,1 | 2 |
| Сероводород | 0,008 | - | 2 |
| Оксид углерода | 5,0 | 3 | 4 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,05 | 0,01 | 2 |
| Фтористый водород | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |
| Цинк | - | 0,05 | 3 |

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года №ҚР ДСМ-70. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан Завгуста 2022 года № 29011.

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение | Показатели | Оценка за месяц |
|----------|---------------|--------------------|-----------------------|
| I | Низкое | СИ НП, % ИЗА | 0-1 0 0-4 |
| II | Повышенное | СИ НП, % ИЗА | 2-4 1-19 5-6 |
| III | Высокое | СИ НП, % ИЗА | 5-10 20-49 7-13 |
| IV | Очень высокое | СИ НП, % ИЗА | >10 >50 >14 |

РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, построению, изложению и содержанию

Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

| Категория (вид) водопользования | Назначение/тип очистки | Классы водопользования | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс |
| Рыбнохозяйственное водопользование | Лососевые | + | + | - | - | - |
| | Карповые | + | + | - | - | - |
| Хозяйственно-питьевое водопользование | Простая водоподготовка | + | + | - | - | - |
| | Обычная водоподготовка | + | + | + | - | - |
| | Интенсивная водоподготовка | + | + | + | + | - |
| Рекреационное водопользование (культурно-бытовое) | | + | + | + | - | - |
| Орошение | Без подготовки | + | + | + | + | - |

| | Отстаивание в картах | + | + | + | + | + |
|---|----------------------|---|---|---|---|---|
| Промышленность: | | | | | | |
| технологические цели, процессы охлаждения | | + | + | + | + | - |
| гидроэнергетика | | + | + | + | + | + |
| добыча полезных ископаемых | | + | + | + | + | + |
| транспорт | | + | + | + | + | + |

Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №151 от 09.11.2016)

Норматив радиационной безопасности*

| Нормируемые величины | Пределы доз |
|----------------------|--|
| Эффективная доза | Население |
| | 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год |

*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву

| Наименование вещества | Предельно-допустимая концентрация (далее-ПДК) мг/кг в почве |
|--------------------------|--|
| Свинец(валовая форма) | 32,0 |
| Медь (подвижная форма) | 3,0 |
| Медь (валовая форма) | 33 |
| Хром(подвижная форма) | 6,0 |
| Хром + ⁶ | 0,05 |
| Марганец (валовая форма) | 1500 |
| Никель (подвижная форма) | 4,0 |
| Цинк (подвижная форма) | 23,0 |
| Мышьяк (валовая форма) | 2,0 |

*Совместный приказ Министерства здравоохранения РК от 30.01.2004 г. №99 и Министерства охраны окружающей среды РК от 27.01.2004 г. №21-п

ФИЛИАЛ РГП «КАЗГИДРОМЕТ» ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДРЕС:

ГОРОД АКТОБЕ

**УЛ. АВИАГОРОДОК 14 В
ТЕЛ. 8-(7132)-22-85-72.**

E MAIL:HIMLABACGM@MAIL.RU