

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Выпуск №13
3 квартал 2023 года



Министерство экологии и
природных ресурсов
Республики Казахстан
Филиал РГП «Казгидромет» по
Мангистауской области

	СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
	Предисловие	3
1	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
2	Состояние качества атмосферного воздуха	4
3	Химический состав атмосферных осадков	11
4	Состояние качества поверхностных вод	11
5	Состояние качества донных отложений	12
6	Состояние качества почвы	13
7	Радиационная обстановка	14
8	Приложение 1	15
9	Приложение 2	17
10	Приложение 3	18
11	Приложение 4	19

Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Мангистауской области (г.Актау, г.Жанаозен и пос.Бейнеу) и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

Оценка качества атмосферного воздуха Мангистауской области

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Согласно данным РГУ «Департамент экологии по Мангистауской области» действует 70 крупных предприятий, осуществляющих эмисии в окружающую среду. Фактические суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников составляют 79,04 тысяч тонн.

Превышение концентрации взвешенных частиц РМ-2,5 и РМ-10 обусловлено особыми климатическими условиями Мангистауской области. Особенно заметно в дни, когда скорость ветра достигала 15-18 м/с.

2. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Актау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Актау проводятся на 4 постах наблюдения, в том числе на 2 постах ручного отбора проб и на 2 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 11 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3) взвешенные частицы РМ-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) сероводород; 9) серная кислота; 10) озон; 11) аммиак.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
3	ручной отбор проб	г. Актау, 1 микрорайон, на территории школы №3	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, серная кислота
4		г. Актау, микрорайон 22 на территории школы №22	
5	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	г. Актау, микрорайон 12	диоксид серы, диоксид и оксид азота, сероводород, оксид углерода, аммиак
6		г. Актау, микрорайон 32а	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, сероводород, озон (приземный), оксид углерода

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Актау за 3 квартал 2023 года.

По данным сети наблюдений г. Актау, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением **СИ=4,3** (повышенный уровень) по взвешенным частицам РМ-2,5 и **НП=1%** (повышенный уровень) по взвешенным частицам РМ-10 в районе поста №6 (микрорайон 32а).

Максимально-разовые концентрации составили: взвешенные частицы РМ-2,5 – 4,3 ПДК_{м.р.}, взвешенные частицы РМ-10 – 2,52 ПДК_{м.р.}, оксид углерода – 2,33

ПДК_{м.р.}, сероводород – 3,75 ПДК_{м.р.}, концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдались: взвешенные частицы РМ-10 – 3,4 ПДК_{с.с.}.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.


Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	> ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
							в том числе	
г. Актау								
Взвешенные частицы (пыль)	0,03	0,22	0,30	0,60	0			
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,00	0,11	0,69	4,3	1	35		
Взвешенные частицы РМ-10	0,20	3,4	0,75	2,52	1	50		
Диоксид серы	0,01	0,20	0,07	0,14	0			
Оксид углерода	0,48	0,16	11,67	2,33	0	1		
Диоксид азота	0,02	0,56	0,13	0,65	0			
Оксид азота	0,02	0,25	0,30	0,75	0			
Сероводород	0,003		0,03	3,75	0	16		
Озон	0,004	0,13	0,02	0,15	0			
Аммиак	0,013	0,33	0,17	0,87	0			
Серная кислота	0,02	0,23	0,04	0,13	0			

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в 3 квартале изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения в 3 квартале в 2019 году оценивался как очень высокий, а в остальные годы уровень загрязнения высокий, за исключением 2023 года, где уровень - повышенный.

Наибольшее количество превышений максимально-разовых ПДК было отмечено по взвешенным частицам РМ-2,5 (35 случаев), взвешенным частицам РМ-10 (50 случаев), оксиду углерода (1 случай) и сероводороду (16 случаев).

Превышения нормативов среднесуточных концентраций наблюдались по взвешенным частицам РМ-10.

Метеорологические условия г.Актау

Средняя за квартал температура воздуха по области составила +19+31 °С около нормы на 2°С (норма: +18,6+30,1°С).

Осадки выпадали на большей части области, в пределах нормы (2-8мм), больше нормы на ГМС Форт-Шевченко 28,0-36,0 мм, АМС Опорная 26,3 мм, МС Сам 19,6-41,0 мм, МС Бейнеу 18,1-34,3 мм, АМС Жанаозен 33,0 мм, АМС Каламкас 34,4 мм, ГМС Актау 12,6 мм, МС Кызан 19,4 мм что составляет 450-683% от нормы.

В течении квартала погоду определяла активная фронтальная зона широтного направления. У земли происходила частая смена барических полей, обуславливающих неустойчивую погоду. Наблюдались колебания температуры воздуха, осадки, туман, пыльные бури. Порывы ветра достигали 15-26 м/с.

23 августа на АМС Опорная зафиксирован локальный шквалистый ветер до 33 м/с.

На формирование загрязнения воздуха также оказывали влияние погодные условия, так в 3 квартале 2023 года было отмечено 6 дней НМУ (дымка и слабый ветер 0-3м/с).

2.1 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г.Жанаозен

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г.Жанаозен проводятся на 2 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 7 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-10; 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота; 6) озон; 7) сероводород.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	рядом с акиматом	взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода, озон (приземный)
2		Ул. Махамбета 14 А школа	диоксид азота, диоксид серы, оксид азота, оксид углерода, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Жанаозен за 3 квартал 2023 года.

По данным сети наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением **СИ=3,8** (повышенный уровень) и **НП=2%** (повышенный уровень) по сероводороду в районе поста №2 (Ул. Махамбета 14 А школа).

Максимально-разовые концентрации составили: оксид углерода – 1,45 ПДК_{м.р.}, диоксид азота – 1,77 ПДК_{м.р.}, озона (приземный) – 1,17 ПДК_{м.р.}, сероводорода – 3,8 ПДК_{м.р.}, концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Превышения нормативов среднесуточных концентраций наблюдались по озону (приземному) – 2,0 ПДК_{с.с.}.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.

Таблица 2


Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	> ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
							в том числе	
г. Жан аозен								
Взвешенные частицы РМ-10	0,03	0,46	0,09	0,29	0			
Диоксид серы	0,01	0,28	0,03	0,06	0			
Оксид углерода	0,21	0,07	7,24	1,45	0	7		
Диоксид азота	0,02	0,51	0,35	1,77	0	10		

Оксид азота	0,01	0,17	0,16	0,41	0		
Сероводород	0,002		0,03	3,8	2	145	
Озон	0,06	2,0	0,19	1,17	2	139	

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в 3 квартале изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения в 3 квартале за последние пять лет не изменился и оценивался как повышенный.

Наибольшее количество превышений максимально-разовых ПДК было отмечено по оксиду углерода (7 случаев), диоксиду азота (10 случаев), озону(приземному) (139 случаев) и сероводороду (145 случаев).

Превышения нормативов среднесуточных концентраций наблюдались по озону (приземному).

2.2 Мониторинг качества атмосферного воздуха в п.Бейнеу

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории п.Бейнеу проводятся на 1 автоматической станции (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 7 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-10; 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота; 6) сероводород; 7) озон.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
7	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	Қосай ата 15 (школа Б.Алтынсарин)	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, диоксид и оксид азота, сероводород, озон (приземный), оксид углерода

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п. Бейнеу за 3 квартал 2023 года.

По данным сети наблюдений п.Бейнеу, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением **СИ=3,0** (повышенный уровень) по взвешенным частицам РМ-10 и НП=0% (низкий уровень).

Максимально-разовые концентрации составили: взвешенные частицы РМ-10 – 3,0 ПДК_{м.р.}, озона (приземный) – 1,42 ПДК_{м.р.}, концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдались: озон (приземный) – 1,9 ПДК_{с.с.}.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.


Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		%	>ПДК	>5 ПДК
					в том числе			
п.Бе йнеу								
Взвешенные частицы РМ-10	0,01	0,18	0,89	3,0	0	13		
Диоксид серы	0,01	0,13	0,02	0,04	0			
Оксид углерода	0,87	0,29	1,76	0,35	0			
Диоксид азота	0,01	0,29	0,19	0,95	0			
Оксид азота	0,01	0,12	0,14	0,36	0			
Озон	0,06	1,9	0,23	1,42	0	1		
Сероводород	0,00		0,01	0,90	0			

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в 3 квартале изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения в 3 квартале за последние пять лет не изменился и оценивался как повышенный.

Наибольшее количество превышений максимально-разовых ПДК было отмечено по взвешенным частицам РМ-10 (13 случаев) и озону (приземному) (1 случай).

Превышения нормативов среднесуточных концентраций наблюдались по озону (приземному).

Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений

Помимо стационарных постов наблюдений в Мангистауской области действует передвижная экологическая лаборатория, с помощью которой измерение качества воздуха проводится дополнительно в х/х Кошкар ата (1 точка) и в г.Актау (3 точки) по 7 показателям: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота; 6) сероводород; 7) сумма углеводородов.

Концентрации загрязняющих веществ, по данным наблюдений, находились в пределах допустимой нормы.

Максимальные концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений х/х «Кошкар-Ата»

Определяемые примеси	qm мг/м3	qm/ПДК
Взвешенные частицы (пыль)	0,081	0,162
Диоксид серы	0,004	0,008
Оксид углерода	3,55	0,71
Диоксид азота	0,018	0,092
Оксид азота	0,014	0,034
Сероводород	0,004	0,455
Сумма углеводородов	1,15	-

**Максимальные концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений
«г. Актау»**

Определяемые примеси	qm мг/м3	qm/ПДК
Взвешенные частицы (пыль)	0,073	0,146
Диоксид серы	0,004	0,008
Оксид углерода	3,75	0,75
Диоксид азота	0,013	0,063
Оксид азота	0,010	0,024
Сероводород	0,003	0,420
Сумма углеводородов	1,18	-

3. Химический состав атмосферных осадков

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 2 метеостанциях (Актау, Форт-Шевченко).

Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ в осадках не превышают предельно допустимые концентрации.

В пробах осадков преобладало содержание гидрокарбонатов 13,58 %, сульфатов 24,36 %, хлоридов 28,55 %, ионов натрия 12,64 %, ионов кальция 11,29 %, нитратов 0,51 %, ионов магния 2,36 %, ионов калия 6,32 %, аммония 0,39 %.

Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Форт-Шевченко – 613,5 мг/л, наименьшая на МС Актау – 117,5 мг/л.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась в пределах от 194,8 (МС Актау) до 1145,4 мкСм/см (МС Форт-Шевченко).

Кислотность выпавших осадков находится в пределах от 7,2 (МС Актау) до 7,2 (МС Форт-Шевченко).

4. Мониторинг качества поверхностных вод на территории Мангистауской области

Мониторинг качества морской воды проводится на следующих 28 точках:

- прибрежные станции г. Актау в 4 контрольных точках: г. Актау (зона отдыха 1, зона отдыха 2, район порта 1, район порта 2), п. Курык (3 точки), район маяк Адамтас (3 точки), Жыгылган (1 точка), Тасшынырау (1 точка), Суат (1 точка), мыс Аралды (1 точка), Форт-Шевченко (1 точка), Фетисово (1 точка), район залива Кара Богаз (1 точка), Шакпак-Ата (1 точка), Канга (1 точка), Кызылозен (1 точка), Саура (1 точка), Некрополь Калын-Арбат (1 точка), Кызылкум (1 точка), Северный Кендерли (1 точка), Южный Кендерли (1 точка), месторождения Каражанбас (1 точка), Арман (1 точка), Бузачи (1 точка).

Гидрохимическое наблюдение ведется по **29** показателям: *визуальные наблюдения, температура воды, водородный показатель, растворенный кислород,*

БПК₅, ХПК, главные ионы солевого состава, биогенные и органические вещества, тяжелые металлы.

4.1 Результаты мониторинга качества воды Каспийского моря по гидрохимическим показателям вод на территории Мангистауской области

На Среднем Каспии температура воды в пределах 15,5- 29,4 °С, величина водородного показателя морской воды –8-8,42, содержание растворенного кислорода – 6,2-8,3 мг/дм³, БПК₅ – 1,5-3,34 мг/дм³, ХПК- 10,8-25,2 мг/дм³, взвешенные вещества-12,9-37,9 мг/дм³, минерализация – 9993,3-21116,801 мг/дм³.

Информация по результатам качества поверхностных вод Среднего Каспия указана в Приложении 2.

5. Состояние качества донных отложений Каспийского моря

Мониторинг качества донных отложений Среднего Каспия проводится в следующих точках: п.Курык (3 точки), район маяк Адамтас (3 точки), район залива Кара Богаз (1 точка), Жыгылган (1 точка), Суат (1 точка), Кызылкум (1 точка), месторождения Каражанбас (1 точка), Арман (1 точка), Бузачи (1 точка) -13 точек отбора.

Определяется содержание нефтепродуктов, меди, хрома, никеля, марганца, свинца, цинка.

5.1 Результаты мониторинга донных отложений Каспийского моря на территории Мангистауской области

Прибрежные станции В пробах донных отложений моря содержание марганца находилось в пределах 1,33-1,85 мг/кг, хрома – 0,024-0,049 мг/кг, нефтепродуктов – 0,037-0,117 мг/кг, цинка – 0,22-1,13 мг/кг, никеля - 1,15-1,34 мг/кг, свинца - 0,005-0,015 мг/кг и меди – 1,18-1,53 мг/кг.

Месторождения В пробах донных отложений моря содержание марганца находилось в пределах 1,29-1,55 мг/кг, хрома –0,048-0,076 мг/кг, нефтепродуктов – 0,099-0,119 мг/кг, цинка – 1,02-1,15 мг/кг, никеля 1,13-1,36 мг/кг, меди – 1,11-1,41 мг/кг и свинца - 0,012-0,023 мг/кг.

Приграничная территория Среднего и Южного Каспия (маяк Адамтас) В пробах донных отложений моря содержание марганца находилось в пределах 0,88-1,02 мг/кг, хрома - 0,03-0,041 мг/кг, нефтепродуктов – 0,026 -0,042 мг/кг, цинка – 0,5-0,7 мг/кг, никеля 1,04-1,14 мг/кг, меди – 1,09-1,24 мг/кг и свинца - 0,0035-0,0056 мг/кг.

Район п. Курык В пробах донных отложений моря содержание марганца находилось в пределах 1,1 - 1,39 мг/кг, хрома– 0,024-0,029 мг/кг, нефтепродуктов – 0,037-0,045 мг/кг, цинка – 0,6-0,8 мг/кг, никеля 1,04-1,22 мг/кг, свинца - 0,008-0,011 мг/кг и меди – 1,36-1,52 мг/кг.

Информация по донным отложениям по показателям в разрезе створов указана в Приложении 3.

6. Состояние качества почвы на территории Мангистауской области

В городе Актау на границе санитарно-защитной зоны автосалона «Каспий-Ак», в районе центральной дороги, на границе санитарно-защитной зоны ТЭЦ-1, на территории школы №14 в 26 микрорайоне и на территории парка «Акбота» концентрации кадмия – 0,022-0,035 мг/кг, свинца – 0,002-0,0038 мг/кг, меди – 0,66-0,92 мг/кг хрома – 0,023-0,035 мг/кг и цинка находились в пределах 0,15-0,36 мг/кг и не превышали допустимую норму.

В городе Жанаозен в пробах почв в районах спорткомплекса, школы №7, ДК нефтяников, магазина «Аден» и ТОО «Бургылау» концентрации кадмия – 0,019-0,045 мг/кг, свинца – 0,0023-0,0043 мг/кг, меди – 0,4-0,69 мг/кг, хрома – 0,019-0,039 мг/кг и цинка находились в пределах 0,15-0,45 мг/кг и не превышали допустимую норму.

В поселке Бейнеу в районе ТОО «Жибекжолы», центральной дороги (АЗС «Айко»), школы № 2 им.Алтынсарина, мечети «БекетАта» и разъезда №1 концентрации кадмия – 0,021-0,037 мг/кг, свинца – 0,0025-0,004 мг/кг, цинка – 0,27-0,51 мг/кг, меди – 0,34-0,73 мг/кг и хрома находились в пределах 0,029-0,046 мг/кг и не превышали допустимую норму.

В городе Форт – Шевченко в пробах почв в районе школы им. Мынбаева, бывшего парка (кафе «Ая»), центральной дороги, гостиницы «Достык» и в районе компании Аджип ККО (Казахстан НортКаспианОперейтинг Компания) концентрации кадмия 0,029-0,049 мг/кг, свинца 0,0021-0,0047 мг/кг, меди 0,47-0,72 мг/кг, хрома 0,023-0,041 мг/кг и цинка находились в пределах 0,35-0,48 мг/кг и не превышали допустимую норму.

На территории **хвостохранилища Кошкар-Ата** концентрации кадмия 0,055 мг/кг, свинца 0,031 мг/кг, меди 0,52 мг/кг, хрома 0,026 мг/кг и цинка 0,37 мг/кг и не превышали допустимую норму.

Содержание кадмия в пробах почв, отобранных **в поселках Умирзак (3 точки), Жетыбай (3 точки), Акишукур (3 точки)**, в пределах 0,023 – 0,039 мг/кг, свинца 0,0022 – 0,0052 мг/кг, меди 0,61-1,24 мг/кг, хрома 0,014-0,034 мг/кг и цинка–0,27-0,46 мг/кг, концентрации не превышали допустимые нормы.

В пробах почвы, полученных в **специальной экономической зоне (СЭЗ)**, концентрации примесей составили: цинка – 0,25-0,7 мг/кг, меди – 0,45-0,84 мг/кг, хрома – 0,021-0,052 мг/кг, свинца – 0,0023-0,005 мг/кг, никеля – 1,08-1,35 мг/кг, нефтепродуктов-0,035-0,067 мг/кг, марганца 1,12-1,64 мг/кг и не превышали допустимых норм

6.1 Состояние качества почвы на месторождениях Мангистауской области

Наблюдения за загрязнением почв проводился в 3 контрольных точках на месторождениях Дунга, Жетыбай, также в 1 контрольных точках на месторождениях Каражанбас и Арман.

В пробе почвы выявлены нефтепродукты, хром (6+), марганец, свинец, цинк, никель, медь

В пробах почвы содержание цинка составляло 0,13-0,69 мг/кг, меди –1,25-1,75 мг/кг, хрома – 0,032-0,052 мг/кг, свинца – 0,0063-0,0086 мг/кг, никеля – 1,12-1,63 мг/кг, нефтепродуктов-0,056-0,48 мг/кг, марганца 1,07-1,68.

Концентрации нефтепродуктов, хрома (6+), марганца, свинца, цинка, никеля, меди на месторождениях (Дунга, Жетыбай, Каражанбас, Арман) не превышали допустимые нормы.

7. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 4-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жанаозен, Бейнеу), хвостохранилище Кошкар-Ата и на 2-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г. Жанаозен, (ПНЗ№1; ПНЗ№2).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,06-0,15 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,11 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жанаозен) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,0 – 2,3 Бк/м². Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,7 Бк/м², что не превышает предельно-допустимый уровень.



Рис.1 – карта мест расположения постов наблюдения и метеостанции г. Актау




Рис.2 – карта мест расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Жанаозен




Рис.3 – карта мест расположения поста наблюдения и метеостанции поселка Бейнеу



Рис.4 – карта мест расположения экспедиционных точек х/х Кошкар-Ата

Приложение 2

Результаты качества поверхностных вод Каспийского моря на территории Мангистауской области

	Наименование ингредиентов	Единицы измерения	3 квартал 2023
			Средний Каспий
1	Визуальные наблюдения		Вода без посторонних предметов, без окрасок
2	Температура	°С	22,526
3	Водородный показатель		8,16
4	Растворенный кислород	мг/дм3	7,556
5	Прозрачность	см	89,55
6	Взвешенные вещества	мг/дм3	17,766
7	БПК5	мг/дм3	2,566
8	ХПК	мг/дм3	17,489
9	Гидрокарбонаты	мг/дм3	218,51
10	Минерализация	мг/дм3	12538,649
11	Натрий	мг/дм3	1967,75
12	Калий	мг/дм3	86,113
13	Сухой остаток	мг/дм3	9450,357
14	Кальций	мг/дм3	281,375
15	Магний	мг/дм3	531,575
16	Сульфаты	мг/дм3	3076,605
17	Хлориды	мг/дм3	6419,544
18	Фосфат	мг/дм3	0,132
19	Фосфор общий	мг/дм3	0,013
20	Азот нитритный	мг/дм3	0,018
21	Азот нитратный	мг/дм3	1,585
22	Железо общее	мг/дм3	0,067
23	Аммоний солевой	мг/дм3	0,4
24	Свинец	мг/дм3	0,0026
25	Медь	мг/дм3	0,023
26	Цинк	мг/дм3	0,028
27	АПАВ /СПАВ	мг/дм3	0,024
28	Фенолы	мг/дм3	0,0009
29	Нефтепродукты	мг/дм3	0,037

**Информация по донным отложениям Каспийского моря
на территории Мангистауской области**

Водный объект и створ	Анализируемые компоненты	Концентрация
п.Курык	Медь, мг/кг	1,36-1,52
	Марганец, мг/кг	1,1-1,39
	Хром, мг/кг	0,024-0,029
	Нефтепродукты, мг/кг	0,037-0,045
	Свинец, мг/кг	0,008-0,011
	Цинк, мг/кг	0,6-0,8
	Никель, мг/кг.	1,04-1,22
Маяк Адамтас	Медь, мг/кг	1,09-1,24
	Марганец, мг/кг	0,88-1,02
	Хром, мг/кг	0,03-0,041
	Нефтепродукты, мг/кг	0,026-0,042
	Свинец, мг/кг	0,0035-0,0056
	Цинк, мг/кг	0,5-0,7
	Никель, мг/кг.	1,04-1,14
Кара Богаз	Медь, мг/кг	1,53
	Марганец, мг/кг	1,85
	Хром, мг/кг	0,041
	Нефтепродукты, мг/кг	0,117
	Свинец, мг/кг	0,015
	Цинк, мг/кг	0,99
	Никель, мг/кг.	1,34
Кызылкум	Медь, мг/кг	1,27
	Марганец, мг/кг	1,33
	Хром, мг/кг	0,049
	Нефтепродукты, мг/кг	0,108
	Свинец, мг/кг	0,011
	Цинк, мг/кг	1,13
	Никель, мг/кг.	1,24
Жыгылган	Медь, мг/кг	1,18
	Марганец, мг/кг	1,56
	Хром, мг/кг	0,024
	Нефтепродукты, мг/кг	0,038
	Свинец, мг/кг	0,005
	Цинк, мг/кг	0,22
	Никель, мг/кг.	1,15
Суат	Медь, мг/кг	1,23
	Марганец, мг/кг	1,44
	Хром, мг/кг	0,033
	Нефтепродукты, мг/кг	0,037
	Свинец, мг/кг	0,011
	Цинк, мг/кг	0,5
	Никель, мг/кг.	1,34
м/р Бузачи	Медь, мг/кг	1,11
	Марганец, мг/кг	1,34
	Хром, мг/кг	0,052
	Нефтепродукты, мг/кг	0,113
	Свинец, мг/кг	0,012
	Цинк, мг/кг	1,07
	Никель, мг/кг.	1,28
м/р Каражанбас	Медь, мг/кг	1,36
	Марганец, мг/кг	1,55
	Хром, мг/кг	0,076
	Нефтепродукты, мг/кг	0,119
	Свинец, мг/кг	0,023

	Цинк, мг/кг	1,02
	Никель, мг/кг.	1,13
м/р Арман	Медь, мг/кг	1,41
	Марганец, мг/кг	1,29
	Хром, мг/кг	0,048
	Нефтепродукты, мг/кг	0,099
	Свинец, мг/кг	0,019
	Цинк, мг/кг	1,15
	Никель, мг/кг.	1,36

Приложение 4

Справочный раздел

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м ³		Класс опасности
	максимально разовая	среднесуточная	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м ³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	
Хлористый водород	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фтористый водород	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года №ҚР ДСМ-70. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2022 года № 29011.

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение атмосферного воздуха	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, %	0-1 0
II	Повышенное	СИ НП, %	2-4 1-19
III	Высокое	СИ НП, %	5-10 20-49
IV	Очень высокое	СИ НП, %	>10 >50

РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

Норматив радиационной безопасности*

Нормируемые величины	Пределы доз
Эффективная доза	Население
	1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год

*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОСТА
СЭЗ «МОРПОРТ АКТАУ»
ФИЛИАЛА РГП НА ПХВ «КАЗГИДРОМЕТ»
ПО МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДРЕС:
ГОРОД АКТАУ
РАЙОН МОРПОРТА
ТЕЛ. 8-(7292)-44-53-81**

E MAIL:ILER_MNG@METEO.KZ