

Краткий агрометеорологический обзор за 2-ю декаду апреля 2020 года.

Во второй декаде апреля на юге и юго-востоке Казахстана в районах возделывания озимой пшеницы сложившаяся теплая с осадками погода, была благоприятна для роста и развития растений.

На наблюдаемых участках в Алматинской области озимая пшеница достигает высоты от 8 до 23 см, состояние посевов в основном отличное и хорошее, вокруг МС Жаланапш удовлетворительное, где сорняки заметны только вблизи, издали их не видно. Фазы развития: образование узловых корней – выход в трубку (стеблевание). На посевах в окрестности МС Сарканд, в конце декады приступили к подкормке озимой пшеницы минеральными удобрениями.

В Жамбылской области на наблюдаемых участках состояние посевов озимой пшеницы отличное и хорошее, высота растений достигает 10-22 см, повсеместно отмечается появления сорной растительности. Фазы развития: кущение – выход в трубку.

В Туркестанской области на наблюдаемых участках состояние посевов озимой пшеницы повсеместно хорошее. Высота растений достигает от 10 до 21 см., в окрестности МС Шымкент 30 см, где приступили к обработке против сорняков. Фазы развития: кущение – появление нижнего стеблевого узла.

На юге и юго-востоке республики, наблюдавшаяся теплая с осадками погода, также была благоприятной для роста и развития яровых зерновых культур. Однако прошедшие осадки несколько сдерживали завершение весенне-полевых работ.

На наблюдаемых участках в Жамбылской области завершили посев ярового ячменя, состояние растений отличное и хорошее. Высота ярового ячменя достигает от 8 до 19 см, среднее число растений на 1м² составляет 235-271 шт. Фаза развития: всходы – кущение, на посевах вокруг МС Толе би – выход в трубку.

На наблюдаемых участках в Туркестанской области на посевах ярового ячменя отмечается фаза: всходы – выход в трубку, продолжаются посевные работы. Состояние растений хорошее, высота достигает 8 см.

В Алматинской области на наблюдаемых участках в течение декады на ранних посевах ярового ячменя отмечалась фаза: 3-й лист – образование узловых корней, высота достигает 7 см. Состояние растений в основном хорошее, в окрестности МС Уштобе удовлетворительное. Посев ярового ячменя продолжается на участках вокруг МС Сарканд.

В Казалинском районе Кызылординской области на посевах яровой пшеницы отмечается фаза: 3-й лист, состояние растений хорошее, сорняки встречаются часто, но не угнетают заметно культурные растения. Высота растений достигает 13 см., число растений на 1м² составляет 113 шт.

На наблюдаемых участках в Уржарском районе (МС Урджар) Восточно-Казахстанской области после предварительной обработки почвы приступили к посеву яровой пшеницы.

В южных областях продолжается посев теплолюбивых культур (кукуруза, сахарная свекла), качество посева хорошее.

Состояния плодовых деревьев по результатам наблюдений в основном хорошее, в садах (малина) вокруг МС Каменское плато удовлетворительное, где приступили к обрезке веток.

Во второй декаде апреля на юге и юго-востоке Казахстана в районах возделывания сеяных трав наблюдались благоприятные погодные условия для роста и развития растений благодаря теплой погоде и достаточным запасам влаги в почве. У люцерны, клевера и эспарцета почти повсеместно отмечается фаза развития: рост стебля. Состояние трав люцерны и клевера в основном хорошее, в окрестностях МС Уштобе Алматинской области и МС Шымкент и МС им. Т. Рыскулова Туркестанской области состояние трав люцерны удовлетворительное. Высота трав люцерны, эспарцета и клевера достигает от 9 до 45 см.

В окрестности МС Шиели Кызылординской области состояние трав люцерны хорошее, фаза развития: рост стебля, высота трав достигает 12 см. На наблюдаемых участках в Западно-Казахстанской области (АМП Анкатинский) отмечается возобновление вегетации клевера, состояние трав удовлетворительное.

Повышение температуры воздуха и осадки способствовали возобновлению вегетаций и отрастанию житняка в Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях. Состояние трав житняка в основном удовлетворительное, в Павлодарской области состояние житняка удовлетворительное и плохое, отмечается повреждение трав житняка скотом (стравливание).

На преобладающей территории пастбищного животноводства отмечалась погода теплее обычной, среднесуточная декадная температура воздуха отмечалось выше нормы на 1...6°C и только в Западно-Казахстанской области и в отдельных районах Атырауской области температура была около и ниже нормы на 1...2°C, осадки были в основном ниже нормы.

Выпас животных проводится на всей территории пастбищного животноводства.

Продолжается расплодная компания в Балхашском районе Алматинской области, в Казталовском районе Западно-Казахстанской области, в Кызылкогинском районе Атырауской области, в Мангистауском и Бейнеуском районах Мангистауской области, в Аркалыкском районе Костанайской области и в Шетском районе Карагандинской области.

В середине декады начали стрижку овец в Жамбылском районе Алматинской области.

Состояние травостоя хорошее и удовлетворительное, пастбища были умеренно и слабо стравлены.

В последний день декады на преобладающей территории пастбищного животноводства отмечалось сухое состояние дернины. Сырое состояние дернины наблюдалось на пастбищах в Шалкарском районе Актюбинской области, в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области, в Аркалыкском районе Костанайской области, в Шетском районе Карагандинской области и в Жамбылском районе Алматинской области.