Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Филиал РГП «Казгидромет» по Павлодарской области



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

3 квартал 2025 год

	СОДЕРЖАНИЕ	Стр.					
	Предисловие	3					
1	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4					
2	Состояние качества атмосферного воздуха в г Павлодар						
2.1	Состояние качества атмосферного воздуха по данным	7					
	эпизодических наблюдений г. Павлодар						
2.2	Состояние качества атмосферного воздуха в г Экибастуз	8					
2.3	Состояние качества атмосферного воздуха в г Аксу	9					
3	Состояние качества поверхностных вод	11					
4	Состояние качества атмосферных осадков	12					
5	Состояние почвы	12					
6	Радиационная обстановка	13					
	Приложение 1	13					
	Приложение 2	15					
	Приложение 3	16					
	Приложение 4						
	Приложение 5						
	Приложение 6	18					
	Приложение 7	19					

Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Павлодарской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

Оценка качества атмосферного воздуха Павлодарской области

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Согласно данным РГУ «Департамент экологии Павлодарской области Комитета Экологического Регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК»:

Фактические эмиссии объектов I категории в г. Павлодар за 2024 год составляют 171,45 тысяч тонн.

Фактические эмиссии объектов I категории в г. Экибастуз за 2024 год составляют 313,6 тысяч тонн.

Фактические эмиссии объектов I категории в г. Аксу за 2024 год составляют 181,7 тысяч тонн.

Согласно данным ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области Комитета Экологического Регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК»:

Фактические выбросы загрязняющих веществ объектов II и III категорий в г. Павлодар за 2024 год составляют 9,776 тысяч тонн.

Фактические выбросы загрязняющих веществ объектов II и III категорий в г. Экибастуз за 2024 год составляют 1,619 тысяч тонн.

Фактические выбросы загрязняющих веществ объектов II и III категорий в г. Аксу за 2024 год составляют 0.671 тысяч тонн.

Количество котельных по объектам II и III категорий в г. Павлодар - 69, лимит выбросов 2024 год - 5,108 тыс. тонн/год.

Количество котельных по объектам II и III категорий в г. Экибастуз -19, лимит выбросов 2024 год -0,629 тыс. тонн/год.

Количество котельных по объектам II и III категорий в г. Аксу -2, лимит выбросов 2024 год -0.188 тыс. тонн/год.

2. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Павлодар.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Павлодар проводятся на 7 постах наблюдения, в том числе на 2 постах ручного отбора проб и на 5 автоматических станциях (Приложение 1, рис.1).

В целом по городу определяется до 13 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы(РМ-2,5); 3) взвешенные частицы(РМ-10); 4) аммиак; 5) диоксид азота; 6) диоксид серы; 7) оксид азота; 8) оксид углерода; 9) сероводород; 10) озон (приземный); 11) фенол; 12) хлор; 13) хлористыйводород;

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси				
1	ручной	пересечение ул. Камзина и	взвешенные частицы (пыль), диоксид				
	отбор проб	Нурмагамбетова	азота, диоксид серы, оксид азота, оксид				
2	3 раза в	ул. Айманова, 26	углерода, сероводород, фенол, хлор,				
	сутки	jiii 1 iiiiiiaii 6 ba, 2 6	хлористый водород.				
			взвешенные частицы РМ-10, диоксид				
3		ул. Ломова	серы, оксид углерода, сероводород, озон				
			(приземный).				
			взвешенные частицы РМ-10, диоксид				
4		ул. Каз. Правды	серы, оксид углерода, сероводород, озон				
	В		(приземный).				
	непрерывном		взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные				
5	режиме –	va Ferreg 54	частицы РМ-10, аммиак, диоксид азота,				
3	каждые 20	ул. Естая, 54	диоксид серы, оксид азота, оксид				
	минут		углерода, сероводород, озон (приземный).				
6		viz Zemeyy 20	аммиак, диоксид азота, диоксид серы,				
6		ул. Затон, 39	оксид азота.				
			взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные				
7		ул. Торайгырова-Дюсенова	частицы РМ-10, диоксид серы, оксид				
			углерода, сероводород, озон (приземный).				

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Павлодар за 3 квартал 2025 года.

По данным сети наблюдений <u>г. Павлодар</u>, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **высокий**, он определялся значениями СИ=5,9 (высокий уровень) и НП=3% (повышенный уровень) по оксиду углерода в районе поста № 7 (ул. Торайгырова-Дюсенова).

Максимально-разовые концентрации составили: оксид углерода - 5,9 ПДК_{м.р.}, сероводород - 4,0 ПДК_{м.р.}, хлористый водород - 1,2 ПДК_{м.р.}, озон (приземный) - 1,0 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ(более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.


Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация				сло случаев евышения ПДК _{м.р.}	
Примесь	мг/м ³	Крат- ность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Крат- ность ПДК _{м.р.}	%	>пдк		>10 ПДК 1числе
		г. Павл	одар	I .	L			
Взвешенные частицы (пыль)	0,11	0,71	0,30	0,6	0,0			
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,01	0,15	0,10	0,6	0,0			
Взвешенные частицы РМ-10	0,02	0,30	0,17	0,6	0,0			
Аммиак	0,002	0,05	0,07	0,4	0,0			
Диоксид азота	0,005	0,12	0,11	0,6	0,0			
Диоксид серы	0,01	0,12	0,50	0,99	0,0			
Оксид азота	0,003	0,05	0,10	0,3	0,0			
Оксид углерода	0,323	0,11	29,55	5,9	2,7	196	6	
Сероводород	0,0007	-	0,03	4,0	0,5	43		
Озон (приземный)	0,0267	0,89	0,160	1,0	0,0	1		
Фенол	0,001	0,24	0,01	0,5	0,0			
Хлор	0,002	0,06	0,02	0,2	0,0			
Хлористый водород	0,05	0,52	0,23	1,2	2,2	8		

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в 3 квартале изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения в 3 квартале за последние пять лет остается повышенным. По сравнению с 3 кварталом 2024 года качество воздуха города Павлодар имеет тенденцию повышения.

Наибольшее количество превышений максимально-разовых ПДК было отмечено по оксиду углерода (202), хлористому водороду (43).

Метеорологические условия:

В 3 квартале месяце 2025 года большей частью в г. Павлодаре ветер отмечался умеренный, в отдельные дни, при прохождении атмосферных фронтов, усиливался до 15-19 м/с. Температура воздуха за месяц минимальная -3°С, максимальная +36°С. Суточное количество осадков в г. Павлодаре от 0,0 мм до 14,0 мм. НМУ (неблагоприятные метеоусловия) не прогнозировались.

2.1Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений города Павлодар

Наблюдения за загрязнением воздуха проводились в городе Павлодар на 2-х точках (*точка №1– Северная промышленная зона; точка №2– микрорайон Зеленстрой*, (рис.1).

В целом по городу определяется 9 показателей: аммиак, бензол, диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, сероводород, фенол, формальдегид и фтороводород.

Результаты экспедиционных измерений качества атмосферного воздуха.

Определяемые примеси	q _т мг/м ³	q _т /ПДК					
Γ.	. Павлодар						
точка №1— Северная промышленная зона							
Аммиак (NH3)	0,08	0,40					
Бензол (С6Н6)	0,08	0,27					
Диоксид азота (NO2)	0,04	0,22					
Диоксид серы (SO2)	0,04	0,08					
Оксид углерода (СО)	6,00	1,2					
Сероводород (H2S)	0,006	0,75					
Фенол (С6Н6О)	0,006	0,60					
Формальдегид (СН2О)	0,06	1,2					
Фтороводород (HF)	0,02	1,0					
точка №2–	микрорайон Зеленстрой						
Аммиак (NH3)	0,01	0,06					
Бензол (С6Н6)	0,01	0,03					
Диоксид азота (NO2)	0,04	0,20					
Диоксид серы (SO2)	0,21	0,42					
Оксид углерода (СО)	5,00	1,0					
Сероводород (H2S)	0,01	1,2					
Фенол (С6Н6О)	0,006	0,60					
Формальдегид (СН2О)	0,04	0,80					
Фтороводород (HF)	0,01	0,50					

Точка № 1 — Северная промышленная зона, концентрация оксида углерода составила 1,2 ПДК $_{\text{м.р.}}$, формальдегид 1,2 ПДК $_{\text{м.р.}}$ фтороводород 1,0 ПДК $_{\text{м.р.}}$ концентрации остальных загрязняющих веществ, находились в пределах допустимой нормы;

Точка № 2 — микрорайон Зеленстрой, оксида углерода составила 1,0 ПДК_{м.р.}, сероводород — 1,2 ПДК_{м.р.} концентрации остальных загрязняющих веществ находились в пределах допустимой нормы (таблица 3).

2.2 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Экибастуз.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Экибастуз проводятся на 2 постах наблюдения, в том числе 1 пост ручного отбора проб и 1 автоматическая станция (Приложение 1, рис.2).

В целом по городу определяется до 5 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) диоксид азота; 3) диоксид серы; 4) оксид азота 5) оксид углерода.

В таблице 3 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Таблица 3

	Отбор проб Адрес поста		Определяемые примеси				
1	ручной отбор проб	8 м-н, ул. Беркембаева	взвешенные частицы (пыль), диоксид				
		иСатпаева	азота, диоксид серы, оксид углерода				
2	в непрерывном режиме – каждые 20	ул. Машхур -Жусупа, 118/1	диоксид азота, диоксиду серы, оксид азота, оксид углерода				
	минут						

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Экибастуз за 3 квартал 2025 года.

По данным сети наблюдений г. Экибастуз, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **низкий**, он определялся значением СИ=1,0 (низкий уровень) и НП=0% (низкий уровень).

Максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК. Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.


Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 4.

Таблица 4 **Характеристика загрязнения атмосферного воздуха**

	_	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП Число случ превышен ПДК _{м.г}		ия
Примесь	мг/м ³	Крат-	мг/м ³	Крат-	%	>пдк	>5 ПДК	>10 ПДК
		ПДКс.с.		ПДК _{м.р.}			BTOM	числе
		г. Экиб	бастуз					
Взвешенные частицы (пыль)	0,07	0,45	0,20	0,40	0,0			
Диоксид азота	0,009	0,22	0,12	0,60	0,0			
Диоксид серы	0,01	0,15	0,50	0,99	0,0			
Оксид азота	0,01	0,13	0,22	0,54	0,0			
Оксид углерода	0,054	0,02	2,52	0,50	0,0			

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в 3 квартале изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения в 3 квартале за последние пять лет остается преимущественно низким. По сравнению с 3 кварталом 2024 года качество воздуха города Экибастуз имеет тенденцию понижения.

Метеорологические условия:

В 3 квартале 2025 года большей частью в г. Экибастузе ветер отмечался умеренный, в отдельные дни, при прохождении атмосферных фронтов, усиливался до 15-18 м/с. Температура воздуха за месяц минимальная -1°С, максимальная +38°С. Суточное количество осадков в г. Экибастузе от 0,0 мм до 19,3 мм.

2.3 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Аксу.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Аксу проводятся на 1 стационарном посту (автоматическая станция) (Приложение 1, рис.3).

В целом по городу определяется до 4 показателей: 1) диоксид азота; 2) диоксид серы; 3) оксид азота; 4) оксид углерода.

В таблице 5 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 5 Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	в непрерывномрежиме	ул. Ауэзова, 4	диоксид азота, диоксид серы, оксид азота,
	– каждые 20 минут	«Γ»	оксид углерода

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Аксу за 3 квартал 2025 года.

По данным сети наблюдений <u>г. Аксу</u>, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **низкий**, он определялся значением СИ=1,6 (низкий уровень) и НП=0% (низкий уровень) по оксиду углерода в районе поста №1 (ул. Ауезова 4 « Γ »).

Максимально-разовая концентрация составила: оксид углерода -1,6 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 6).

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 6.


Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Таблица 6

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	MΓ/M ³	Крат- ность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Крат- ность ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК втом	>10 ПДК числе
Диоксид азота	0,001	0,02	0,08	0,40	0,0			
Диоксид серы	0,01	0,11	0,14	0,28	0,0			
Оксид азота	0,035	0,58	0,19	0,47	0,0			
Оксид углерода	0,299	0,10	7,75	1,55	0,0	3		

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в 3 квартале изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения в 3 квартале за последние пять лет остается преимущественно низким. По сравнению с 3 кварталом 2024 года качество воздуха города Аксу имеет тенденцию повышения.

Метеорологические условия:

В 3 квартале 2025 года большей частью в г. Аксу ветер отмечался умеренный, в отдельные дни, при прохождении атмосферных фронтов, усиливался до 17 м/с. Температура воздуха за месяц минимальная -2°С, максимальная +36°С. Суточное количество осадков в г. Аксу от 0,0 мм до 12 мм.

3. Мониторинг качества поверхностных вод на территории Павлодарской области

Наблюдения за качеством поверхностных вод на территории Павлодарской области проводились в 16 створах на 5 водных объектах (реки Ертис, Усолка, озера Сабындыколь, Жасыбай, Торайгыр).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 48 физико-химических показателя качества: визуальные наблюдения, температура, взвешенные вещества, цветность, прозрачность, водородный показатель (pH), растворенный кислород, насыщаемость кислородом, БПК5, ХПК, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы.

Мониторинг за состоянием донных отложений

Мониторинг качества донных отложений проводится на реке Ертис (с.Прииртышское). Определяется содержание меди, хрома, кадмия, ртути, никели, марганца, свинца, мышьяка.

Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Павлодарской области

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Помисоморомию	Класс кач	ества воды		E	Концен- трация	
Наименование водного объекта	3 квартал 2024 г.	3 квартал 2025 г.	Параметры	Ед. изм.		
р. Ертис	3 класс (умеренно загрязненная)		Медь	мг/дм ³	0,0024	
р. Усолка	-	3 класс (умеренно загрязненная)	Медь	мг/дм ³	0,0022	

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2,3.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ)

За 3 квартал 2025 года на территории Павлодарской области случаи высокого и экстремально высокого загрязнения не обнаружены.

Результаты мониторинга донных отложений водных объектов на территории Павлодарской области.

Содержание тяжелых металлов в донных отложениях реки Ертис составила кадмий 0,0004 мг/кг, никель 0,0002 мг/кг, свинец 0,0061 мг/кг, медь 0,0018 мг/кг, хром 0,0002 мг/кг, мышьяк 0,0000 мг/кг, марганец 0,0032 мг/кг, ртуть 0,085 мг/кг (Приложение 4).

4. Химический состав атмосферных осадков на территории Павлодарской области

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 3 метеостанциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) (рис. 4).

Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ в осадках не превышают предельно-допустимые концентрации (ПДК).

В пробах осадков преобладало содержание гидрокарбонатов 27,19%, сульфатов 25,21%, хлоридов 13,67%, ионов кальция 14,28%, ионов натрия 7,58%, нитратов -4,02%, ионов калия 3,08%, ионов магния 3,42%.

Наибольшая общая минерализация отмечена на MC Ертис – 50,26 мг/л, наименьшая – 31,01 мг/л на MC Экибастуз.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась в пределах от 57,83 (МС Экибастуз) до 83,54 мкСм/см (МС Ертис).

Кислотность выпавших осадков находится в пределах от 6,06 (МС Ертис) до 6,32 (МС Павлодар).

5. Состояние загрязнения почв тяжёлыми металлами Павлодарской области за летний период 2025 года

Наблюдения за загрязнением почв тяжелыми металлами заключались в отборе проб почвы в 3-х городах (Павлодар, Аксу, Экибастуз), а также в сельских населенных пунктах (Актогайский, Железинский, Иртышский, Качирский, Лебяжинский, Майский, Успенский и Шарбактинский районы).

В городе Павлодар в пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации хрома находились в пределах 0,22-0,29 мг/кг, свинца 18,36-24,67 мг/кг, цинка 3,95-7,84 мг/кг, меди 0,64-1,12 мг/кг, кадмия 0,12-0,22 мг/кг.

В районе пересечения проспекта Назарбаева и улицы Торайгырова, в районе санитарно-защитной зоны Павлодарского нефтехимического завода, пересечении улиц Естая и Бокейхана, пересечении улиц Чокина, Бектурова и Дюсенова, санитарно- защитной зоны АО "Алюминий Казахстана" содержание всех определяемых тяжелых металлов не превышало нормы.

В городе Аксу в пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации хрома находились в пределах 0.21-0.54 мг/кг, свинца 17.44-45.82 мг/кг, цинка 2.73-6.18 мг/кг, меди 0.45-1.7 мг/кг, кадмия 0.0.8-0.32 мг/кг.

В районе санитарно-защитной зоны завода ферросплавов концентрация свинца составила 1,0 ПДК.

В районе центрального торгового дома «Skifs» концентрация свинца составила 1,4 ПДК.

На пересечении улиц Абая-Иртышская содержание всех определяемых тяжелых металлов не превышало нормы.

В городе Экибастуз в пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации хрома находились в пределах 0,18-0,27 мг/кг, свинца 15,99-22,92 мг/кг, цинка 4,68-5,53 мг/кг, меди 0,48-1,18 мг/кг, кадмия 0,09-0,22 мг/кг.

В районе пересечения улиц Жусупа-Ауэзова, в районе автовокзала, городского парка, содержание всех определяемых тяжелых металлов не превышало нормы.

В Актогайском, Железинском, Иртышском, Качирском, Лебяжинском, Майском, Успенском и Шарбактинском районах в пробах почвы, отобранных на территории сельскохозяйственных угодий, концентрации хрома находились в пределах 0,11-0,19 мг/кг, свинца 9,05-16,42 мг/кг, цинка 2,33-6,17 мг/кг, меди 0,35-0,85 мг/кг, кадмия 0,06-0,16 мг/кг.

На территориях сельскохозяйственных угодий Актогайского, Железинского, Иртышского, Качирского, Лебяжинского, Майского, Успенского и Шарбактинского районов содержание всех определяемых тяжелых металлов не превышало нормы.

6. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма-излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-и метеорологических станциях (Актогай, Баянаул, Ертис, Павлодар, Шарбакты, Экибастуз, Коктобе) (рис.5).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,05 - 0,27 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (Приложение 5, рис.5).

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,1-3,7 Бк/м 2 . Средняя величина плотности выпадений составила 1,9 Бк/м 2 , что не превышает предельнодопустимый уровень.



Рис. 1 – карта мест расположения постов наблюдения и экспедиционных точек г. Павлодар



Рис.2 – карта мест расположения постов наблюдения г. Экибастуз



Рис.3 – карта мест расположения постов наблюдения г. Аксу

Информация о качества поверхностных вод на территории Павлодарской области

Водный объект и створ	Характер	истика физико-химических параметров					
река Ертис	Температура 15,3–27,0 °C, водородный показатель 7,82– 8,80 концентрация растворенного в воде кислорода 7,71–8,98 мг/дм ³ , БПк 1,33-1,77 мг/дм ³ , цветность 12-17, запах 0, прозрачность 28-30 см.						
с. Майское, Майский район, Павлодарская область (в черте с. Майское).	3 класс	Медь- $0,0020 \mathrm{mr/} \mathrm{дm}^3$					
г. Аксу (в черте г. Аксу; 3 км выше сброса сточных вод ГРЭС).	3 класс	Медь - 0,0022 мг/ дм ³ Фактическая концентрация меди превышает фоновый класс					
г. Аксу (в черте г. Аксу; 0,8 км ниже сброса сточных вод ГРЭС).	3 класс	Медь - 0,0027 мг/ дм ³ Фактическая концентрация меди превышает фоновый класс					
г. Павлодар, 22 км выше г. Павлодар; выше города, 5 км к югу от с. Кенжеколь.	3 класс	Медь - 0,0028 мг/ дм ³ Фактическая концентрация меди превышает фоновый класс					
г. Павлодар, в черте города, район спасательной станции.	3 класс	Медь- 0,0026 мг/ дм ³					
г. Павлодар, (в черте г. Павлодар; 1,0 км выше сброса ТОО «Павлодар – Водоканал»).	3 класс	Медь - $0,0027$ мг/ дм 3					
г. Павлодар, (в черте г. Павлодар; 0,5 км ниже сброса	3 класс	Медь - $0,0023 \text{ мг/ дм}^3$ Фактическая					

ТОО «Павлодар – Водоканал»).		концентрация меди превышает фоновый класс		
с.Мичурино, Павлодарский район (в черте с. Мичурино).	3 класс	Медь- 0,0021 мг/ дм ³		
с. Прииртышское (в черте с.	3 класс	Медь - $0,0022 \mathrm{mr}/\mathrm{дm}^3$		
Прииртышское; в створе		Фактическая		
гидропоста).		концентрация меди превышает фоновый класс		
Река Усолка	растворен	гра 19,4-24,0°С, водородный показатель 7,70-8,20, концентрация ного в воде кислорода 7,72-8,73 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,53-1,72 мг/дм ³ , сть 27-29 см.		
г. Павлодар (в черте города).	3 класс	Медь- $0,0022$ мг/ дм 3		
озеро Жасыбай	9,22, конц БПК5 1,27	ура воды составила $17.0-23.2$ °C, водородный показатель 9.05 -дентрация растворенного в воде кислорода $8.08-9.30$ мг/дм3 , $7-1.45$ мг/дм3 , XПК $70.0-75.0$ мг/дм3 , прозрачность 30 см, ые вещества $10.2-11.0$ мг/дм3 , минерализация $937-996$ мг/дм3		
озеро Сабындыколь	Температу	ра воды составила 16,9-23,0 °C, водородный показатель 9,04-		
•	9,15, концентрация растворенного в воде кислорода $8,12-9,14$ мг/дм3 , БПК5 $1,27-1,45$ мг/дм3 , ХПК $73,0-76,0$ мг/дм3 , прозрачность 30 см, взвешенные вещества $10,0-11,4$ мг/дм3 , минерализация $795-910$ мг/дм3 .			
озеро Торайгыр	Температура воды составила 17,1-23,1 °C, водородный показатель 9,28 –			
	9,48, концентрация растворенного в воде кислорода 7,92 – 9,10 мг/дм3,			
	БПК5 1,19-1,43 мг/дм3 , ХПК 78,0-81,0 мг/дм3 , прозрачность $28-30$ см,			
	взвешенные вещества 11,0-12,6 мг/дм3 , минерализация 1530-1658,1			
	мг/дм3.			

Результаты качества поверхностных вод озер на территории Павлодарской области

	на территории павлодарской области										
	Наимонования	Единицы	3 квартал 2025 г.								
№	Наименование ингредиентов	измерения	озеро Жасыбай	озеро Сабындыколь	озеро Торайгыр						
1	Визуальные наблюдения		чисто	чисто	чисто						
2	Температура	°C	20,75	20,633	20,733						
3	Водородный показатель		9,13	9,107	9,38						
4	Растворенный кислород	мг/дм ³	8,583	8,527	8,4						
5	Прозрачность	СМ	30	30	28,333						
6	БПК5	мг/дм ³	1,33	1,367	1,327						
7	ХПК	мг/дм ³	71,933	74,05	79,2						
8	Взвешенные вещества	мг/дм ³	10,433	10,733	11,8						
9	Гидрокарбонаты	мг/дм ³	479,333	437,167	723,867						
10	Жесткость	$MMOЛЬ/дM^3$	5,277	6,26	3,163						
11	Минерализация	мг/дм ³	972	857	1596,975						
12	Сухой остаток	мг/дм ³	802,5	688,933	1266,333						
13	Кальций	мг/дм ³	20,4	28,5	16,233						
14	Натрий	мг/дм ³	187,767	130,367	433,467						
15	Магний	мг/дм ³	51,733	58,6	28,567						
16	Сульфаты	$M\Gamma/дM^3$	129,167	108,9	140,667						
17	Калий	мг/дм ³	4,033	4,167	4,967						
18	Хлориды	мг/дм ³	106,867	91,4	249,033						
19	Фосфат	$M\Gamma/дM^3$	0,022	0,022	0,024						
20	Фосфор общий	мг/дм ³	0,006	0,006	0,008						
21	Азот нитритный	мг/дм ³	16 _{0,003}	0,004	0,003						

22	Азот нитратный	мг/дм ³	0,02	0,017	0,02
23	Железо общее	$M\Gamma/дM^3$	0,02	0,023	0,053
24	Аммоний солевой	$M\Gamma/дM^3$	0,363	0,45	0,533
25	Ртуть	$M\Gamma/дM^3$	0	0	0
26	Кадмий	$M\Gamma/дM^3$	0	0	0
27	Свинец	$M\Gamma/дM^3$	0	0	0
28	Медь	$M\Gamma/дM^3$	0	0	0
29	Цинк	$M\Gamma/дM^3$	0	0	0
30	Никель	$M\Gamma/дM^3$	0	0	0
31	Марганец	$M\Gamma/дM^3$	0	0	0
32	АПАВ /СПАВ	$M\Gamma/дM^3$	0	0	0
33	Фенолы	$M\Gamma/дM^3$	0	0	0
34	Нефтепродукты	$M\Gamma/дM^3$	0,017	0,017	0,017

Приложение 4

Результаты исследования донных отложений поверхностных вод бассейна реки Ертис Павлодарской области за 3 квартал 2025 года

№	Место отбора	Донные отложения, мг/кг							
п/п	проб	Cd	Cd Ni Pb Cu Cr As Mn Hg						
1	Р.Ертис	0,0004	0,0002	0,0061	0,0018	0,0002	0,0000	0,0032	0,085

Приложение 5



Рис. 4 - карта мест расположения метеостанций за наблюдением атмосферных осадков и снежного покрова на территории Павлодарской области



Рис.5 — карта мест расположения метеорологических станций за наблюдением радиационного фона на территории Павлодарской области

Приложение 7 Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

		Классы водопользования					
Категория водопользования	Назначение/тип очистки		2	3	4	5	6
		1 класс	класс	класс	класс	класс	класс
Функционирование водных экосистем	-	+	+	-	-	-	-
Dr. San a verma / avenus verma da verma	Лососевые	+	+	-	-	-	-
Рыбоводство/охранаихтиофауны	Карповые	+	+	+	-	-	-
	Простая обработка	+	+	-	-	-	-
Хозяйственно-питьевое	Нормальная обработка	+	+	+	-	-	-
водоснабжение и водоснабжение предприятий пищевой промышленности	Интенсивная обработка	+	+	+	-	-	-
Культурно-бытовое водопользование	Туризм, спорт, отдых, купание	+	+	+	-	-	-
	Без подготовки	+	+	+	+	-	-
Орошение	При использовании карт отстаивания	+	+	+	+	+	-
Промышленное водопользование	Технологические процессы, процессы охлаждения	+	+	+	+	+	-
Гидроэнергетика		+	+	+	+	+	+
Водный транспорт		+	+	+	+	+	+
Добыча полезныхископаемых		+	+	+	+	+	+

Примечание:

Справочный раздел

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществв воздухе населенных мест

Наименование	Значения П	Класс		
примесей	максимально разовая	средне- суточная	опасности	
Азота диоксид	0,2	0,04	2	
Азота оксид	0,4	0,06	3	
Аммиак	0,2	0,04	4	
Бенз/а/пирен	-	$0,1 \text{ мкг}/100 \text{ м}^3$	1	
Бензол	0,3	0,1	2	
Бериллий	0,09	0,00001	1	
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3	
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06		
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035		
Хлористый водород	0,2	0,1	2	
Кадмий	-	0,0003	1	
Кобальт	-	0,001	2	

^{«+» –} качество вод обеспечивает назначение;

^{«-» –} качество вод не обеспечивает назначение.

^{*}Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МВРИ $\,$ РК $\,$ 70 om $\,$ 20.03.2024 $\,$ г.)

Марганец	0,01	0,001	2
Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фтористый водород	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

[«]Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (№ КР ДСМ-70 от 02 августа 2022 года)

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

оденки етенени индекси загризнении итмосферы						
Градации	Загрязнение атмосферного воздуха	Показатели	Оценка за месяц			
I	Низкое	СИ НП, %	0-1 0			
II	Повышенное	СИ НП, %	2-4 1-19			
III	Высокое	СИ НП, %	5-10 20-49			
IV	Очень высокое	СИ НП, %	>10 >50			

РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

Нормативы предельно-допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву

Наименование вещества	Предельно-допустимая концентрация (далее - ПДК) мг/кг в почве				
Свинец	32,0				
Хром	6,0				

^{*} Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № КР ДСМ-32

Норматив радиационной безопасности*

Нормируемые величины	Пределы доз			
Эффективная доза	Население			
	1 м^3 в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 м^3 в			
	год			

^{*«}Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

ФИЛИАЛ РГП «КАЗГИДРОМЕТ» ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДРЕС:

ГОРОД ПАВЛОДАР УЛ. ЕСТАЯ, 54 ТЕЛ. 8-(7182)-30-08-44

EMAIL: INFO_PVD@METEO.KZ