

**МИНИСТЕРСТВО  
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РК  
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»**

**Департамент агрометеорологического  
мониторинга и прогнозирования  
Управление агрометеорологического прогнозирования**

**ПРОГНОЗ  
урожайности яровой пшеницы  
в зерносеющей зоне Казахстана на 2026 год  
(предварительный).**

*Прогноз урожайности яровой пшеницы составляется на основе метеорологических данных о количестве осадков, температуры и влажности воздуха, продолжительности солнечного сияния, и агрометеорологических данных – фаз развития растений, запасов продуктивной влаги в почве, биомассы растений, среднемноголетней урожайности.*

К посеву яровых зерновых культур на севере страны в основном приступили во второй-третьей декадах мая и в отдельных районах в первой декаде июня, в центре - во второй-третьей декадах мая, в отдельных хозяйствах в первой декаде июня, в Абайском районе Карагандинской области яровой ячмень посеяли во второй декаде апреля. На востоке в основном во второй-третьей декадах мая, в отдельных районах в конце апреля - начале мая, в Западно-Казахстанской области также в конце апреля - начале мая, в Актюбинской области во второй-третьей декаде мая.

***1. Обзор метеорологических условий.***

Среднемесячная температура воздуха в мае была выше нормы на 1-4°C на большей части Казахстана, около нормы на западе, в отдельных районах северо-запада, юго-запада, центра, юга, юго-востока и востока республики. Количество осадков в мае было меньше нормы на большей части территории республики, около и больше нормы 1,3-4,2 раза выпало на большей части северо-западной половины и востока страны, в отдельных районах центра и юго-востока Казахстана.

В **первой декаде июня** 2026 года средняя температура воздуха в основном была выше среднемноголетних значений, около нормы на большей части северо-запада (Костанайская область) и юга (Кызылординская область), ниже среднемноголетних значений на западе (Западно-Казахстанская и Актюбинская область) и юго-западе (Атырауская и Мангистауская область). Наблюдалось

неравномерное распределение количество осадков особенно в северной половине страны. Обильные осадки около и больше нормы выпали на большей части запада (от 12-18 мм до 24-31 мм), однако значительные осадки прошли именно в северной и западной части Актюбинской области (40-92 мм), на юго-западе (13-28 мм), на севере (10-25 мм), наибольшее количество осадков выпало в северной части Костанайской области (34-78 мм). За декаду меньше всего осадков выпало в Павлодарской области (1-7 мм), в Карагандинской (1-9 мм, локально до 30 мм), в отдельных пунктах Восточно-Казахстанской (1-5 мм), в Алматинской области (2-8 мм), в горных и предгорных районах (от 9-16 мм до 40-55 мм), в Жамбылской области (1-11 мм, локально до 30 мм), в Кызылординской и Туркестанской областях (1 мм, в горных районах локально до 18 мм).

Во второй *декаде июня* на территории Казахстана температура воздуха преимущественно была выше нормы, около нормы на западе страны и в отдельных районах юга. Осадки около и больше нормы наблюдались на западе, севере, а также в горных и предгорных районах юго-востока и на юге страны (Туркестанская область). Значительные и обильные осадки носили преимущественно локальный характер и отмечались лишь в отдельных районах. Осадки отмечались на западе (от 5-13 мм до 18-31 мм), на крайнем северо-западе (17-42 мм), на севере (от 6-18 мм до 22-45 мм), меньше всего выпало на северо-востоке (1-8 мм, локально 18 мм), в центре (2-8 мм, местами до 12 мм), на востоке (1-11 мм, в отдельных пунктах в горах 19 мм), на равнинной части юго-востока (2-9 мм), в горных и предгорных районах юго-востока (12-24 мм), на юге (от 1-10 мм, в Туркестанской области до 15-22 мм) и на юго-западе (1-3 мм).

В третьей *декаде июня* средняя декадная температура воздуха в северной половине республики была преимущественно около среднемноголетних значений, в Костанайской, Кызылординской и Туркестанской областях температура была в пределах нормы, ниже среднемноголетних значений на 2...4°C на западе и юго-западе страны. Осадки около и больше нормы наблюдались на западе, севере, а также в горных и предгорных районах юго-востока и на юге страны. Значительные и обильные осадки носили преимущественно локальный характер и отмечались лишь в отдельных районах. Осадки отмечались на западе (от 13-18 мм до 23-37 мм, в отдельных районах 41-60мм), на северо-западе (от 5-17мм до 23-35 мм, на крайнем северо-западе 36-42мм), на севере (от 5-16 мм до 24-45 мм), местами на крайнем севере (55-94мм), меньше всего выпало на северо-востоке (1-11 мм, локально 26 мм), в центре (1-11мм, местами до 21 мм), на востоке (3-16 мм, в горах 33 мм), на равнинной части юго-востока (2-11 мм), в горных и предгорных районах (10-12 мм), в отдельных районах области Жетысу 53мм, на юге (от 2-6 мм до 8-16 мм) и на юго-западе (от 13-19 до 25-31мм).

Осадки в июне текущего года отмечались на большей части страны. Количество осадков в июне составило около и больше нормы на западе, северо-западе, юго-западе, севере, юга в отдельных районах центра и юго-востока страны. Меньше нормы осадков выпало на востоке, северо-востоке, на большей части центра и юго-востока. Обильные осадки, превышающие норму в 1,3-5 раз в основном отмечались в отдельных районах севера, запада и юго-запада страны.




Рис.1. Сумма осадков за июнь 2026 года

## 2. Влаго и тепло обеспеченность согласно индексу ГТК

Согласно расчётам индекса ГТК, характеризующего условия увлажнения в июне текущего года, хорошее и слабое увлажнение отмечалось на северо-западе (Западно-Казахстанская, Атырауская и Актыубинская области, местами в Мангистауской области), на севере (Костанайская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области), а также в горных и предгорных районах юго-востока и юга страны, средняя и сильная засухливость наблюдалась на большей части центра, севера (Павлодарская область), востока, юга и юго-востока, а также местами на западе и севере республики (рис-2).




Рис.2. Гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК) за июнь 2026 года.



По расчетам ГТК в первой декаде июля хорошие и слабые условия увлажнения сложились на большей части северных зерносеющих регионов, а также на западе, северо-западе, востоке, юго-востоке и в центре страны. По расчётам индекса ГТК сильная засуха отмечается на большей части юга, в отдельных районах юго-востока, юго-запада, северо-запада, северо-востока, востока и центра страны (рис-3).




Рис.3. Гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК) за первую декаду июля 2026 года.

### 3. Обзор за первую половину вегетационного периода

Метеорологические условия второй и третьей декады июня были не плохими для роста и развития яровых зерновых культур в северных областях. Повсеместно проводили обработку посевов яровой пшеницы гербицидами против сорной растительности. В северных и западных областях на посевах яровой пшеницы в третьей декаде июня наблюдались фазы развития «кущение»-«колошение», в центре «выход в трубку»-«колошение», в Абайском районе на посевах ярового ячменя «молочная спелость», на востоке страны «выход в трубку» - «колошение», на отдельных участках – «цветение». Состояние зерновых культур в основном отличное и хорошее, местами удовлетворительное.

### 4. Оценка состояния яровой пшеницы в разрезе областей.

В первой декаде июля в северной половине страны в основном сложились хорошие условия для роста и развития яровых зерновых культур, в южной половине страны (Жамбылская и Туркестанская область) на наблюдаемых участках приступили к уборке ярового ячменя.

Повсеместно отмечается появление сорной растительности, посевы яровых зерновых культур в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областях обрабатывают гербицидами против

сорняков, а также проводят обработку полей ядохимикатами против вредителей и болезней.

В *Западно-Казахстанской области* на посевах яровой пшеницы в окрестности метеостанции Уральск и агропоста Газета Правда Сырымского района наблюдается фаза развития «колошение», вблизи метеостанции Федоровка Теректинского района «молочная спелость». Состояние растений в основном хорошее, высота растений 57-94 см. Общее число стеблей на 1м<sup>2</sup> составляет 472-531 шт., число стеблей с колосом на 1м<sup>2</sup> составляет 411-505 шт. Среднее число колосков в колосе 14-17 шт., из них недоразвитых 2-3 шт. Среднее количество зерен в колосе 24 шт.

В Чингирлауском районе и в районе Байтерек на посевах ярового ячменя наблюдается фаза «молочная спелость», в Таскалинском районе «колошение». Состояние растений в основном хорошее и отличное, в окрестностях агропостов Лубенка и Погодаево удовлетворительное. Высота растений 43-59 см. Общее число стеблей на 1м<sup>2</sup> составляет 242-444 шт., число стеблей с колосом на 1м<sup>2</sup> составляет 186-372 шт. Среднее число колосков в колосе 16 шт., из них недоразвитых 2 шт.

В *Актюбинской области* в окрестности метеостанции Комсомольское Айтекебийского района, Новороссийское Хромтауского района на посевах яровой пшеницы наблюдаются «появление нижнего стеблевого узла над поверхностью почвы», вблизи агропоста Кумкудук Айтекебийского района и в окрестности метеостанции Родниковка Мартукского района «колошение», состояние растений в основном хорошее. Высота растений 35-56 см. В Мартукском районе на посевах яровой пшеницы провели обработку почвы гербицидами против сорной растительности.

В окрестностях агропостов Байтурасай Мартукского района и Петропавловка Каргалинского района на посевах ярового ячменя наблюдается фаза развития «цветение», вблизи метеостанции Кос-Истек Каргалинского района «выход в трубку», состояние растений в основном хорошее. Высота растений 39-95 см.

В *Костанайской области* на посевах яровой пшеницы в основном наблюдаются фазы развития «выход в трубку»-«появление нижнего стеблевого узла над поверхностью почвы», в Аулиекольском, Аркалыкском, Камыстинском, Карабалыкском, Карасуском, Костанайском, Алтынсаринском, Узынкольском, Наурузумском и Федоровском районах «колошение», в районе Б.Майлина (метеостанция Тобол) «выход в трубку». Состояние растений в основном хорошее и отличное, высота растений 22-96 см. Среднее число стеблей на 1м<sup>2</sup> 254-783 шт., число стеблей с колосом 1м<sup>2</sup> 240-586. Среднее количество зерен в колосе 28-30 шт., из них щуплых 11-20%. Среднее количество колосков в колосе 16-21 шт., из них недоразвитых 2-3 шт.

На посевах ярового ячменя наблюдаются фазы развития «колошение», в Карасуском районе (метеостанция Железнодорожный) «восковая спелость». Состояние растений в основном хорошее 49-52 см. Среднее число стеблей на 1м<sup>2</sup> 232-604 шт., стеблей с колосом 229-331. Среднее количество зерен в колосе 17 шт. Среднее количество колосков в колосе 23-25 шт., из них недоразвитых 2-3 шт. В Денисовском, Узынкольском районах на посевах яровой пшеницы

провели обработку полей гербицидами против сорной растительности, в Карабалыкском районе провели обработку полей ядохимикатами против болезней и вредителей.

В *Акмолинской области* на посевах яровой пшеницы в основном наблюдаются фазы развития «появление нижнего стеблевого узла над поверхностью почвы»-«колошение», в Аршалинском и Егиндыкольском районах «цветение». Состояние растений в основном хорошее и удовлетворительное, высота растений 29-65 см. Общее число стеблей яровой пшеницы на 1м<sup>2</sup> составляет 271-472 шт., число стеблей с колосом 252-359. Среднее число колосков в колосе 14-18 шт., из них 2-3 недоразвитых. В Егиндыкольском районе провели обработку полей ядохимикатами и гербицидами против болезней, вредителей и сорной растительности.

На посевах ярового ячменя в основном наблюдаются фазы развития «появление нижнего стеблевого узла над поверхностью почвы»-«колошение». Состояние растений в основном хорошее и удовлетворительное, высота растений 24-53 см. Общее число стеблей ячменя на 1м<sup>2</sup> составляет 247-345 шт. Среднее число колосков в колосе 13-14 шт., из них 2 недоразвитых. В Бурабайском районе провели обработку полей ядохимикатами против болезней и вредителей, в Сандыктауском районе провели обработку почвы гербицидами против сорной растительности.

В *Северо-Казахстанской области* на посевах яровой пшеницы наблюдаются фазы развития «появление нижнего стеблевого узла над поверхностью почвы»-«колошение», в районе М.Жумабаева, Жамбылском и Тайыншинском районах «цветение». Состояние растений хорошее и отличное, высота растений 32-62см. Общее число стеблей на 1м<sup>2</sup> 290-453 шт. Среднее число колосков в колосе 12-16 шт., из них недоразвитых 1-2 шт. В районе М.Жумабаева провели обработку полей гербицидами против сорной растительности. В районе Г.Мусрепова на посевах яровой пшеницы провели обработку полей ядохимикатами против болезней и вредителей, а также внесли подкормку почвы. В Тайыншинском районе провели обработку полей ядохимикатами против болезней и вредителей, а также внесли азотные удобрения.

На посевах ярового ячменя в основном наблюдаются фазы развития «появление нижнего стеблевого узла над поверхностью почвы»-«колошение», в районе М.Жумабаева (агропост Возвышенка) фаза «кущение», в Тайыншинском (метеостанция Чкалово), Мамлютском (агропост Минкесер) и в районе Г.Мусрепова (агропост Новоишимский) фаза «молочная спелость». Высота растений 32-85 см, на поздних посевах высота 19-28 см. В Мамлютском и Тайыншинском районах общее число стеблей на 1м<sup>2</sup> 291-565 шт., стеблей с колосом 270-430 шт. Среднее число колосков в колосе 16-19 шт., из них недоразвитых 1-2шт. В Тайыншинском районе на посевах ярового ячменя провели обработку полей ядохимикатами против болезней и вредителей.

В *Павлодарской области* на посевах яровой пшеницы в основном наблюдаются фазы развития «выход в трубку»-«появление нижнего стеблевого узла над поверхностью почвы», в Иртышском, Железинском и Павлодарском районах «колошение» в Шарбактинском, Успенском, Павлодарском

(метеостанция Красноармейка) и Железинском (метеостанция Михайловка) районах «цветение». Состояние растений в основном хорошее. Высота растений 23-62 см, до отгиба верхнего листа 10 см. Общее число стеблей яровой пшеницы составляет 280-294 шт. на 1м<sup>2</sup>, стеблей с колосом 240-252 шт. Среднее число колосков в колосе 13-18 шт., из них недоразвитых 2-4 шт.

В окрестности агропоста Дмитриевка Успенского района на посевах ярового ячменя наблюдалась фаза развития «колошение», состояние растений хорошее, высота 32 см., общее число стеблей на 1м<sup>2</sup> 391 шт.

Вблизи метеостанций Урджар Уржарского района и Дмитриевка Бородулихинского *Абайской области* на посевах яровой пшеницы наблюдается фаза развития «цветение», в окрестности агропоста Георгиевка Жарминского района «молочная спелость», на посевах ярового ячменя в Бородулихинском районе наблюдается фаза развития «восковая спелость». Высота растений яровых зерновых 46-50 см. Состояние растений в основном хорошее и отличное. В Бородулихинском районе на посевах яровой пшеницы общее число стеблей на 1м<sup>2</sup> составляет 316 шт., стеблей с колосом 303 шт. Среднее число колосков в колосе 16 шт., из них недоразвитых 2 шт.

В Глубоковском, Уланском районах и в районе Алтай *Восточно-Казахстанской области* на посевах яровой пшеницы наблюдается фаза развития «колошение», в Самарском, Уланском (метеостанция Саратовка) и Улкен-Нарынском районах «цветение», в окрестности метеостанции Секисовка Глубоковского района «выход в трубку». Состояние растений хорошее и отличное, высота растений 24-67 см, до отгиба верхнего листа 7 см.

На посевах ярового ячменя вблизи метеостанции Шемонаиха Шемонаихинского района продолжается фаза развития «колошение», состояние растений хорошее, высота 41 см. Общее число стеблей на 1м<sup>2</sup> составляет 417-568 шт., стеблей с колосом 321-446 шт. Среднее число колосков в колосе 13-19 шт., из них недоразвитых 1-2 шт.

В Каркаралинском, Осакаровском, Нуринском районах *Карагандинской области* на посевах яровой пшеницы отмечается фаза развития «колошение», в окрестности метеостанции Карагандинская СХОС Бухаржырауского района и агропостов Кобетей Нуринского района, Есиль Осакаровского района фаза «цветение». Состояние растений в основном отличное и хорошее, высота 27-43 см. Общее число растений составляет 316-408 шт. на 1м<sup>2</sup>. В Нуринском районе провели обработку полей гербицидами против сорной растительности.

В окрестности агропоста Агрогородок Абайского на посевах ярового ячменя наблюдается фаза «восковая спелость», в Нуринском, Каркаралинском, Актогайском, Осакаровском районах «колошение». Высота растений 25-40 см. Состояние растений в основном отличное и хорошее. Общее число растений на 1м<sup>2</sup> составляет 329-523 шт.

## **5. Прогноз урожайности яровой пшеницы в разрезе областей.**

Согласно полученным предварительным расчетным данным и учитывая сложившуюся и ожидаемую агрометеорологическую обстановку, урожайность

яровой пшеницы на севере страны в 2026 году ожидается в основном около среднегодовых значений (таблица 1).

В Акмолинской области урожайность яровой пшеницы прогнозируется в основном около среднегодовых значений (9,3-11,3 ц/га), выше нормы в Бурабайском (15,3-17,3 ц/га), Зерендинском (16,4-18,4 ц/га) Сандыктауском (16,2-18,2 ц/га) районах.

В Костанайской области урожайность яровой пшеницы в целом прогнозируется около среднегодовых значений, выше нормы в Карасуском (14,3-16,3 ц/га), Сарыкольском (15,8-17,8 ц/га) и Узынкольском (16,3-18,3 ц/га) районах.

В Северо-Казахстанской (15,5-17,5 ц/га) урожайность яровой пшеницы в основном прогнозируется около среднегодовых значений, выше нормы в Есильском (17,6-19,6 ц/га), Кызылжарском (19,5-21,5 ц/га) районах и в районе М.Жумабаева (18,4-20,4 ц/га).

В Павлодарской (8,5-10,5 ц/га), Карагандинской (8,5-10,5 ц/га), Актюбинской (8,8-10,8 ц/га), Абайской (10,5-12,5 ц/га) областях урожайность яровой пшеницы прогнозируется около среднегодовых значений.

В Западно-Казахстанской области урожайность яровой пшеницы в целом прогнозируется около среднегодовых значений, выше нормы в Чингирлауском районе (15,6-17,6 ц/га)

В Восточно-Казахстанской области урожайность яровой пшеницы ожидается около среднегодовых значений, выше нормы в Глубоковском районе (21,1-23,1 ц/га).

Таблица 1.

**Прогноз урожайности яровой пшеницы в зерносеющей  
зоне Казахстана на 2026 год (предварительный)**

| №                   | Район          | МС, АМП    | Урожайность,<br>ожидаемая в 2026<br>году ц/га |
|---------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------|
| Акмолинская область |                |            | 11,2-13,2                                     |
| 1                   | Аккольский     | Акколь     | 11,5-13,5                                     |
| 2                   | Аршалинский    | Аршалы     | 10,7-12,7                                     |
| 3                   | Астраханский   | Жалтыр     | 10,4-12,4                                     |
| 4                   | Атбасарский    | Атбасар    | 11,4-13,4                                     |
| 5                   | Буландинский   | Вознесенка | 13,5-15,5                                     |
| 6                   | Бурабайский    | Щучинск    | 15,3-17,3                                     |
| 7                   | Егиндыкольский | Егиндыколь | 9,8-11,8                                      |
| 8                   | Биржан сал     | Степняк    | 11,6-13,6                                     |
| 9                   | Ерейментауский | Ерейментау | 8,9-10,9                                      |
| 10                  | Есильский      | Есиль      | 9,8-11,8                                      |
| 11                  | Жаксынський    | Жаксы      | 11,2-13,2                                     |



|                                     |                 |                           |                  |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|
| 12                                  | Жаркаинский     | Тасты - Талды             | 8,8-10,8         |
| 13                                  | Зерендинский    | Зеренда                   | 16,4-18,4        |
| 14                                  | Коргалжынский   | Коргалжын                 | 8,5-10,5         |
| 15                                  | Сандыктауский   | Балкашино                 | 16,2-18,2        |
| 16                                  | Целиноградский  | Новоишимский, Малиновка   | 10,5-12,5        |
| 17                                  | Шортандинский   | Шортанды                  | 11,3-13,3        |
| <b>Костанайская область</b>         |                 |                           | <b>11,4-13,4</b> |
| 1                                   | Алтынсаринский  | Докучаево                 | 12,5-14,5        |
| 2                                   | Амангельдинский | Амангельды                | 8,1-10,1         |
| 3                                   | Аркалыкский     | Аркалык , Ашутасты        | 7,5-9,5          |
| 4                                   | Ауелиекольский  | Диевская , Новонеженка    | 9,4-11,4         |
| 5                                   | Денисовский     | Аршалинский               | 10,8-12,8        |
| 6                                   | Джангельдинский | Торгай                    | 6,2-8,2          |
| 7                                   | Житикаринский   | Житигара                  | 7,4-9,4          |
| 8                                   | Камыстинский    | Камысты                   | 9,4-11,4         |
| 9                                   | Карабалыкский   | Карабалык , Есенкульский  | 13,5-15,5        |
| 10                                  | Карасуский      | Желедоторный , Карасу     | 14,3-16,3        |
| 11                                  | Костанайский    | Костанай                  | 13,5-15,5        |
| 12                                  | Мендыкаринский  | Михайловка                | 14,5-16,5        |
| 13                                  | Наурзумский     | Раздольное                | 8,1-10,1         |
| 14                                  | Сарыкольский    | Сарыколь                  | 15,8-17,8        |
| 15                                  | им. Б. Майлина  | Тобол                     | 10,7-12,7        |
| 16                                  | Узынкольский    | Пресногорьковка, Узынколь | 16,3-18,3        |
| 17                                  | Федоровский     | Федровка , Кеньаральский  | 15,2-17,2        |
| <b>Северо-Казахстанская область</b> |                 |                           | <b>15,5-17,5</b> |
| 1                                   | Айыртауский     | Саумалколь                | 14,4-16,4        |
| 2                                   | Акжарский       | Кызылтуское               | 12,6-14,6        |
| 3                                   | Аккаинский      | Смирново                  | 17,6-19,6        |
| 4                                   | Есильский       | Явленка, Корнеевка        | 17,6-19,6        |
| 5                                   | Жамбылский      | Благовещенка, Пресновка   | 16,6-18,6        |
| 6                                   | М.Жумабаева     | Булаево, Возвышенка       | 18,4-20,4        |
| 7                                   | Кызылжарский    | Петропавловск, Налобино   | 19,5-21,5        |
| 8                                   | Мамлютский      | Мамлютка, Минкесер        | 17,3-19,3        |
| 9                                   | Г.Мусрепова     | Рузаевка, Новоишимский    | 13,4-15,4        |
| 10                                  | Тайыншинский    | Тайынша, Чкалово          | 13,8-15,8        |
| 11                                  | Тимирязевский   | Тимирязево                | 14,0-16,0        |
| 12                                  | Уалихановский   | Актуюсай                  | 11,5-13,5        |
| 13                                  | Шал акына       | Сергеевка                 | 14,3-16,3        |
| <b>Павлодарская область</b>         |                 |                           | <b>8,5-10,5</b>  |
| 1                                   | Актогайский     | Актогай                   | 8,9-10,9         |
| 2                                   | Баянауылский    | Узынбулак                 | 8,7-10,7         |
| 3                                   | Ертисский       | Голубовка, Ертис          | 9,7-11,7         |
| 4                                   | Железинский     | Михайловка                | 9,0-11,0         |

|                                       |                 |                      |                  |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| 5                                     | Теренкольский   | Федоровка            | 8,6-10,6         |
| 6                                     | Павлодарский    | Андриановка          | 6,9-8,9          |
| 7                                     | Успенский       | Дмитриевка           | 7,8-10,8         |
| 8                                     | Щербактинский   | Щербакты             | 8,5-10,5         |
| <b>Карагандинская область</b>         |                 |                      | <b>8,5-10,5</b>  |
| 1                                     | Абайский        | Агрогородок          | 9,0-11,0         |
| 2                                     | Бухар-Жырауский | Корнеевка            | 8,6-10,6         |
| 3                                     | Каркаралинский  | Акжол                | 7,8-9,8          |
| 4                                     | Нуринский       | Киевка, Щербаковское | 9,3-10,3         |
| 5                                     | Осакаровский    | Есиль                | 9,4-11,4         |
| 6                                     | Шетский         | Нураталды            | 8,4-10,4         |
| <b>Актюбинская область</b>            |                 |                      | <b>8,8-10,8</b>  |
| 1                                     | Айтекебийский   | Комсомольское        | 8,8-10,8         |
| 2                                     | Алгинский       | Ильинское            | 8,1-10,1         |
| 3                                     | Каргалинский    | Кос-Истек            | 10,4-12,4        |
| 4                                     | Кобдинский      | Новоалексеевка       | 8,8-10,8         |
| 5                                     | Мартукский      | Родниковка           | 9,5-11,5         |
| 6                                     | Мугалжарский    | Темир                | 6,8-8,8          |
| 7                                     | Хромтауский     | Новороссийское       | 9,3-11,3         |
| <b>Западно-Казахстанская область</b>  |                 |                      | <b>9,4-11,4</b>  |
| 1                                     | Бурлинский      | Аксай                | 7,6-9,6          |
| 2                                     | Байтерек        | Переметное           | 9,3-11,3         |
| 3                                     | Сырымский       | Газета-Правда        | 8,3-10,3         |
| 4                                     | Таскалинский    | Каменка              | 8,1-10,1         |
| 5                                     | Теректинский    | Федоровка            | 7,7-9,7          |
| 6                                     | Чингирлауский   | Чингирлау            | 15,6-17,6        |
| <b>Абайская область</b>               |                 |                      | <b>10,5-12,5</b> |
| 1                                     | Бескарагайский  | Семиарка             | 9,2-11,2         |
| 2                                     | Бородолихинский | Дмитриевка           | 9,4-11,4         |
| 3                                     | Жарминский      | Георгиевка           | 9,4-11,4         |
| 4                                     | Кокпектинский   | Самарка              | 10,6-12,6        |
| 5                                     | Уржарский       | Уржар                | 14,0-16,0        |
| <b>Восточно-Казахстанская область</b> |                 |                      | <b>16,4-18,4</b> |
| 1                                     | Глубоковский    | Секисовка            | 21,1-23,1        |
| 2                                     | Улкен-Нарынский | Улкен-Нарын          | 16,6-18,6        |
| 3                                     | Алтай           | Зыряновск            | 18,4-20,4        |
| 4                                     | Уланский        | Саратовка            | 8,1-10,1         |
| 5                                     | Шемонаихинский  | Шемоноиха            | 17,9-19,9        |

Условные обозначения:

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | урожайность ниже нормы  |
|  | урожайность около нормы |
|  | урожайность выше нормы  |

Данный прогноз урожайности яровой пшеницы предварительный, в начале августа будет составлен окончательный прогноз с учетом фактических метеорологических условий в период формирования зерна.

**Директор ДАМП**

**Н. Лоенко**

*Прогноз составлен  
в Управлении агрометеорологического прогнозирования  
Департамента агрометеорологического мониторинга и прогнозирования  
Адрес: г.Астана, ул, Мәңгілік ел 11/1, Тел. 8 (7172) 798354;  
E-mail: [uap@meteo.kz](mailto:uap@meteo.kz)*