

Краткий агрометеорологический обзор за 2 декаду июля 2026 года.

Во второй декаде июля на юге и юго-востоке республики в районах возделывания озимых зерновых культур среднедекадная температура воздуха была выше нормы на 3...6°C. В районах возделывания озимых зерновых культур осадки не отмечались. На юге и юго-востоке страны на посевах в основном наблюдаются фазы развития «полная спелость». В отдельных районах Жамбылской и Туркестанской областей приступили к уборке озимой пшеницы.

На юго-востоке и юге страны на посевах яровых зерновых культур в основном наблюдается фаза развития растений «восковая спелость»-«полная спелость», в отдельных районах на посевах ярового ячменя Алматинской и области Жетісу «молочная спелость», в Узынагашском районе Алматинской, в Каратальском, Саркандском районах области Жетісу приступили к уборке ярового ячменя.

В северной части страны на посевах яровой пшеницы и ярового ячменя в основном наблюдается фаза развития «колошение»-«цветение», в отдельных участках «молочная спелость», на поздних посевах «появление нижнего стеблевого узла над поверхностью почвы». Состояние яровых зерновых культур и посевов в основном хорошее и отличное, на отдельных участках удовлетворительное.

На западе страны на посевах яровых зерновых культур наблюдается фазы развития «цветение»-«восковая спелость», в Теректинском районе «полная спелость», состояние растений в основном хорошее и отличное, на отдельных участках удовлетворительное.

На северо-западе страны в окрестности метеостанции Мартук Мартукского района Актюбинской области на посевах овса продолжается фаза развития «восковая спелость», состояние растений хорошее. На посевах ярового ячменя в Мартукском и Каргалинском районах «молочная спелость»-«восковая спелость», в отдельных участках «колошение». На посевах яровой пшеницы наблюдается фаза развития «колошение»-«цветение», состояние яровых зерновых культур в основном хорошее.

На востоке в Урджарском, Жарминском и Бородулихинском районах Абайской области на посевах яровой пшеницы фаза развития «молочная спелость», в Бородулихинском районе на посевах ярового ячменя «восковая спелость». Состояние растений хорошее и отличное. В Восточно-Казахстанской области на посевах яровых зерновых культур наблюдается фаза развития «цветение»-«молочная спелость», в Глубоковском (метеостанция Секисовка) районе «появление нижнего стеблевого узла над поверхностью почвы». Вблизи метеостанции Шемонаиха на посевах ярового ячменя, отмечалась фаза «молочная спелость». Состояние растений хорошее и отличное, в отдельных участках удовлетворительное.

В *центре* в Абайском и Осакаровском районах Карагандинской области на посевах ярового ячменя наблюдается фаза развития «восковая спелость», в Нуринском, Актогайском, Бухар-Жырауском районах «молочная спелость», в Каркаралинском, Нуринском (агропост Щербаковское) районах «колошение». На посевах яровой пшеницы «цветение»-«молочная спелость». В Улытауского районе Улытауской области на посевах яровой пшеницы наблюдается фаза развития «молочная спелость». Состояние растений в основном отличное и хорошее.

На востоке страны на посевах подсолнечника наблюдалась фаза развития «появление соцветий»-«цветение», на севере страны «цветение». Состояние растений хорошее и отличное.

На юге страны на полях с хлопчатником наблюдается фаза развития «цветение». Состояние растений хорошее и отличное.

В Шиелийском районе Кызылординской области и в Каратальском районе области Жетісу на посевах риса наблюдается фаза развития «колошение». Состояние растений хорошее.

На последний день декады общая оценка состояния растений-эдикаторов варьируется от удовлетворительного до отличного, на пастбищах состояние растительности на большинстве участков оценивается как удовлетворительное и хорошее, в отдельных районах Алматинской, Жамбылской, Мангистауской, Северо-Казахстанской как отличное.

По результатам инструментальных определений запасов влаги в почве во второй декаде июля на западе, севере удовлетворительная и оптимальная влагообеспеченность в основном зафиксировалась в полуметровом и метровом слоях почвы, в пахотном слое почвы в большинстве наблюдательных участков продолжает наблюдаться снижение запасов влаги. В центральной и восточной части страны запасы продуктивной влаги в пахотном и полуметровом слоях почвы остаются *недостаточными*.

2026 жылдың шілде айының 2 онкүндігіндегі қысқаша агрометеорологиялық шолу.

Шілденің екінші онкүндігінде республиканың оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында күздік дәнді дақылдар өсірілетін аудандарда ауаның орташа онкүндік температурасы нормадан 3...6°C жоғары болған. Күздік дәнді дақылдарды себілген аудандарда жауын-шашын байқалмаған. Елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында дәнді дақылдарда көбінесе «толық пісу» даму фазасы байқалады. Жамбыл және Түркістан облыстарының жекелеген аудандарында күздік бидай жинауға кіріскен.

Елдің *оңтүстік-шығысы* мен *оңтүстігінде* жаздық дәнді дақылдар егістіктерінде көбінесе өсімдіктердің «дәннің уыздануы»-«толық пісуі», Алматы және Жетісу облыстарының жеке аудандарында жаздық арпа егістіктерінде

«дәннің сүттенуі» даму фазалары байқалады, Алматы облысының Ұзынағаш ауданында, Жетісу облысының Қаратал, Сарқан аудандарында жаздық арпаны жинауға кіріскен.

Елдің *солтүстік* бөлігінде жаздық бидай мен жаздық арпа дақылдарында көбінесе «масақтану»-«гүлдену», жеке учаскелерде «дәннің сүттенуі», кеш себілген егістіктерде «топырақ бетінен төменгі сабақ түйінінің пайда болуы» **фазалары байқалады**. Жаздық дәнді дақылдар мен егістіктердің жай-күйі көбінесе жақсы және өте жақсы, жеке учаскелерде қанағаттанарлық.

Еліміздің *батысында* жаздық дәнді дақылдар егістіктерінде «гүлдену»-«дәннің уыздануы», Теректі ауданында «толық пісу» даму фазалары байқалады, өсімдіктердің жағдайы көбінесе жақсы және өте жақсы, жеке учаскелерде қанағаттанарлық.

Еліміздің *солтүстік-батысында* Ақтөбе облысы Мартук ауданы Мартук метеостанциясының маңайында сұлы дақылдарында «дәннің уыздануы» даму фазасы жалғасуда, өсімдіктердің жағдайы жақсы. Мартук және Қарғалы аудандарындағы жаздық арпа егістіктерінде «дәннің сүттенуі»-«дәннің уыздануы», жеке учаскелерде «масақтану» даму фазалары байқалады. Жаздық бидайда «масақтану»-«гүлдену» даму фазалары байқалады, жаздық дәнді дақылдардың жағдайы көбінесе жақсы.

Елдің *шығысында* Абай облысының Үржар, Жарма және Бородулиха аудандарында жаздық бидай егістіктерінде «дәннің сүттенуі» даму фазасы, Бородулиха ауданында жаздық арпа егістіктерінде «дәннің уыздануы» **фазалары байқалады**. Өсімдіктердің жағдайы жақсы және өте жақсы. Шығыс Қазақстан облысында жаздық дәнді дақылдар егістіктерінде «гүлдену»-«дәннің сүттенуі» фазадары, Глубокое (Секисовка метеостанциясы) ауданында «топырақ бетінен төменгі сабақ түйінінің пайда болуы» **фазалары байқалады**. Шемонаиха метеостанциясының жанында жаздық арпа дақылдарында «дәннің сүттенуі» фазасы байқалады. Өсімдіктердің жағдайы жақсы және өте жақсы, жеке егістіктерде қанағаттанарлық.

Орталықта Қарағанды облысының Абай және Осакаров аудандарында жаздық арпа егістіктерінде «дәннің уыздануы», Нұра, Ақтоғай, Бұқар Жырау аудандарында «дәннің сүттенуі», Қарқаралы, Нұра (Шарбақов агропосты) аудандарында «масақтану», жаздық бидайда «гүлдену»-«дәннің сүттенуі» даму фазалары байқалады. Ұлытау облысының Ұлытау ауданында жаздық бидай егістігінде «дәннің сүттенуі» даму фазасы байқалған. Өсімдіктердің жағдайы көбінесе жақсы және өте жақсы.

Елдің *шығысында* күнбағыс дақылдарында «гүл шоғырларының пайда болуы»-«гүлдену», елдің *солтүстігінде* «гүлдену» даму фазасы байқалады. Өсімдіктердің жағдайы жақсы және өте жақсы.

Елдің оңтүстігінде мақта алқаптарында «гүлдену» даму фазасы байқалаған. Өсімдіктердің жағдайы жақсы және өте жақсы.

Қызылорда облысының Шиелі ауданында және Жетісу облысының Қаратал ауданында күріш егістіктерінде «масақтану» даму фазасы байқалады. Өсімдіктердің жағдайы жақсы.

Онкүндіктің соңғы күні эдификатор-өсімдіктердің жай-күйін жалпы бағалау қанағаттанарлықтан өте жақсыға дейін болған. Көптеген жайылымдарда көбінесе өсімдіктердің жағдайы қанағаттанарлық және жақсы, Алматы, Жамбыл және Маңғыстау облыстарының жеке аудандарында өте жақсы болып бағаланған.

Шілденің екінші онкүндігінде топырақ ылғал қорын аспаптық бақылау нәтижелері бойынша батыста, солтүстікте қанағаттанарлық және оңтайлы ылғалмен қамтамасыз ету көбінесе топырақтың жарты метрлік және метрлік қабаттарында байқалған, бақылау учаскелерінің көпшілігінде топырақтың беткі қабатында ылғал қорының төмендеуі жалғасуда. Елдің орталық және шығыс бөлігінде топырақтың беткі және жарты метрлік топырақ қабаттарындағы өнімді ылғал қоры жеткіліксіз болып қалады.