



**МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РК**

РГП «КАЗГИДРОМЕТ»

**Департамент агрометеорологического
мониторинга и прогнозирования**

Управление агрометеорологического прогнозирования

ПРОГНОЗ

**урожайности кукурузы на зерно на 2026 год.
(окончательный)**

При составлении прогноза урожайности кукурузы на зерно запасы продуктивной влаги учитываются как 80% от наименьшей полевой влагоёмкости, что соответствует оптимальному влагообеспеченности растений при условии проведения вегетационных поливов в установленные сроки и в соответствии с нормой поливов. Несоблюдение норм и сроков проведения вегетационных поливов может привести к снижению фактической урожайности относительно прогнозируемого уровня. Прогноз урожайности кукурузы на зерно составляется на основе агрометеорологических характеристик температуры, влажности воздуха, количества осадков, запасов продуктивной влаги в почве.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетісу в июле температурный фон преимущественно был повышенным. В первой декаде июля температура воздуха в основном была около нормы, лишь в Алматинской области выше нормы на 1,4°C. Во второй декаде июля аномалия температуры воздуха составила +5,1°C, в Алматинской области +7,4°C, в третьей декаде июля +1,3...3,0°C, что выше нормы. Осадков больше всего выпало в первой декаде июля (142-168% от нормы), особенно в Туркестанской области (270% от нормы), во второй декаде июля меньше нормы, осадков почти не было. В последней декаде июля осадков выпало около нормы в Алматинской и Жамбылской областях (83-90% от нормы), больше нормы в Туркестанской области (187% от нормы) и меньше нормы в области Жетісу (78% от нормы). Запасы продуктивной влаги в почве на орошаемых участках преимущественно удовлетворительные и оптимальные.

В первой декаде августа в Туркестанской области в окрестности агропоста Ошакты Келесского района приступили к уборке урожая. В Панфиловском (метеостанция Жаркент), Аксуском (метеостанция Жансугуров) районах области Жетісу и в Талгарском (метеостанция Талгар)

районе Алматинской области «цветение початка»-«восковая спелость», в Енбекшиказахском (метеостанция Шелек) районе Алматинской области и Сарысуском (метеостанция Саудакеит) районе Жамбылской области «молочная спелость». Состояние растений хорошее. Высота растений 213-283 см. Средняя масса початков кукурузы в Алматинской области составила 1019 грамм. В Талгарском районе Алматинской области провели подпитывающий полив, а в Аксуском районе области Жетісу провели влагозарядковый полив.

В целом в текущем году сложившиеся агрометеорологические условия способствовали росту и развитию растений кукурузы на зерно, повышенный температурный фон способствовал активному прохождению основных фаз развития растений. Вместе с тем конечный урожай будет зависеть от обеспеченности растений влагой, соблюдения норм вегетационных поливов, а также от выполнения основных агротехнологических мероприятий.

Прогноз урожайности кукурузы на зерно.

Согласно полученным окончательным расчетным данным и учитывая сложившуюся и ожидаемую агрометеорологическую обстановку, урожайность кукурузы на зерно в 2026 году прогнозируется:

В **области Жетісу** выше среднеголетних значений в Ескельдинском и Каратайском районах, в Панфиловском районе около нормы (*таблица 1*).

В **Алматинской области** урожайность прогнозируется выше нормы в Енбекшиказахском и Илийском районах и около среднеголетних значений в Уйгурском и Талгарском районах.

В **Жамбылской области** выше среднеголетних значений прогнозируется в Сарысуском и Байзакском районах, в Кордайском, Меркенском, Жамбылском и Шуском районах около среднеголетних значений.

В **Туркестанской области** выше среднеголетних значений ожидается в Ордабасинском, Отарском и Шардаринском районах и около нормы в Мактааральском, Сарыагашском районах и в г.Туркестан.

Прогноз урожайности кукурузы на зерно на 2026 г.

Таблица 1.

№ п/п	Районы	Средняя урожайность, ц/га
область Жетісу		
1	Панфиловский	64.8-69.8
2	Ескельдинский	67.6-72.6
3	Каратайский	82.6-87.6
Алматинская область		
4	Енбекшиказахский	58.5-63.5
5	Илийский	79.8-84.8
6	Уйгурский	63.4-68.4
7	Талгарский	71,0-76,0
Жамбылская область		
8	Кордайский	71.9-76.9

9	Меркенский	58.2-63.2
10	Сарысуйский	68.6-73.6
11	Байзакский	71,0-76,0
12	Жамбылский	54.7-59.7
13	Шуйский	63.1-68.1
Туркестанская область		
14	Ордабасинский	92.3-97.3
15	Мактааральский	47,0-52,0
16	Сарыагашский	50.4-55.4
17	Отрарский	55.6-60.6
18	г.Туркестан	50.5-55.5
19	Шардаринский	62.1-67.1

Условные обозначения:

	урожайность ниже нормы
	урожайность около нормы
	урожайность выше нормы

Директор ДАМП

Н. Лоенко

*Управление агрометеорологического прогнозирования
ДАМП РГП «Казгидромет»
8 (7172) 798354, uap@meteo.kz*