

Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды Костанайской области

декабрь 2021 года



Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Филиал РГП «Казгидромет» по Костанайской области.

	СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
	Предисловие	3
1	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
2	Состояние качества атмосферного воздуха	4
3	Состояние качества поверхностных вод	13
4	Результаты мониторинга качества поверхностных вод	13
5	Радиационная обстановка	14
6	Химический состав атмосферных осадков	14
7	Приложение 1	15
8	Приложение 2	18
9	Приложение 3	19

Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Костанайской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

Оценка качества атмосферного воздуха Костанайской области

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Согласно наблюдений Департамента охраны общественного здоровья основными источниками загрязнения воздушного бассейна в городах области являются предприятия теплоэнергетики, промышленности и автотранспорта. В сельских населенных пунктах загрязнения атмосферного воздуха наблюдаются от стационарных источников - котельных.

В области из 645 котельных: на твердом топливе работает – 572, на жидком (мазут) - 12, на природном газе – 60, на электричестве -1.

В городах: Костанай, Рудный, Аркалык, Житикара, Лисаковске число объектов, имеющих организованные выбросы в атмосферный воздух - 39. В 3-х городах области - Рудном, Житикаре, Лисаковске основным источником загрязнения воздуха являются объекты черной металлургии.

2. Мониторинг качества атмосферного воздуха города Костанай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории города Костанай – на 2 постах ручного отбора проб и на 2 автоматических станциях.

В целом по городу определяется 9 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3) взвешенные частицы РМ-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) озон; 9) сероводород.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
г. Костанай			
1	ручной отбор проб	ул. Каирбекова, 379; жилой район	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота.
3		ул. Дошанова, 43, центр города	
2	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул. Бородина район дома № 142	взвешенные частицы РМ-10, взвешенные частицы РМ-2,5, оксид углерода, диоксид и оксид азота, диоксид серы, озон, сероводород, мощность эквивалентной дозы гамма излучения
4		угол ул. Маяковского-Волынова	взвешенные частицы РМ-10, взвешенные частицы РМ-2,5, оксид углерода, диоксид и оксид азота, диоксид серы, сероводород, мощность эквивалентной дозы гамма излучения

Помимо стационарных постов наблюдений в Костанайской области действует передвижная экологическая лаборатория, с помощью которой измерение качества воздуха проводится дополнительно по 5 точкам области (Приложение 1)

по 7 показателям: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота; 6) сероводород; 7) озон.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха г. Костанай за декабрь 2021 года.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как *низкий*, определялся значениями СИ равным 1,1 (низкий уровень) и НП = 0% (низкий уровень) по оксиду азота в районе ПНЗ №2 (ул. Бородина район дома № 142).

Среднемесячные концентрации взвешенных частиц РМ-2,5 составили 1,27 ПДК_{с.с.}, диоксида серы 1,28 ПДК_{с.с.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации оксид азота – 1,1 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не обнаружены

Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация (Q _{мес.})		Максимальная разовая концентрация (Q _{м.})		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{м.р.}		>ПДК	>5ПДК	>10 ПДК
г. Костанай								
Взвешенные вещества	0,0000	0,00	0,0000	0,0	0	0	0	0
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0445	1,270	0,1226	0,77	0	0	0	0
Взвешенные частицы РМ-10	0,0050	0,08	0,1226	0,4	0	0	0	0
Диоксид серы	0,0639	1,28	0,3942	0,8	0	0	0	0
Оксид углерода	0,5104	0,2	2,3152	0,5	0	0	0	0
Диоксид азота	0,0301	0,75	0,1043	0,5	0,000	0	0	0
Сероводород	0,0000		0,0000	0,0	0,000	0	0	0
Оксид азота	0,0083	0,14	0,4474	1,1	0	8	0	0

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в декабре изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения в декабре месяце за последние пять лет оценивался повышенным, кроме 2021 года – где уровень низкий.

Многолетнее увеличение показателя «наибольшая повторяемость» отмечено в основном за счет оксида азота и оксида углерода и взвешенных частиц РМ – 2.5, что свидетельствует о незначительном вкладе отопительного сезона в загрязнение воздуха.

Метеорологические условия

В декабре 2021 года из-за быстрой смены атмосферных процессов, погода носила неустойчивый характер. Чередование умеренных морозов и оттепелей сопровождалось выпадением осадков (снег, мокрый снег). Преимущественно в связи неблагоприятными метеорологическими условиями, загрязнения воздуха по г. Костанай не ожидалось.

В конце 1,2,3 декадах погодные условия формировались под влиянием антициклона, в ночное время в связи благоприятными метеорологическими условиями загрязнения воздуха по г. Костанай ожидалось.

2.1 Мониторинг качества атмосферного воздуха города Рудный.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории города Рудный проводятся на 2 автоматических станциях.

В целом по городу определяется 6 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота; 6) сероводород.

В таблице 3 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 3

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
г. Рудный			
5	в непрерывн	ул. Молодой Гвардии	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид

6	ом режиме – каждые 20 минут	4-ый переулоч	азота, сероводород, мощность эквивалентной дозы гама излучения
---	-----------------------------------	---------------	---

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха г. Рудный за декабрь 2021 года.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался *повышенным*, определялся значениями СИ равным 3,8 (повышенный уровень) и НП = 4% (повышенный уровень) по диоксиду серы в районе поста ПНЗ №5 (угол ул. Молодой Гвардии - 4-ый переулоч).

Среднемесячные концентрации диоксида азота – 1,84 ПДК_{с.с.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации диоксида серы – 3,8 ПДК_{м.р.}, диоксида азота – 1,50 ПДК_{м.р.}, оксида азота – 1,00 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не обнаружены.

Таблица 4

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация (Q _{мес.})		Максимальная разовая концентрация (Q _{м.})		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5ПДК	>10 ПДК
г. Рудный								
Взвешенные частицы РМ-10	0,00	0,000	0,00	0,0	0	0	0	0
Диоксид серы	0,03	0,55	1,91	3,8	2	95	0	0
Оксид углерода	0,07	0,024	1,44	0,3	0	0	0	0
Диоксид азота	0,07	1,84	0,30	1,5	0,649	29	0	0
Сероводород	0,00		0,00	0,0	0,000	0	0	0
Оксид азота	0,02	0,35	0,41	1,0	0	1	0	0

Выводы:

За последние годы (2017-2021гг.) уровень загрязнения атмосферного воздуха в декабре изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения в декабре месяце 2017 - 2021 годов оценивался как повышенный, за исключением 2017 - где уровень низкий.

Превышения нормативов среднесуточных концентраций наблюдались по диоксиду азота, диоксиду серы, **более всего отмечено диоксиду азота.**

Данное загрязнение характерно для летнего периода, сопровождающегося влиянием автотранспорта.

Многолетнее увеличение показателя «наибольшая повторяемость» отмечено в основном за счет диоксида азота и диоксида серы, что свидетельствует о значительном вкладе в загрязнение воздуха как автотранспорта на загруженных перекрестках города.

2.2 Мониторинг качества атмосферного воздуха города Лисаковск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Лисаковск – на 1 автоматической станции. В целом определяется 8 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) диоксид азота; 6) оксид азота; 7) озон; 8) сероводород. В таблице 5 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 5

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
г. Лисаковск			
1	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	микрорайон 3, строение 23В	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, озон, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха г. Лисаковск за декабрь 2021 года.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается **низким**, определялся значениями СИ равным 1,0 (низкий уровень) и НП = 0% (низкий уровень) по диоксиду азота.

Среднемесячные концентрации диоксида азота – 3,37 ПДК_{с.с.}, озона – 1,97 ПДК_{с.с.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не обнаружены..

Таблица 6

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация (Q _{мес.})		Максимальная разовая концентрация (Q _{м.})		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{м.р.}		>ПДК	>5ПДК	>10 ПДК
г. Лисаковск								
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0050	0,14	0,0345	0,22	0,000	0	0	0
Взвешенные частицы РМ-10	0,0067	0,11	0,0652	0,22	0,000	0	0	0
Диоксид серы	0,0001	0,00	0,0118	0,02	0,000	0	0	0
Оксид углерода	0,0318	0,01	0,6629	0,13	0,000	0	0	0
Диоксид азота	0,1348	3,37	0,1945	0,97	0,000	0	0	0
Сероводород	0,0000		0,0000	0,00	0,000	0	0	0
Озон	0,0590	1,97	0,1009	0,63	0,000	0	0	0

2.3 Мониторинг качества атмосферного воздуха города Житикара

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Житикара – на 1 автоматической станции. В целом определяется 8 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) диоксид азота; 6) оксид азота; 7) озон; 8) сероводород. В таблице 5 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 7

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
г. Житикара			
1	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	микрорайон 2, в районе гостиницы Октябрь	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, озон, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха г. Житикара за декабрь 2021 года.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается **низкий**, определялся значениями СИ равным 1,1 (низкий уровень) и НП = 0% (низкий уровень) по диоксиду серы.

Среднемесячные концентрации диоксида азота – 1,78 ПДК_{с.с.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации диоксида серы - 1,08 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не обнаружены.

Таблица 8

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация (Q _{мес.})		Максимальная разовая концентрация (Q _{м.})		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{м.р.}		>ПДК	>5ПДК	>10 ПДК
г. Житикара								
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0057	0,16	0,1331	0,83	0,000	0	0	0
Взвешенные частицы РМ-10	0,0084	0,14	0,1610	0,54	0,000	0	0	0
Диоксид серы	0,0025	0,05	0,5389	1,08	0,045	1	0	0
Оксид углерода	0,1579	0,05	1,8633	0,37	0,000	0	0	0
Диоксид азота	0,0712	1,78	0,1678	0,84	0,000	0	0	0
Сероводород	0,0000		0,0000	0,00	0,000	0	0	0
Озон	0,0168	0,56	0,0975	0,61	0,000	0	0	0

2.4 Мониторинг качества атмосферного воздуха города Аркалык

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Аркалык – на 1 автоматической станции. В целом определяется 8 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) диоксид азота; 6) оксид азота; 7) озон; 8) сероводород. В таблице 5 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 9

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
г. Аркалык			
1	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул. Ш. Жанибека, в районе дома 87	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, озон, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха г. Аркалык за декабрь 2021 года.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается *повышенным*, определялся значением НП равным 1% (повышенный уровень) по взвешенным частицам РМ-2,5 и значением СИ =3,2 (повышенный уровень) по диоксиду серы.

Среднемесячные концентрации диоксида азота – 2,45 ПДК_{с.с.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации взвешенных частиц РМ-2,5 – 1,73 ПДК_{м.р.}, взвешенных частиц РМ-10 – 1,02 ПДК_{м.р.}, диоксида серы – 3,20 ПДК_{м.р.}, оксида углерода – 1,32 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не обнаружены.

Таблица 10

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация (Q _{мес.})		Максимальная разовая концентрация (Q _м)		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5ПДК	>10 ПДК
г. Аркалык								
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0152	0,44	0,2774	1,73	0,717	16	0	0
Взвешенные частицы РМ-10	0,0185	0,31	0,3046	1,02	0,045	1	0	0
Диоксид серы	0,0026	0,05	1,5978	3,20	0,134	3	0	0
Оксид углерода	0,2670	0,09	6,6206	1,32	0,179	4	0	0
Диоксид азота	0,0980	2,45	0,1804	0,90	0,000	0	0	0
Сероводород	0,0000		0,0000	0,00	0,000	0	0	0
Озон	0,0087	0,29	0,0623	0,39	0,000	0	0	0

2.5 Мониторинг качества атмосферного воздуха поселка Карабалык.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в поселке Карабалык – на 1 автоматической станции. В целом определяется 6 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота; 6) сероводород. В таблице 5 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 11

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
п. Карабалык			
13	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул. Гагарина, 40 «А»	взвешенные частицы, диоксид и оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха п. Карабалык за декабрь 2021 года.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается *низким*, определялся значением НП равным 0% (низким уровень) и значением СИ =1,2 (низкий уровень) по оксиду углерода.

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые взвешенных частиц РМ-10 –1,20 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не обнаружены.

Таблица 12

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация (Q _{мес.})		Максимальная разовая концентрация (Q _{м.})		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{м.р.}		>ПДК	>5ПДК	>10 ПДК
п. Карабалык								
Взвешенные частицы РМ-10	0,0212	0,35	0,3595	1,20	0,224	5	0	0
Диоксид серы	0,0019	0,04	0,0114	0,0	0,000	0	0	0
Оксид углерода	0,4543	0,2	1,2390	0,2	0,000	0	0	0
Диоксид азота	0,0000	0,00	0,0000	0,0	0,000	0	0	0
Сероводород	0,0000		0,0000	0,0	0,000	0	0	0
Оксид азота	0,0000	0,00	0,0000	0,0	0,000	0	0	0

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в декабре изменялся следующим образом:



Как видно из графика, в июле месяце за период с 2017 по 2021 годы уровень загрязнения п. Карабалык оценивался как повышенный, за исключением 2017, где уровень – низкий.

3. Мониторинг качества поверхностных вод на территории Костанайской области.

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Костанайской области проводились на 16 створах 11 водных объектов (реки Тобыл, Аьет, Тогызак, Уй, Обаган, Желкуар, Торгай, водохранилища Шортанды, Амангельды, Каратомар и Жогаргы Тобыл).

37 При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются физико-химических показателей качества: *визуальные наблюдения, температура воды, растворенный кислород, водородный показатель, взвешенные вещества, цветность, прозрачность, запах, расход и уровень воды, БПК5, ХПК, главные ионы солевого состава, биогенные (соединения азота, фосфора, железа, кремний, фториды) и органические вещества (нефтепродукты, СПАВ, летучие фенолы), тяжелые металлы (никель, марганец, медь, цинк, свинец).*

4. Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Костанайской области.

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 3

Наименование водного объекта	Класс качества воды		Параметры	ед. изм.	Концентрация
	декабрь 2020 г.	декабрь 2021 г.			
р. Тобыл	4 класс	не нормируется (>5класса)	Хлориды	мг/дм ³	641,8
р. Айет	5 класс	4 класс	Взвешенные вещества	мг/дм ³	27,2
р. Обаган		не нормируется (>5класса)	Магний	мг/дм ³	186,0
			Хлориды	мг/дм ³	1500,0
			Сульфаты	мг/дм ³	5763,6
			Минерализация	мг/дм ³	10863,2
р. Тогызак	не нормируется (>5класса)	4 класс	Магний	мг/дм ³	76,85
			Сульфаты	мг/дм ³	380,4
			Минерализация	мг/дм ³	1482,05
р. Уй	4 класс	4 класс	Магний	мг/дм ³	56,5
			рН		6,32
			Сульфаты	мг/дм ³	391,9
р. Желкуар		не нормируется (>5класса)	Хлориды	мг/дм ³	414,2
р. Торгай		не нормируется (>5класса)	Хлориды	мг/дм ³	407,7

** - 5 класс вода «наихудшего качества»

Как видно из таблицы, в сравнении с декабрем 2020 года качество поверхностных вод реки Уй существенно не изменилось. Качество поверхностных вод реки Айет с 5 класса перешло к 4 классу, реки Тогызак (с выше 5 класса) перешло к 4 классу – улучшилось, реки Тобыл 4 класса перешло к >5 классу – ухудшилось.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах Костанайской области являются магний, хлориды, сульфаты, взвешенные вещества. Превышения нормативов качества по данным показателям в основном природного характера.

За декабрь 2021 года на территории Костанайской области обнаружено 10 случаев ВЗ: река Тобыл – 5 случаев ВЗ (кальций, хлориды, магний, минерализация), река Обаган – 4 случая ВЗ (хлориды, магний, минерализация, сульфаты), река Желкуар 1 ВЗ (хлориды).

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

5. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Костанай, Карабалык, Карасу, Житикара, Караменды, Сарыколь) и на 4-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г. Костанай (ПНЗ№2; ПНЗ№4), Рудный (ПНЗ №5; ПНЗ №6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,00-0,23 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,11 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Житикара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,9 – 2,2 Бк/м². Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,5 Бк/м², что не превышает предельно-допустимый уровень.

6. Химический состав атмосферных осадков на территории Костанайской области

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на метеостанции Костанай .

В пробах осадков преобладало содержание сульфатов 19,6 %, хлоридов 18,2 %, гидрокарбонатов 29,4 %, натрия 11,4 %, ионов кальция 13,9 %.

Величина общей минерализации составила 59,5 мг/л, электропроводимости – 102,5 мкСм/см.

Кислотность выпавших осадков имеет характер нейтральной среды (6,51).

Приложение 1




Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Костанай




Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Рудный




Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха городу Лисаковск




Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха городу Житикара




Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха городу Аркалык




Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха поселку Карабалык

Информация о качестве поверхностных вод в Костанайской области по створам

Водный объект и створ	Характеристика физико-химических параметров	
река Тобыл	температура воды отмечена 0-1,0 °С, водородный показатель 7,15-7,30, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,30-12,60 мг/дм ³ , БПК ₅ – 0,38-3,78 мг/дм ³ , цветность – 16-21 градусов, прозрачность – 20-22 см, запах – 0 балла во всех створах.	
створ п. Аккарга, 1 км к ЮВ от села в створе г/п	не нормируется (>5 класса)	Кальций – 226,5 мг/дм ³ , магний – 240,8 мг/дм ³ , хлориды – 1956,8 мг/дм ³ , минерализация – 3959,7 мг/дм ³ . Фактическая концентрация кальция, магния, хлоридов и минерализации превышает фоновый класс.
створ с. Гришенка, 0,2 км ниже села в створе г/п	не нормируется (>5 класса)	Хлориды– 414,2 мг/дм ³ . Фактическая концентрация хлоридов превышают фоновый класс.
створ Костанай, 1 км выше сброса	4 класс	Магний – 50,5 мг/дм ³ . Фактическая концентрация магния превышает фоновый класс.
створ Костанай, 10 км ниже города	4 класс	Магний – 59,0 мг/дм ³ ,. Фактическая концентрация магния, превышает фоновый класс.
створ Милютинка, в черте села, в створе г/п	5 класс	Взвешенные вещества – 31,2 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенных веществ не превышает фоновый класс.
река Айет	температура воды составила 0,1°С, водородный показатель 7,21, концентрация растворенного в воде кислорода – 11,61 мг/дм ³ , БПК ₅ – 3,56 мг/дм ³ , цветность – 20 градуса, прозрачность – 21 см, запах – 0 балла.	
створ с. Варваринка, 0,2 км выше села в створе г/п	5 класс**	Взвешенные вещества- 27,2 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенных веществ не превышает фоновый класс.
река Обаган	температура воды составила 0 °С, водородный показатель 7,30, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,53 мг/дм ³ , БПК ₅ – 5,61 мг/дм ³ , цветность – 22 градусов, прозрачность – 20 см, запах – 0 балла.	
створ п. Аксуат, 4 км к В от села в створе г/п	не нормируется (>5 класса)	Магний–186,0 мг/дм ³ , минерализация-10863,2 мг/дм ³ , сульфаты -5763,6 мг/дм ³ ,хлориды-1500,0 мг/дм ³ . Фактическая концентрация магния, минерализации, хлоридов,

		сульфатов превышают фоновый класс.
река Тогызак	температура воды на уровне 0,1-0,2°C, водородный показатель 7,05-7,20, концентрация растворенного в воде кислорода – 3,96-7,47 мг/дм ³ , БПК ₅ – 0,76-1,96 мг/дм ³ , цветность – 22-30 градусов, прозрачность -20-22 см, запах – 0 балла.	
створ ст. Тогызак, 1,5 км СЗ ст. Тогызак, в створе г/п	4 класс	магний- 83,9 мг/дм ³ , минерализация – 1572,1 мг/дм ³ , сульфаты- 472,6 мг/дм ³ . Фактические концентрации магния, минерализации, сульфатов превышают фоновый класс.
створ п. Михайловка, 1,1 км. СВ от села в створе г/п	4 класс	магний- 69,8 мг/дм ³ , минерализации- 1392,0 мг/дм ³ .
река Уй	температура воды составила 0,1 °С, водородный показатель – 6,32, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,59 мг/дм ³ , БПК ₅ – 1,66 мг/дм ³ , цветность – 28 градусов, прозрачность-22 см, запах – 1 балл.	
створ с. Уйское, 0,5 км к В от с. Уйское, в створе г/п	4 класс	магний – 56,5 мг/дм ³ , сульфаты-391,9 мг/дм ³ , рН -6,32. Фактическая концентрация магния, сульфатов превышает фоновый класс. Значение рН не превышает фоновый класс.
река Желкуар	температура воды составила 0,4 °С, водородный показатель – 7,15, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,79 мг/дм ³ , БПК ₅ – 0,95 мг/дм ³ , цветность – 32 градусов, прозрачность – 20 см, запах – 0 балла.	
створ п. Чайковское, 0,5 км к ЮВ от села в створе г/п	не нормируется (>5 класса)	Хлориды – 414,2 мг/дм ³ . Фактическая концентрация хлоридов превышает фоновый класс.
река Торгай	температура воды составила 0,2 °С, водородный показатель – 7,10, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,52 мг/дм ³ , БПК ₅ – 2,75 мг/дм ³ .	
створ п. Торгай, в черте села	не нормируется (>5 класса)	Хлориды -407,7 мг/дм ³ .

** - 5 класс вода «наихудшего качества»

Приложение 3

Справочный раздел

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м ³		Класс опасности
	максимально разовая	средне-суточная	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4

Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м ³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	
Хлористый водород	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фтористый водород	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (СанПин №168 от 28 февраля 2015 года)

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение атмосферного воздуха	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, %	0-1 0
II	Повышенное	СИ НП, %	2-4 1-19
III	Высокое	СИ НП, %	5-10 20-49
IV	Очень высокое	СИ НП, %	>10 >50

РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

Категория (вид) водопользования	Назначение/тип очистки	Классы водопользования				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Рыбохозяйственное водопользование	Лососевые	+	+	-	-	-
	Карповые	+	+	-	-	-
Хозяйственно-питьевое водопользование	Простая водоподготовка	+	+	-	-	-

	Обычная водоподготовка	+	+	+	-	-
	Интенсивная водоподготовка	+	+	+	+	-
Рекреационное водопользование (культурно-бытовое)		+	+	+	-	-
Орошение	Без подготовки	+	+	+	+	-
	Отстаивание в картах	+	+	+	+	+
Промышленность:						
технологические цели, процессы охлаждения		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
добыча полезных ископаемых		+	+	+	+	+
транспорт		+	+	+	+	+

Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №151 от 09.11.2016)

Норматив радиационной безопасности*

Нормируемые величины	Пределы доз
Эффективная доза	Население
	1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год

*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

ФИЛИАЛ РГП «КАЗГИДРОМЕТ» ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

АДРЕС:

ГОРОД КОСТАНАЙ
УЛ. О. ДОЩАНОВА, 43
ТЕЛ./ФАКС: 8 (7142) 50-26-49, 50-34-29
E-MAIL: LAB_KOS@METEO.KZ