

Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды Актюбинской области

Март 2023 год



Филиал РГП «Казгидромет» по Актюбинской области

ресур

га

	СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
1	Предисловие	3
2	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
3	Состояние качества атмосферного воздуха	4
4	Состояние качества поверхностных вод	11
5	Радиационная обстановка	12
6	Химический состав атмосферных осадков	13
7	Приложение 1	13
8	Приложение 2	17
9	Приложение 3	19
10	Приложение 4	20

Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых Филиалом РГП «Казгидромет» по Актыбинской области.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Актыбинской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

Оценка качества атмосферного воздуха

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Загрязнение воздушного бассейна области обусловлено в основном крупными предприятиями: АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «КазахойлАктобе», Актюбинский завод ферросплавов и ДГОК филиалы АО «ТНК «Казхром», АО «Интергаз Центральная Азия», УМГ «Актобе», АО «Актобе ТЭЦ». Из общего объема выбросов от стационарных источников доля выбросов от сжигания попутного газа на факелах составляет 11,67 тыс.тонн 97% всех выбросов от факельных установок приходятся на 3 нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия: АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «КазахойлАктобе» и ТОО «Аман Мунай».

Кроме этого, одними из основных загрязнителей атмосферного воздуха Актюбинской области являются выхлопные газы от передвижных источников.

2. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Актобе.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Актобе проводятся на 6 постах наблюдения, в том числе на 3 постах ручного отбора проб и на 3 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 10 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3) взвешенные частицы РМ-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) сероводород; 9) формальдегид; 10) хром.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	ручной отбор проб	Авиагородок 14, район аэропорта	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, формальдегид, хром, сероводород.
2		ул. Белинский 5, район Жилгородка	
3		ул. Ломоносова 7, район ЖД вокзала	
4	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул. Рыскулова 4, район Шанхай	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород
5		ул. Есет батыра 109	
6		ул. Жанкожа батыра 89, район Курмыш	

Помимо стационарных постов наблюдений в городе Актобе действует передвижная лаборатория, с помощью которой измерение качества воздуха проводится дополнительно по 3 точкам области по 8 показателям: 1) взвешенные

частицы РМ-10; 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота; 6) сероводород; 7) аммиак; 8) формальдегид.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Актобе за март 2023 года.

За март 2023 года качество атмосферного воздуха города **Актобе** оценивалось по **стандартному индексу** как «**повышенный**» уровень загрязнения (СИ=3,7); по наибольшей повторяемости как «**низкий**» (НП=0%). В загрязнение атмосферного воздуха основной вклад вносит сероводород (количество превышений ПДК за месяц: 7 случаев).

Максимально-разовая концентрация сероводорода составила 3,7 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.

Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м³	Кратно сть ПДК _{с.с.}	мг/м³	Кратнос ть ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
							в том числе	
г. Актобе								
Взвешенные частицы (пыль)	0,0082	0,0548	0,1000	0,2000	0,00	0	0	0
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0015	0,0430	0,0023	0,0144	0,00	0	0	0
Взвешенные частицы РМ-10	0,0006	0,0093	0,0027	0,0090	0,00	0	0	0
Диоксид серы	0,0150	0,3002	0,2967	0,5934	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,4913	0,1638	3,7295	0,7459	0,00	0	0	0
Диоксид азота	0,0256	0,6393	0,1183	0,5915	0,00	0	0	0
Оксид азота	0,0220	0,3665	0,0911	0,2278	0,00	0	0	0
Сероводород	0,0006		0,0297	3,7125	0,30	7	0	0
Формальдегид	0,0037	0,3685	0,0070	0,1400	0,00	0	0	0
Хром	0,0004	0,2424	0,0007		0,00	0	0	0

Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Хромтау.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Хромтау проводятся на 1 посту наблюдения.

В целом по городу определяется до 6 показателей: 1) *взвешенные частицы РМ-2,5*; 2) *взвешенные частицы РМ-10*; 3) *диоксид серы*; 4) *оксид углерода*; 5) *диоксид азота*; 6) *сероводород*.

В таблице 3 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 3

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	Ул. Горького 9	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Хромтау за март 2023 года.

За март 2023 года качество атмосферного воздуха города Хромтау оценивалось по стандартному индексу как «повышенный» уровень загрязнения (СИ=3,2); по наибольшей повторяемостью как «повышенный» (НП=1%). В загрязнение атмосферного воздуха основной вклад вносит диоксид серы (количество превышений ПДК за месяц: 21 случаев).

Максимально-разовая концентрация диоксида серы – 3,2 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 4.

Таблица 4

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
							в том числе	
г. Хромтау								
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0029	0,0839	0,1061	0,6631	0,00	0	0	0
Взвешенные частицы РМ-10	0,0093	0,1547	0,1682	0,5607	0,00	0	0	0
Диоксид серы	0,0298	0,5962	1,6050	3,2100	12	21	0	0
Оксид углерода	0,0013	0,0004	0,2008	0,0402	0,00	0	0	0
Диоксид азота	0,0081	0,2030	0,1235	0,6175	0,00	0	0	0
Сероводород	0,0010		0,0010	0,1250	0,00	0	0	0

Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Кандыагаш.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Кандыагаш проводятся на 1 посту наблюдения.

По городу определяется 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) диоксид азота; 6) сероводород.

В таблице 5 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 5

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	Ул. Жабаяева 64А	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Кандыагаш за март 2023 года.

По данным сети наблюдений г. Кандыагаш, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением СИ=4,3 (**повышенный уровень**) и НП=2% (**повышенный уровень**) по диоксиду серы.

Максимально-разовая концентрация диоксида серы – 4,3 ПДК_{м.р.}, взвешенные вещества РМ-10 – 2,4 ПДК_{м.р.}, диоксид азота – 1,2 ПДК_{м.р.}, сероводород – 1,9 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточная концентрация диоксида азота -3,6 ПДК_{с.с.}.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 6.

Таблица 6

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
							в том числе	
г. Кандыагаш								
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0059	0,1694	0,1598	0,9988	0,00	0	0	0
Взвешенные частицы РМ-10	0,0313	0,5211	0,7101	2,3670	1,77	39	0	0
Диоксид серы	0,0188	0,3758	2,1698	4,3396	1,14	25	0	0

Оксид углерода	0,0719	0,0240	4,3433	0,8687	0,00	0	0	0
Диоксид азота	0,1460	3,6496	0,2467	1,2335	0,14	3	0	0
Сероводород	0,0012		0,0149	1,8625	0,77	17	0	0

Мониторинг качества атмосферного воздуха в п.Шубарши

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории п.Шубарши проводятся на 1 посту наблюдения.

На точке наблюдения определяется 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) диоксид азота; 6) сероводород.

В таблице 7 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 7

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул.Геолог 25Д	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п.Шубарши за март 2023 года.

По данным сети наблюдений п.Шубарши, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением СИ=2,6 (**повышенный уровень**) и НП=6% (**повышенный уровень**) по диоксиду азота.

Максимально-разовая концентрация взвешенных веществ РМ-2,5 – 1,6 ПДК_{м.р.}, диоксид азота – 1,3 ПДК_{м.р.}, оксид углерода – 2,6 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 8.

Таблица 8

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
							в том числе	

п.Шубарши								
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0032	0,0908	0,2486	1,5538	0,05	1	0	0
Взвешенные частицы РМ-10	0,0079	0,1320	0,2064	0,6880	0,00	0	0	0
Диоксид серы	0,0014	0,0275	0,0965	0,1930	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,4929	0,1643	12,8493	2,5699	0,05	1	0	0
Диоксид азота	0,1595	3,9867	1,3360	1,3360	6,09	134	0	0
Сероводород	0,0020		0,2750	0,2750	0,00	0	0	0

Мониторинг качества атмосферного воздуха в п.Кенкияк

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории п.Кенкияк проводятся на 1 посту наблюдения.

Наточке наблюдения определяется 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) диоксид азота; 6) сероводород.

В таблице 9 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 9

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул. Алтынсарина 11 Б	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п.Кенкияк за март 2023 года.

По данным сети наблюдений п.Кенкияк, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **высокий**, он определялся значением СИ=1,3 (**низкий уровень**) и НП=31 % (**высокий уровень**) по диоксиду азота.

Максимально-разовая концентрация диоксида азота составила 1,3 ПДК_{м.р.}, сероводорода – 1,2 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточная концентрация диоксид азота – 4,7 ПДК_{с.с.}

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 10.

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха


Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
							в том числе	
п. Кенкияк								
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0007	0,0200	0,0798	0,4988	0,00	0	0	0
Взвешенные частицы РМ-10	0,0018	0,0300	0,1928	0,6427	0,00	0	0	0
Диоксид серы	0,0095	0,1899	0,0536	0,1072	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,0229	0,0076	2,1700	0,4340	0,00	0	0	0
Диоксид азота	0,1882	4,7059	0,2607	1,3035	31,3	688	0	0
Сероводород	0,0034		0,0094	1,1750	0,36	8	0	0

Результаты экспедиционных измерений качества атмосферного воздуха

Определяемые примеси	Батыс-2	
	Точка №1	
	мг/м ³	ПДК
Взвешенные частицы (РМ-10)	0,0049	0,0163
Сероводород	0,0040	0,5000
Формальдегид	0,0174	0,3480
Оксид азота	0,0054	0,0136
Диоксид серы	0,0088	0,0176
Диоксид азота	0,0747	0,3735
Оксид углерода	1,1033	0,2207

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха за март



Как видно из графика, за март 2019-2020 гг. и в 2022 году уровень загрязнения оценивался как высокий уровень, а в 2021 и 2023 гг. повышенный уровень загрязнения. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит сероводород.

Метеоусловия

Первая половина месяца была под влиянием атмосферных фронтов, осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западного направления с порывами до 15-20 м/с. Во второй половине месяца влияние области повышенного давления, осадков не отмечалось. В самом конце периода при прохождении Каспийского циклона, на большей части области и в городе Актобе наблюдалось усиление восточного ветра до 15-23 м/с. Количество осадков по городу за месяц выпало 35,2 мм, (норма 30 мм).

3. Мониторинг качества поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Актюбинской области проводились на 12 створах 5 водных объектов: (реки Елек, Каргалы, Эмба, Темир, Орь).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 42 физико-химических показателей качества: *температура, взвешенные вещества, прозрачность, водородный показатель (рН), растворенный кислород, БПК₅, ХПК, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы.*

Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Актюбинской области

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 3

	Класс качества воды		Параметры	ед. изм.	концентрация
	Мат 2022 г.	Март 2023 г.			
р. Елек	4-класс	4-класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,14
			Магний	мг/дм ³	31,5
			Фенолы*	мг/дм ³	0,0015
			Хром (6+)*	мг/дм ³	0,054
р. Каргалы	4-класс	4-класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,13
			Магний	мг/дм ³	33
			Фенолы*	мг/дм ³	0,0017
р. Эмба	4-класс	4-класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,14
			Фенолы*	мг/дм ³	0,0012
р. Темир	5-класс	4 класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,355
			Фенолы*	мг/дм ³	0,0019
р. Орь	4-класс	4 класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,28
			Магний	мг/дм ³	37
			Фенолы*	мг/дм ³	0,002

* - вещества для данного класса не нормируются

Как видно из таблицы, в сравнении с мартом 2022 года качество поверхностных вод в реках Елек, Каргалы, Эмба, Орь существенно не изменилось.

Качество поверхностных вод в реке Темир переход с 5-го класса в 4-ый класс – улучшилось.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах Актюбинской области являются аммоний-ион, магний, фенолы, хром(6+).

За март 2023 года на территории Актюбинской области в реке Елек обнаружено 1 случай ВЗ .

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

4. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма-излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7 метеорологических станциях (Актобе, Караул-Кельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабулак).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы в Актюбинской области находились в пределах 0,05–0,22 мкЗв/ч (норматив–до 5 мкЗв/ч). В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,11 мкЗв/ч.

Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области проводилась на метеостанциях Актобе, Караул-

Кельды, Шалкар путем пятисуточного отбора проб воздуха горизонтальными планшетами.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы Актюбинской области колебалась в пределах 1,3–2,6 Бк/м². Средняя величина плотности выпадений составила 1,9 Бк/м², что не превышает предельно-допустимый уровень.

5. Химический состав атмосферных осадков на территории Актюбинской области

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 6 метеостанциях (Актобе, Аяккум, Жагабулак, Мугоджарская, Новороссийское, Шалкар). Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ, в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).


В пробах осадков преобладало содержание сульфатов 27,9%, гидрокарбонатов 25,5%, хлоридов 16,9%, ионов кальция 12,8 %, ионов натрия 7,6% ионов магния 3,6% и ионов калия 3,4 %.

Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Новороссийское – 294,93 мг/л, наименьшая – 29 мг/л на МС Жагабулак.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась в пределах от 55,1 мкСм/см (МС Жагабулак) до 520,9 мкСм/см (МС Новороссийское).

Кислотность выпавших осадков имеет характер слабокислой и нейтральной и находится в пределах от 6,19 (МС Шалкар) до 6,9 (МС Актобе).

Приложение 1



Карта мест расположения постов наблюдения и метеостанции г. Актобе



Карта места расположения точки отбора п. Кирпичный, район СШ №18



Карта места расположения точки отбора п. Ясный, район школы-гимназии №41

20 км ниже города Актобе, 2,0 км ниже с. Георгиевка, 0,5 км ниже выхода подземных вод.	4 класс	Аммоний-ион – 1,34 мг/дм ³ . Фенолы – 0,0011 мг/дм ³ . Фактические концентрации аммоний-иона превышают фоновый класс. Фактическая концентрация фенолов не превышает фоновый класс.
1,0 км на юго-восток п.Целинный, на левом берегу р. Елек.	4 класс	Аммоний-ион – 1,24 мг/дм ³ . Фенолы – 0,002 мг/дм ³ . Хром*(6+) – 0,096 мг/дм ³ . Фактические концентрации аммоний-иона, фенолов и хром*(6+) превышают фоновый класс.
река Каргалы	Температура воды отмечена 0°С, водородный показатель 8, концентрация растворенного в воде кислорода 9,28 мг/дм ³ , БПК ₅ 3,93 мг/дм ³ , запах – 0 балл.	
п. Каргалинский, в западной части поселка в 1 км ниже впадения правого притока р. Бутак:	4 класс	Аммоний-ион – 1,13 мг/дм ³ Магний – 33 мг/дм ³ Фенолы – 0,0017 мг/дм ³ . Фактические концентрации магний и фенолов превышают фоновый класс. Фактические концентрации аммоний-иона не превышают фоновый класс.
река Эмба	Температура воды отмечена в пределах 0 °С, водородный показатель 7,86, концентрация растворенного в воде кислорода 10,86 – 12,32 мг/дм ³ , БПК ₅ 2,94 – 3,52 мг/дм ³ , запах – 0 балл.	
п. Жагабулак, 1,0 км на северо-запад отп. Жагабулак	4 класс	Аммоний-ион – 1,17 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0011 мг/дм ³ Фактическая концентрация аммоний-иона и фенолов не превышает фоновый класс.
п. Сага, 1,0 км к юго-западу от поселка	4 класс	Аммоний-ион – 1,11 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0012 мг/дм ³ Фактическая концентрация аммоний-иона превышает фоновый класс. Фактическая концентрация фенолов не превышает фоновый класс.
река Темир	Температура воды отмечена в пределах 0°С, водородный показатель 8,01 – 8,05 , концентрация растворенного в воде кислорода 11,8 – 12,94 мг/дм ³ , БПК ₅ 2,05 – 2,3 мг/дм ³ , запах – 0 баллов во всех створах.	
с. Покровское, вс. Покровское, в 400 м ниже впадения левого притока р. Чилисай	4 класс	Аммоний-ион – 1,23 мг/дм ³ Магний – 34 мг/дм ³ Фенолы – 0,002 мг/дм ³ . Фактические концентрации аммоний-иона, магний и фенолов превышают фоновый класс.
с. Ленинское, в 9 км ниже селения, в 2 км ниже устья левобережного притока р. Кульден-Темир	4 класс	Аммоний-ион – 1,48 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0018 мг/дм ³ Фактическая концентрация аммоний-иона превышает фоновый класс. Фактическая концентрация фенолов не превышает фоновый класс.
река Орь	Температура воды 0°С, водородный показатель 8, концентрация	

	растворенного в воде кислорода 7,70 мг/дм ³ , БПК ₅ 2,92 мг/дм ³ , прозрачность 21 см, запах 0 балл.	
с. Бугетсай, 0,3 км ниже села, 0,2 км ниже впадения р. Богетсай	4 класс	Аммоний-ион – 1,28 мг/дм ³ . Магний – 37 мг/дм ³ Фенолы* – 0,002мг/дм ³ . Фактическая концентрация аммоний иона и магний превышает фоновый класс. Фактическая концентрация фенолов не превышает фоновый класс.

* - вещества для данного класса не нормируются

Приложение 3

Результаты качества поверхностных вод озер на территории Актюбинской области

	Наименование ингредиентов	Единицы измерения	октябрь 2021
			озеро Шалкар
1	Визуальные наблюдения		
2	Температура	°С	4,8
3	Водородный показатель		8,15
4	Растворенный кислород	мг/дм ³	8,15
5	Запах воды	балл	2
6	БПК ₅	мг/дм ³	0,72
7	ХПК	мг/дм ³	23,35
8	Взвешенные вещества	мг/дм ³	24,66
9	Гидрокарбонаты	мг/дм ³	290
10	Жесткость	мг/дм ³	3,74
11	Минерализация	мг/дм ³	883
12	Натрий + калий	мг/дм ³	223
13	Сухой остаток	мг/дм ³	1500
14	Кальций	мг/дм ³	38
15	Магний	мг/дм ³	22
16	Сульфаты	мг/дм ³	60
17	Хлориды	мг/дм ³	250
18	Фосфат	мг/дм ³	0,021
19	Фосфор общий	мг/дм ³	0,024
20	Азот нитритный	мг/дм ³	0,082
21	Азот нитратный	мг/дм ³	0,019
22	Железо общее	мг/дм ³	0,016
23	Аммоний солевой	мг/дм ³	2,30
24	Свинец	мг/дм ³	0,007
25	Медь	мг/дм ³	0,009
26	Цинк	мг/дм ³	0,013
27	АПАВ /СПАВ	мг/дм ³	0,02
28	Фенолы	мг/дм ³	0,003
29	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,01

Приложение 4

Справочный раздел

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м ³		Класс опасности
	максимально разовая	средне-суточная	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м ³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	
Хлористый водород	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фтористый водород	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года №ҚР ДСМ-70. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 августа 2022 года № 29011.

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, % ИЗА	0-1 0 0-4
II	Повышенное	СИ НП, % ИЗА	2-4 1-19 5-6
III	Высокое	СИ НП, % ИЗА	5-10 20-49 7-13
IV	Очень высокое	СИ НП, % ИЗА	>10 >50 >14

РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

Категория (вид) водопользования	Назначение/тип очистки	Классы водопользования				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Рыбохозяйственное водопользование	Лососевые	+	+	-	-	-
	Карповые	+	+	-	-	-
Хозяйственно-питьевое водопользование	Простая водоподготовка	+	+	-	-	-
	Обычная водоподготовка	+	+	+	-	-
	Интенсивная водоподготовка	+	+	+	+	-
Рекреационное водопользование (культурно-бытовое)		+	+	+	-	-
Орошение	Без подготовки	+	+	+	+	-
	Отстаивание в картах	+	+	+	+	+
Промышленность:						
технологические цели, процессы охлаждения		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
добыча полезных ископаемых		+	+	+	+	+
транспорт		+	+	+	+	+

Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №151 от 09.11.2016)

Норматив радиационной безопасности*

Нормируемые величины	Пределы доз
Эффективная доза	Население
	1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год

*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву

Наименование вещества	Предельно-допустимая концентрация (далее-ПДК) мг/кг в почве
Свинец(валовая форма)	32,0
Медь (подвижная форма)	3,0
Медь (валовая форма)	33
Хром(подвижная форма)	6,0
Хром ⁺⁶	0,05
Марганец (валовая форма)	1500
Никель (подвижная форма)	4,0
Цинк (подвижная форма)	23,0
Мышьяк (валовая форма)	2,0

*Совместный приказ Министерства здравоохранения РК от 30.01.2004 г. №99 и Министерства охраны окружающей среды РК от 27.01.2004 г. №21-п

ФИЛИАЛ РГП «КАЗГИДРОМЕТ» ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДРЕС:

ГОРОД АКТОБЕ
УЛ. АВИАГОРОДОК 14 В
ТЕЛ. 8-(7132)-22-85-72.

E MAIL:HIMLABACGM@MAIL.RU