

Атырау облысы бойынша қоршаған орта жай-күйі жөніндегі ақпараттық бюллетені

наурыз, 2023 жыл



**Қазақстан Республикасы Экология,
геология және табиғи ресурстар министрлігі
«Қазгидромет» РМК Атырау облысы
бойынша филиалы**

	МАЗМҰНЫ	Бет.
	Алғы сөз	3
1	Атмосфералық ауаның ластануының негізгі көздері	4
2	Атмосфералық ауаның ластану жай-күйі	4
3	Жер үсті суларының сапасының жай-күйі	12
4	Атмосфералық жауын-шашын сапасының жай-күйі	13
5	Радиациялық жағдай	13
	Қосымша 1	14
	Қосымша 2	23
	Қосымша 3	24
	Қосымша 4	25

АЛҒЫ СӨЗ

Ақпараттық бюллетень Ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің бақылау желісінде қоршаған ортаның жай-күйіне мониторинг жүргізу бойынша "Қазгидромет" РМК мамандандырылған бөлімшелері орындастын жұмыстардың нәтижелері бойынша дайындалған.

Бюллетень мемлекеттік органдарды, жұртшылықты және халықты Атырау облысы аумағындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттандыруға арналған және ластану деңгейінде болып жатқан өзгерістер үрдісін ескере отырып, ҚР Қоршаған ортаны қорғау саласындағы іс-шаралардың тиімділігін одан әрі бағалау үшін қажет.

Атырау қаласының атмосфералық ауа сапасын бағалау

1. Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері

Атырау облысы экология департаментінің хабарлауынша, Атырау қаласындағы ластанудың негізгі көздері мұнай өндеу, тасымалдау объектілері болып табылады: "Атырау мұнай өндеу зауыты", "Тенізшевройл", "Атыраумұнаймаш", "Ембімұнайгаз", "Интергаз-Орталық Азия". Бұдан басқа, қалада қаланың жел соғатын екі жағында орналасқан өндірістік төгінділерді жинақтауыш екі тоған бар (солтүстік-батыс жағы - "квадратный" жинақтауыш тоғаны және шығыс жағы - "Тухлая балка"). Жинақтағышқа барлық қалалық төгінділер іс жүзінде тазартусыз жүзеге асырылады, нәтижесінде күкіртсүтектің негізгі көзі – жинақтағыш қалыптасады, онда органикалық заттардың, оның ішінде мұнай өнімдерінің ыдырау процестері жүреді.

Атырау облысында бірінші санаттағы 142 кәсіпорын бар. 2020 жылы кәсіпорындардан нақты жиынтық шығарындылар 150,07 мың тоннаны құрады.

Атырау қаласы, Құлсары қаласы және Мақат ауданы табиғи газбен толық қамтамасыз етілген.

"КазТрансГазАймақ" АҚ АӨФ деректеріне сәйкес Атырау қаласы бойынша автономды қазандықтар – 80 030 бірлік, Мақат ауданы бойынша – 1783 бірлік.

2. Атырау қаласындағы атмосфералық ауа сапасының мониторингі.

Атырау қаласы аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 6 бақылау бекетінде, оның ішінде 2 бекетте сынаманы қолмен күшімен алу және 4 автоматты станцияда жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы қала бойынша Атмосфералық ауа мониторингі 16 көрсеткіш бойынша жүргізіледі: 1) қалқыма бөлшектер (шан); 2) PM-2,5 қалқыма бөлшектер; 3) PM-10 қалқыма бөлшектер; 4) күкірт диоксиді; 5) көміртегі оксиді; 6) азот диоксиді; 7) азот оксиді; 8) аммиак; 9) күкірт сутегі; 10) озон; 11) фенол; 12) формальдегид; 13) бензол; 14) толуол; 15) этилбензол; 16) ортоксиол.

1-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

1 кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

№	Сынама мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	Тәулігіне 3 мезгіл	қол күшімен алынған сынама (дискреттік әдіс)	Самал ықшам ауданы А.Кекілбаев көшесі 15	қалқыма бөлшектер (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, күкірттісутегі, фенол, аммиак, формальдегид, бензол, толуол, этилбензол, ортоксиол (C2H6)
5			Құрсай ықшам ауданы Карабау көшесі 12	қалқыма бөлшектер (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, күкірттісутегі, фенол, аммиак, формальдегид
6	әр 20 минут		Жұлдыз ықшам	қалқыма бөлшектер PM-2,5 қалқыма бөлшектер PM-10, озон

	сайын үзіліссіз режимде	үзіліссіз режимде	ауданы 6-шы көше 29	
8			Сырдария 3 ауданы	қалқыма бөлшектер РМ-10 және РМ-2,5, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, аммиак
9			Береке шағын ауданы, Береке өндірістік ауданы	қалқыма бөлшектер РМ-10 және РМ-2,5, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, озон
10			Атырау қ., Нұрсая ш/а (АРЕС колледжі)	күкірт диоксиді, азот диоксиді, күкірттісутегі, көміртегі оксиді

2023 жылғы наурыз айының Атырау қаласының атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері.

Атмосфералық ауа сапасы. Атырау қаласының атмосфералық ауаның ластану деңгейі стандарттық индекс бойынша «көтеріңкі» (СИ=1,6); ең жоғары қайталануы «көтеріңкі» деңгей (ЕЖҚ=17%) болып бағаланды.

Орташа-бірлік шоғырлары қалқыма бөлшектер (шан) -2,46 ШЖШ.т., басқа ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Максималды-бірлік шоғырлары қалқыма бөлшектер (шан) – 1,6 ШЖШ.б., қалқыма бөлшектер РМ-2,5 – 1,2 ШЖШ.б., күкірттісутегі – 1,5ШЖШ.б. Басқа ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖК астам) және ЭЖЛ (50 ШЖК астам) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асу еселігі және максималды жоғары жағдайлары 2-кестеде көрсетілген.

2 кесте

Кесе	Орташа шоғыр (Qо.т.)		Максималды- бірлік шоғыры (Qм.б.)		ЕЖҚ	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/МЗ	ШЖШ о.т. асу еселігі	МГ/МЗ	ШЖШ м.б. асу еселігі		%	> ШЖ III	>5 Ш Ж III
Атырау қаласы								
Қалқыма бөлшектер (шан)	0,16	1,1	0,80	1,6	17	23	0	0
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері	0,02	0,58	0,20	1,2	0	27	0	0
РМ-10 қалқыма бөлшектері	0,02	0,37	0,22	0,75	0	0	0	0
Күкірт диоксиді	0,01	0,13	0,02	0,03	0	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,21	0,07	0,80	0,16	0	0	0	0
Азот диоксиді	0,01	0,23	0,04	0,18	0	0	0	0
Азот оксиді	0,001	0,02	0,01	0,03	0	0	0	0
Озон (жербеті)	0,02	0,56	0,10	0,66	0	0	0	0
Күкіртті сутегі	0,004		0,01	1,5	0	9	0	0
Фенол	0,002	0,69	0,003	0,30	0	0	0	0
Аммиак	0,006	0,16	0,01	0,06	0	0	0	0

Формальдегид	0,002	0,21	0,003	0,06	0	0	0	0
Бензол	0,00004	0,0004	0,0001	0,0003	0	0	0	0
Толуол	0,0001		0,0004	0,001	0	0	0	0
Этилбензол	0,00004	0,002	0,0002	0,01	0	0	0	0
Ортоксиол (C2H6)	0,00003		0,0001	0,0003	0	0	0	0

Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы

Қорытынды:

Соңғы бес жыл ішінде ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді



Кестеден көріп отырғанымыздай, соңғы бес жылда наурыз айында Атырау қаласы бойынша ауаның ластану деңгейі 2020, 2022 және 2023 жылдары «көтеріңкі», ал 2019 жылы «жоғары» 2021 жылы ауаның ластану деңгейі «өте жоғары» болып бағаланды.

Ең жоғары бір реттік ШЖШ артуының ең көп саны күкірттісуге (9 жағдай), қалқыма бөлшектер (шан) (23 жағдай), қалқыма бөлшектер PM-2,5 (27 жағдай) болып тіркелді.

Ауаның күкіртті сутегімен ластануының негізгі көзіне айналған қаланың сол жақ бөлігінде орналасқан, өндірістік төгінділерді жинақтаушы «Тухлая балка» тоғаны мен мұнай өндеу және тасым алдау өндірістік нысандары өз әсерін тигізуде.

Сонымен қатар, қалқыма бөлшектерінің концентрациясының жоғарылауына, аймақтағы жиі қайталанатын жел екпінінің себебінен, жердің бетінен шан көтерілуіне ықпал етеді.

2.1 Метеорологиялық жағдайы

Атырау облысы айдың бірінші декадасында циклон ойпатында болды, фронтальды учаскелердің өтуімен тұрақсыз ауа райы байқалып, жаңбыр жауды, тұман, көктайғақ байқалды.

2.2 Құлсары қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай күйі

Құлсары қаласы аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1 стационарлық станцияда жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы қала бойынша Атмосфералық ауа мониторингі 7 көрсеткіш бойынша жүргізіледі: 1) *PM-10 қалқыма бөлшектер*; 2) *күкірт диоксиді* 3) *көміртегі оксиді*; 4) *азот диоксиді*; 5) *азот оксиді*; 6) *озон*; 7) *аммиак*.

З-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

3 кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

Бекет №	Сынама мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
7	әр 20 минут сайын үзілліссіз режимде	үзілліссіз режимде	Махамбет Өтемісов көшесі, 37А	қалқыма бөлшектер PM-10, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, озон (жер үсті қабаты)

2023 жылғы наурыз айының Құлсары қаласындағы атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері.

Атмосфералық ауа сапасы. Құлсары қаласының атмосфералық ауаның ластану стандарттық индексі «төмен» деңгей (СИ=1,0); ең жоғары қайталануы «төмен» деңгей (ЕЖК=0%) болып бағаланды.

Максималды-бірлік шоғырлары озон (жер үсті қабаты) бойынша – 1,0 ШЖШм.б.

Орташа-бірлік озон (жер үсті қабаты)-2,8ШЖШо.т., басқа ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖК астам) және ЭЖЛ (50 ШЖК астам) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асу еселігі және максималды жоғары жағдайлары 4-кестеде көрсетілген.

4-кесте

Қоспа	Орташа шоғыр (Qо.т.)		Максималды-бірлік шоғыры (Qм.б.)		Е Ж К %	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	мг/м3	ШЖШ о.т. асу еселігі	мг/м3	ШЖШ м.б. асу еселігі		> ШЖ Ш	>5 ШЖ Ш	>10 ШЖ Ш
Құлсары қаласы								
PM-10 қалқыма бөлшектері	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Күкірт диоксиді	0,01	0,19	0,03	0,05	0	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,20	0,07	4,91	0,98	0	0	0	0
Диоксид азота	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Оксид азота	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Озон (жербеті)	0,08	2,8	0,16	1,0	0	6	0	0

Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы

Корытынды:

Соңғы бес жыл ішінде ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, Құлсары қаласы бойынша ауаның ластану деңгейі соңғы бес жылда ақпан айында айтартлықтай өзгерген жоқ, 2020 жылдан бастап 2023 жылдары аралығында ауаның ластануы «төмен» деңгейде бағаланды. Ал 2019 жылы ауа сапасының ластану көрсеткіші «көтеріңкі» деңгейге жетті.

2.3 Мақат ауданы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай күйі

Мақат ауданы аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1 стансада жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы аудан бойынша атмосфералық ауа мониторингі 6 көрсеткішке дейін анықталады 1) *PM-2,5 қалқыма бөлишектер*; 2) *PM-10 қалқыма бөлишектер* 3) *кукірт диоксиді*; 4) *азот диоксиді*; 5) *кукірттисутегі*; 6) *көміртегі оксиді*.

5-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

5 кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

Бекет №	Сынама мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	әр 20 минут сайын үзіліссіз режимде	үзіліссіз режимде	Мақат ауылы, Мақат ауданының Мәдениет үйі, Алаш көшесі, 23	кукірт диоксиді, азот диоксиді, күкірттисутегі, көміртегі оксиді.

2023 жылғы наурыз айының Мақат ауданындағы атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері.

Атмосфералық ауа сапасы. Мақат ауданының атмосфералық ауаның ластану деңгейі стандарттық индекс бойынша «төмен» ($СИ=0,5$); ең жоғары қайталануы «төмен» деңгей (ЕЖК=0%) болып бағаланды.

Орташа-бірлік азот диоксиді бойынша – 2,43 ШЖШ.т. басқа ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖК астам) және ЭЖЛ (50 ШЖК астам) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асу еселігі және максималды жоғары жағдайлары б-кестеде көрсетілген.

6-кесте

Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр (Qо.т.)		Максималды-бірлік шоғыры (Qм.б.)		ЕЖК %	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	мг/м3	ШЖШ о.т. асу еселігі	мг/м3	ШЖШ м.б. асу еселігі		> ШЖ III	>5 ШЖ III	>10 ШЖ III
Мақат ауданы								
Күкірт диоксиді	0,0000	0,00	0,0000	0,0	0,0	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,1980	0,07	0,1980	0,0	0,0	0	0	0
Диоксид азота	0,0970	2,43	0,0970	0,5	0,0	0	0	0
Күкірттісугеі	0,0000		0,0000	0,0	0,0	0	0	0

2.4 Индер ауданы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай күйі

Индер ауданы аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1 стансада жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы аудан бойынша атмосфералық ауа мониторингі 6 көрсеткішке дейін анықталады: 1) $PM-2,5$ қалқыма бөлшектер; 2) $PM-10$ қалқыма бөлшектер 3) күкірт диоксиді; 4) азот диоксиді; 5) күкірттісугеі; 6) көміртегі оксиді.

7-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

7 кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

Бекет №	Сынама мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	әр 20 минут сайын үзіліссіз режимде	үзіліссіз режимде	Индербор ауданы, Индербор Мәдениет үйі, Н. Мендіғалиев көшесі 47	күкірт диоксиді, азот диоксиді, күкірттісугеі, көміртегі оксиді.

2023 жылғы наурыз айының Индербор ауданының атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері.

Атмосфералық ауа сапасы. Индер ауданының атмосфералық ауаның ластану деңгейі стандарттық индекс бойынша **төмен** ($СИ=0$); ең жоғары қайталануы «төмен» деңгей (ЕЖК=0%) болып бағаланды.

Барлық ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асу еселігі және максимальды жоғары жағдайлары 8-кестеде көрсетілген.

8-кесте

Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр (Qo.t.)		Максимальды- бірлік шоғыры (Qm.b.)		ЕЖҚ	ШЖШ арту жағдайларыны н саны		
	мг/м3	ШЖШ о.т. асу еселігі	мг/м3	ШЖШ м.б. асу еселігі		%	> ШЖ Ш	>5 Ж Ш
Индер ауданы								
Күкірт диоксиді	0,0000	0,00	0,0000	0,0	0,0	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,0000	0,00	0,0000	0,0	0,0	0	0	0
Диоксид азота	0,0000	0,00	0,0000	0,0	0,0	0	0	0
Күкірттісугеңі	0,0000		0,0000	0,0	0,0	0	0	0

2.5 Жанбай кенті бойынша атмосфералық ауаның ластану жай күйі

Жанбай селосы аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1 стансада жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы кент бойынша атмосфералық ауа мониторингі 6 көрсеткішке дейін анықталады: 1) *PM-2,5 қалқыма бөлшектер*; 2) *PM-10 қалқыма бөлшектер* 3) *күкірт диоксиді*; 4) *азот диоксиді*; 5) *күкірттісугеңі*; 6) *көміртегі оксиді*.

9-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

9 кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

Бекет №	Сынама мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	әр 20 минут сайын	үзіліссіз режимде	Жанбай кенті, Т.Нысанов көшесі 96 участкесі	күкірт диоксиді, азот диоксиді, күкірттісугеңі, көміртегі оксиді.

2023 жылғы наурыз айының Жанбай кенті атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері.

Атмосфералық ауа сапасы. Жанбай кенті бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі стандарттық индекс бойынша «төмен» (СИ=1,8); ең жоғары қайталануы «көтеріңкі» деңгей (ЕЖҚ=1%) болып бағаланды.

Максимальды-бірлік шоғырлары озон қүкірт диоксиді бойынша – 1,2 ШЖШм.б., күкірттісугеңі-1,8 ШЖШм.б. басқа ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асу еселігі және максимальды жоғары жағдайлары 10-кестеде көрсетілген.

10-кесте

Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр (Qо.т.)		Максималды- бірлік шоғыры (Qм.б.)		ЕЖҚ	ШЖШ арту жағдайларын ың саны		
	МГ/М3	ШЖШ о.т. асу еселігі	МГ/М3	ШЖШ м.б. асу еселігі		%	> ШЖ III	>5 Ш Ж III
Жанбай кенті								
Күкірт диоксиді	0,0308	0,62	0,6042	1,2	0,2	4	0	0
Көміртегі оксиді	0,8137	0,27	2,2532	0,5	0,0	0	0	0
Диоксид азота	0,0301	0,75	0,1512	0,8	0,0	0	0	0
Күкірттісугеі	0,0015		0,0147	1,8	1,2	27	0	0

2.6 Ганюшкино кенті бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Ганюшкино поселкесі аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1 стансада жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы кент бойынша атмосфералық ауа мониторингі 6 көрсеткішке дейін анықталады: 1) *PM-2,5 қалқыма бөлшектер*; 2) *PM-10 қалқыма бөлшектер* 3) *күкірт диоксиді*; 4) *азот диоксиді*; 5) *күкірттісугеі*; 6) *көміртегі оксиді*.

11-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

11 кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

Бекет №	Сынама мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	әр 20 минут сайын үзіліссіз режимде	үзіліссіз режимде	Құрманғазы (Ганюшкино) кенті Құрманғазы ауданының Мәдениет үйі, Абай көшесі, 50-үй	күкірт диоксиді, азот диоксиді, күкірттісугеі, көміртегі оксиді.

2023 жылғы наурыз айының Ганюшкино кенті атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері.

Атмосфералық ауа сапасы. Ганюшкино кенті бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі стандарттық индекс бойынша «төмен» (СИ=0); ен жоғары қайталануы «төмен» деңгей (ЕЖҚ=0%) болып бағаланды.

Барлық ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асу еселігі және максималды жоғары жағдайлары 12-кестеде көрсетілген.

12-кесте

Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр (Qо.т.)	Максималды- бірлік шоғыры (Qм.б.)	Е Ж Қ	ШЖШ арту жағдайларының саны
-------	-------------------------	---	-------------	-----------------------------------

	МГ/МЗ	ШЖШ О.Т. АСУ ЕСЕЛІГІ	МГ/МЗ	ШЖШМ.Б. . АСУ ЕСЕЛІГІ	%	> ШЖ III	>5 ШЖ III	>10 ШЖ III
Ганюшкино кенті								
Күкірт диоксиді	0,0000	0,00	0,0000	0,0	0,0	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,0000	0,00	0,0000	0,0	0,0	0	0	0
Диоксид азота	0,0000	0,00	0,0000	0,0	0,0	0	0	0
Күкірттісугеі	0,0000		0,0000	0,0	0,0	0	0	0

3. Атырау облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторингі

Атырау қаласы бойынша жер үсті суларының сапасын бақылау 5 су объектісінің (Жайық, Қиғаш өзендері, Шаронова арнасы, Перетаска және Яик арналары) 20 тұстамасында жүргізілді.

Жер үсті суларын зерттеу кезінде су сынамаларында су сапасының **39** физикалық және химиялық көрсеткіштері анықталады: *көзбен шолып бақылау, температура, қалқыма заттар, мөлдірлігі, түсі, сутегі көрсеткіші (рН), еріген оттегі, ОВТ5, ОХТ, құргақ қалдық, құрамында тұз бар негізгі иондар, биогенді элементтер, органикалық заттар (мұнай өнімдері, фенолдар), ауыр металдар*.

Атырау облысы аумағындағы гидробиологиялық көрсеткіштер бойынша жер үсті және теңіз сулары сапасының жай-күйіне мониторинг 5 тұстамада З су объектісінде (Жайық, Қиғаш өзендері және Шаронов ағысында) жүргізілді. Зерттелетін объектіге судың өткір уыттылығын анықтауға арналған 15 сынама талданды.

3.1 Атырау облысы аумағындағы жер үсті сулар гидрохимиялық көрсеткіштері бойынша сапасының мониторинг нәтижелері.

Қазақстан Республикасының су объектілерінің су сапасын бағалауға арналған негізгі нормативтік құжаттар «Су объектілерінде судың сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі» (бұдан әрі - Бірыңғай жіктеме) болып табылады.

Су объектілерінің су сапасы Бірыңғай жіктеме бойынша келесідей бағаланады:

3 кесте

Су объектісінің атауы	Су сапасының класы		Параметрлері	өл. бір.	концентрациясы
	Наурыз 2022 ж.	Наурыз 2023 ж.			
Жайық өз.	4 класс	4 класс	Магний	МГ/ДМ ³	33,5
Перетаска тарм.	4 класс	4 класс	Магний	МГ/ДМ ³	51,7
Яик тарм.	4 класс	4 класс	Магний	МГ/ДМ ³	62,0
Қиғаш өз.	3 класс	нормаланбайды (>5 класс)	Қалқыма заттар	МГ/ДМ ³	247,0
Шаронова өз	4 класс	3 класс	Магний	МГ/ДМ ³	27,0

Кестеден көріп отырғанымыздай, 2022 жылдың наурызымен салыстырғанда жер үсті суларының сапасы Шаронова тармағы 4 кластан 3 класқа өтті – жақсарды. Қиғаш өзенінің су сапасы 3 кластан 5 класқа жоғары өтті - нашарлады.

Жайық өзенінің, Перетаска мен Яик тармақтарының жер үсті суларының сапасы айтарлықтай өзгерген жоқ.

Атырау облысы бойынша су объектілеріндегі негізгі ластаушы заттар магний мен қалқыма заттар болып табылады.

3.2 Атырау облысы аумағындағы жер үсті мен теңіз суларының гидробиологиялық (токсикологиялық) көрсеткіштері бойынша сапасының мониторинг нәтижелері.

Жайық өзені.

Биотестілеу. Биотестілеу деректері бойынша Жайық өзені бойынша тест-параметр бақылау нұктелерінің жүйелі орналасуында ұсынылды: Дамба кенті - 0%, Атырау қаласы "Атырау су арнасы" КМК төгіндісінен 0,5 км төмен - 0%, Индер кенті "су бекеті тұстамасында" - 0%. Алынған мәліметтер зерттелетін судың сынақ объектісіне уытты әсерінің жоқтығын көрсетеді.

Шаронов тармағы.

Биотестілеу. Сынақ объектісіне судың жіті уыттылығын анықтау процесінде ағындағы бақылауға (тест - параметр) қатысты өлген дафниялардың пайызы - 0%. Сынақ объектісіне уытты әсер анықталған жоқ.

Қиғаш өзені.

Биотестілеу. Қиғаш өзені бойынша биотестілеу барысында алынған деректер тест-объектіге уытты әсерінің жоқтығын көрсетті. Зерттелген суда тірі қалған дафниялардың саны 100% құрады. Тест параметрі-0%.

Су объектілерінің сапасы жөніндегі ақпарат тұстамалар шегінде токсикологиялық көрсеткіштер бойынша 3-қосымшада көрсетілген.

4. Атырау облысының аумағындағы атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамы

Атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамына бақылау З метеостанцияда (Атырау, Ганюшкино, Пешной) алынған жаңбыр суына сынама алумен (4.3-сурет) жүргізді.

Жауын-шашын құрамында барлық анықталатын заттардың шоғырлары шекті рұқсат етілген шоғырлардан аспады.

Жауын-шашын сынамаларында 28,34% сульфаттар, 12,22% хлоридтер, 30,19% гидрокорбанаттар, 1,39% аммоний иондары, 8,34% натрий иондары, 4,18% калий иондары, 2,34% магний иондары, 11,52% кальций иондары басым болды.

Ең үлкен жалпы минерализация Пешной МС – 34,12 мг/л, ең азы Ганюшкино МС 34,99 мг/л белгіленді.

Атмосфералық жауын-шашынның меншікті электр өткізгіштігі 65,0 (Ганюшкино МС) бастап 230,1 мкСм/см (Атырау МС) шегінде болды.

Жауын-шашынның қышқылдығы әлсіз сілтілі орта сипатына ие, 6,39-ден (Ганюшкино МС) 7,12-ге (Атырау МС) дейін.

5. Радиациялық жағдай


Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын жергілікті 3 метеорологиялық стансада (Атырау, Пешной,

Құлсары) және Құлсары қаласының 1 автоматты (№7 ЛББ) бекетінде жүргізіледі.


Атырау және Құлсары қалалары бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатына орташа радиациялық гамма-фонның мәні 0,08-0,14 мкЗв/сағ (норматив - 5 мкЗв/сағ дейін). Облыс бойынша радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,11 мкЗв/сағ., яғни шекті жол берілетін деңгейінен аспады.

Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің тұсу тығыздығына бақылау Атырау облысында метеорологиялық станцияда (Атырау) ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды. Стансада бес тәуліктік сынама жүргізілді. Атырау қаласында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің тұсу тығыздығы 1,3-2,1 Бк/м² шегінде болды. Облыс бойынша радиоактивті тұсулердің орташа тығыздығы 1,7 Бк/м², бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.

Қосымша 1




Атырау қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық және жылжымалы желісінің орналасу сызбасы



Құлсары қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сыйбасы




Мақат ауданы атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сыйбасы



Индер ауданы атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы




Ганюшкіно поселкесі атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы



Жанбай селосы атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің
орналасу сыйбасы



Атырау облысының аумағындағы радиациялық гамма-фон мен радиоактивті түсулердің
тығыздығын бақылау метеостансаларының орналасу сыйбасы.



Атырау облысы аумағындағы атмосфералық жауын-шашын мен қар жамылғысын бақылау метеостансаларының орналасу сызбасы.

**Қазақстан Республикасы қоршаган ортасының жоғары (ЖЛ) және экстремалды жоғары ластануы (ЭЖЛ) туралы
наурыз айы бойынша 2023 жыл**

Атырау қаласындағы 70 ЖЛ (NCOC компаниясы ақпараты бойынша)

Қоспа	Күні, Айы, Жылы	Уақыты	Бекет нөмірі	Жоғары ластану - Атырау қаласы					Атмос фералық қысым	ЭРБК себебі
				Шоғыр	Жел	Темпе ратура, °C				
МГ/м³	ШЖШ-дан асу еселігі	Бағыт, град	Жылда мұнық, м/с							
Күкірт сүтегі	26.03. 2023	02:00	№ 110 Привокзальный (Еркінов к-сі)	0.16369	20.46064	-	-	9.75	1016.69	
		02:20	№ 108 ТКА (Телекоммуникация- лық мұнара аумағы)	0.07431	10.44905	127.70 Ш, ОШ	0.91	6.33	-	
		02:20	№ 111 Тұргын қалашық (Заполярная к-сі, Мұнайшылар үйі)	0.11163	13.95422	-	-	8.69	1013.19	
		02:40	№ 111 Тұргын қалашық (Заполярная к-сі, Мұнайшылар үйі)	0.08422	10.52782	-	-	8.50	1013.16	
		02:20	№ 112 Әкімат (Сәтпаев к-сі, Орталық көпір)	0.08388	10.48503	188.92 О	5.73	9.22	-	
		02:40		0.09397	11.74650	130.78 Ш, ОШ	4.62	8.92	-	
		02:40	№ 109 Восток (Махамбет к-сі, Күрманғазы аланы)	0.08891	11.11335	308.11 Б, СБ	0.95	9.93	1015.51	
		02:40	№ 113 Авангард (Женіс саябағы)	0.12966	16.20723	84.81 Ш, СШ	0.32	8.32	1014.20	
		03:00		0.10747	13.43360	84.10 Ш, СШ	0.22	7.54	1014.33	
		07:20		0.16806	21.00728	105.23 Ш	2.10	3.35	-	
		20:40	№ 102 Самал (Мақат ауданы, Вахта түріндегі Самал кенті)	0.10817	13.52068	-	-	14.95	1011.56	
		22:20		0.17745	22.18165	-	-	13.60	1011.40	
		23:00		0.09176	11.46997	-	-	12.44	1011.07	
		23:20		0.13546	16.93270	-	-	12.26	1010.95	
		23:40		0.12285	15.35625	-	-	12.49	1010.80	

Күкірт сутегі	27.03.2023	22:40	№ 117 Қарабатан (Қарабатан Теміржол стансасы)	0.08151	10.18914	117.12 III	3.98	14.05	1009.67		
		23:00		0.08399	10.49868	118.40 III	4.15	13.73	1009.42		
		27.03.2023	20:20	№ 102 Самал (Мақат ауданы, Вахта түріндегі Самал кенті)	0.08758	10.94705	-	-	17.48	1006.44	
		00:40	№ 102 Самал (Мақат ауданы, Вахта түріндегі Самал кенті)	0.10434	13.04290	-	-	12.56	1005.41		
		05:00	№ 103 Шағала (Смағұлов к-сі, Шағала комплексі)	0.14542	18.17711	271.20 Б	3.66	11.74	1005.56		
		05:20		0.13210	16.51233	273.70 Б	4.05	12.42	1005.83		
		05:40		0.11557	14.44665	272.59 Б	4.54	12.35	1006.09		
		05:00	№ 109 Восток (Махамбет к-сі, Құрманғазы аланы)	0.11557	14.44665	272.59 Б	4.54	12.35	1006.09		
		05:20		0.09308	11.63505	299.70 Б, СБ	3.18	11.75	1005.13		
		06:00		0.09600	12.00012	304.56 Б, СБ	3.53	12.47	1005.72		
	28.03.2023	06:00	№ 111 Тұрғын қалашық (Заполярная к-сі, Мұнайшылар үйі)	0.14398	17.99756	-	-	11.47	1002.58		
		06:20		0.17303	21.62844	-	-	11.41	1002.69		
		06:40		0.21135	26.41892	-	-	11.49	1002.84		
		07:00		0.23033	28.79077	-	-	11.46	1003.13		
		07:20		0.11534	14.41799	-	-	11.53	1002.52		
		09:00		0.13332	16.66557	-	-	12.18	1004.09		
		09:20		0.14910	18.63738	-	-	12.20	1004.19		
		09:40		0.14144	17.68057	-	-	12.20	1004.35		
		10:20		0.11485	14.35588	-	-	12.34	1004.39		
		10:40		0.10755	13.44414	-	-	12.00	1004.34		
		11:00		0.09614	12.01741	-	-	11.79	1004.44		
	05:00	№ 112 Әкімат (Сәтпаев к-сі, Орталық көпір)		0.17071	21.33927	-	-	11.84	-		
		05:20		0.15886	19.85775	-	-	12.53	-		
		05:40		0.11017	13.77116	-	-	12.37	-		

		06:00		0.11498	14.37234	-	-	12.20	-		
		06:20	№ 113 Авангард (Женіс саябагы)	0.10654	13.31726	148.87 ОШ	2.51	11.75	1004.36		
		07:20		0.13979	17.47417	140.50 ОШ	3.16	11.86	1004.31		
		10:00		0.10968	13.70945	147.57 ОШ	1.70	12.50	1005.99		
		12:20		0.1094	13.6	141 ОШ	1.60	11.60	1006.98		
		04:40		0.12498	15.62263	261.33 Б	1.80	10.42	1003.30		
	29.03. 2023	03:20	№ 113 Авангард (Женіс саябагы)	0.0908	11.3	128 III, ОШ	0.80	8.08	1007.21		
		04:20		0.1215	15.2	228 ОБ	0.71	7.16	1007.21		
		04:40		0.2184	27.3	235 Б, ОБ	0.54	6.37	1007.25		
		05:00		0.1071	13.3	154 ОШ	0.46	5.95	1006.92		
		05:40		0.0995	12.4	233 ОБ	1.10	5.26	1007.49		
		06:00		0.0900	11.2	148 ОШ	0.66	5.29	1007.09		
		06:20		0.1074	13.4	114 III	0.94	5.24	1006.96		
		06:40		0.0889	11.1	135 ОШ	0.80	5.53	1007.21		
		07:00		0.0813	10.1	151 ОШ	0.50	5.50	1007.13		
		07:20		0.0976	12.2	131 III, ОШ	0.98	5.29	1007.18		
		07:40		0.0872	10.9	146 ОШ	0.98	4.95	1007.40		
Күкірт сүтегі		05:20	№ 111 Тұргын қалашық	0.0841	10.5	-	-	6.14	1005.61		
		06:00		0.1172	14.6	-	-	5.23	1005.80		
		06:20		0.0898	11.2	-	-	5.37	1005.64		

		06:40	(Заполярная к-сі, Мұнайшылар үйі)	0.1164	14.5	-	-	5.23	1005.46	
		07:00		0.1143	14.2	-	-	4.95	1005.47	
		07:20		0.1246	15.5	-	-	4.81	1005.50	
		07:40		0.0807	10.1	-	-	4.65	1005.49	
		06:00	№ 114 Загородная (Атырау-Орал тас жолы)	0.1344	16.8	244 Б, ОБ	1.29	5.23	1007.33	
		06:20		0.1473	18.4	265 Б	0.80	5.03	1007.24	
		06:40		0.1351	16.9	275 Б	0.95	4.91	1007.12	
		06:40	№ 103 Шағала (Смағұлов к-сі, Шағала комплексі)	0.0929	11.6	301 Б, СБ	1.14	5.78	1008.70	
		07:00		0.0867	10.8	288 Б, СБ	0.96	5.53	1008.58	
		06:40	№ 112 Әкімат (Сәтпаев к-сі, Орталық көпір)	0.1017	12.7	-	-	5.76	-	
		07:00		0.1100	13.7	-	-	5.48	-	
30.03. 2023	23:00	№ 117 Қарабатан (Қарабатан Теміржол стансасы)		0.0865	10.8	245 3, ЮЗ	2.67	11.36	1004.17	

Атырау облысы жер үсті су сапасының тұстамалар бойынша ақпараты

Су объектісі және тұстама	Физика-химиялық параметрлердің сипаттамасы	
Жайық өз.		судың температурасы 2,1-2,8°C шегінде, сутегі көрсеткіші 7,42-7,65, суда еріген оттегі – 8,6-9,4 мг/дм ³ , ОБТ5 – 2,0-2,7 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 20,2-22,2 см
Индер кенті	4 класс	магний – 33,2 мг/дм ³ . Магнийдің нақты концентрациясы фондық кластан асады
ҚазТрансОйл "АҚ"Индер" ЖЗҚ Жайық өзенінен 0,5 км жогары	3 класс	магний – 27,7 мг/дм ³
ҚазТрансОйл "АҚ"Индер" ЖЗҚ Жайық өзенінен 0,5 км төмен	4 класс	OХТ – 34,0 мг/дм ³
Береке ауылы Жайық өзенінен 0,5 км жогары	1 класс*	
Береке ауылы, Жайық өзенінен 0,5 км төмен	4 класс	магний – 46,2 мг/дм ³
Атырау қаласынан 1 км жогары	4 класс	OХТ – 35,0 мг/дм ³
Атырау қ., "Атырау су арнасы" КМК ағысынан 0,5 км жогары»	4 класс	магний – 55,2 мг/дм ³
Атырау қ., "Атырау су арнасы" КМК ағысынан 0,5 км төмен»	4 класс	магний – 56,1 мг/дм ³
Атырау қаласынан 1 км төмен	4 класс	магний – 48,6 мг/дм ³
"Орал-Атырау бекіре зауыты" РМҚҚ тасталуынан 3 км төмен Курилкино	4 класс	магний – 52,6 мг/дм ³
«Орал-Атырау бекіре зауыты» РМҚҚ тасталуынан 0,5 км жогары Курилкино	2 класс	ХПК – 23,8 мг/дм ³
Дамба кенті	4 класс	магний – 55,8 мг/дм ³ , OХТ – 31,7 мг/дм ³ . Магний мен OХТ нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Перетаска тармағы		судың температурасы 1,9-14,2°C, сутегі көрсеткіші 7,46-7,62, суда ерітілген оттегі – 8,8-9,1 мг/дм ³ , ОБТ5 – 2,0-2,5 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 21,5-22,1 см
Ағыстың тармақталуынан 0,5 км төмен Перетаска	4 класс	магний – 54,7 мг/дм ³
Атырау қ., "Атырау ЖЭО" АҚ тасталуынан 2 км жогары»	4 класс	магний – 46,9 мг/дм ³
Атырау қ., "Атырау ЖЭО" АҚ тасталуынан 2 км төмен»	4 класс	магний – 53,5 мг/дм ³
Яик тармағы		судың температурасы 1,9-2,1°C шегінде, сутегі көрсеткіші 7,54-7,62, суда еріген оттегі – 8,9-9,3 мг/дм ³ , ОБТ5 – 2,6-2,8 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 20,6-21,2 см
Ракуша с. Яик ағысының тармақталуынан 0,5 км төмен	4 класс	магний – 63,6 мг/дм ³
Еркінқала ауылы, "Атырау бекіре балық өсіру зауыты" РМҚҚ тасталуынан 0,5 км жогары»	4 класс	магний – 61,4 мг/дм ³
Еркінқала ауылы, "Атырау бекіре балық өсіру зауыты" РМҚҚ тасталуынан 0,5 км төмен»	4 класс	магний – 61,1 мг/дм ³

Шаронова тармағы	судың температуrasesы 2,0°C шегінде, сутегі көрсеткіші 7,56, суда еріген оттегі – 8,1 мг/дм3, ОБТ5 -2,3 мг/дм3, мөлдірлігі-21,2см		
өз.Шаронова – аул.Ганюшкино, су бекетінің тұсы	3 класс	магний – 27,0 мг/дм3. Магнийдің нақты концентрациясы фондық кластан асады.	
Қиғаш өзені	судың температуrasesы 2,2 °C шегінде, сутегі көрсеткіші 7,7, суда еріген оттегі- 8,2 мг/дм3, ОБТ5 -2,1 мг/дм3, мөлдірлігі-18,9 см, түстілігі-20,2 градус		
өз.Қиғаш – аул.Котяевка, су бекетінің тұсы	нормаланбайды класса)	(>5	қалқыма заттар – 247,0 мг/дм3. Қалқыма заттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.

Қосымша 3

Атырау облысының жер үсті мен теңіз сularының сапасының гидробиологиялық көрсеткіштері (уыттылық) жөнінде ақпарат

№	Су объектісі	Бақылау нүктесі	Бағдарлау нүктесі	Сапроб индексі		Су сапасы	Биотестілеу	
				Перифитон	бентос		Сынақ параметри, %	Суды бағалау
1	Жайық өзені	Атырау қаласы	«Атырау Су арнасы» КМК тастандыдан 0,5 км төмен	-	-	3	0%	Универсал
2		Индер ауданы	су бекетінің жармасында	-	-	3	0%	
3		Дамба кенті		-	-	3	0%	
4	Шаронов арнасы	Ганюшкино селосы	су бекетінің жармасында	-	-	3	0%	
5	Қиғаш өзені	Котяевка селосы	су бекетінің жармасында	-	-	3	0%	

Анықтамалық бөлім

Елді –мекен ауасындағы ластаушы заттардың шекті жол берілген шоғырлары (ШЖШ)

Наименование примесей	ШЖШ мәні, мг/м³		Қауіптілік класы
	Максималды бір ретті (ШЖШ _{М.б.})	Орта-тәуліктік (ШЖШ _{о.т.})	
Азот диоксиді	0,2	0,04	2
Азот оксиді	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/a/пирен	-	0,1 мкг/100 м³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Берилій	0,09	0,00001	1
Қалқыма бөлшектер (шан)	0,5	0,15	3
РМ 10 қалқыма бөлшектері	0,3	0,06	
РМ 2,5 қалқыма бөлшектері	0,16	0,035	
Хлорлы сутек	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Мыс	-	0,002	2
Күшән	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Қорғасын	0,001	0,0003	1
Күкірт диоксиді	0,5	0,05	3
Күкірт қышқылы	0,3	0,1	2
Күкіртсүтегі	0,008	-	2
Көміртегі оксиді	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фторлы сутек	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Мырыш	-	0,05	3

«Қалалық және ауылдық елді-мекендердегі атмосфералық ауага қойылатын гигиеналық нормативтер» (2022 жылғы 2 тамыз №ҚР ДСМ-70 СанЕН)

Атмосфералық ластану индексінің дәрежесін бағалау

Градациялар	Атмосфералық ауаның ластануы	көрсеткішетр	Айға бағалау
I	Төмен	СИ ЕЖК, %	0-1 0
II	Көтерінкі	СИ ЕЖК, %	2-4 1-19
III	Жоғары	СИ ЕЖК, %	5-10 20-49
IV	Өте жоғары	СИ ЕЖК, %	>10 >50

Мемлекеттік органдарды тұрғындар қоғамдастырыған ақпараттандыру үшін қалалардың атмосфера ластануының жай-күйі жөніндегі құжат 52.04.667-2005 БҚ. Әзірлеуге, салуға баяндауға және мазмұндауға қойылатын жалпы талаптар.

**ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГ ДЕПАРТАМЕНТІ
РМК «КАЗГИДРОМЕТ» АТЫРАУ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
МЕКЕН-ЖАЙ:
АТЫРАУ ҚАЛАСЫ
ТАЛҒАТ БИГЕЛЬДИНОВА 10А
ТЕЛ. 8-(7122)-52-20-96**

E MAIL: INFO_ATR@METEO.KZ