

# Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды г. Атырау

май, 2023 год



Министерство экологии и природных  
ресурсов Республики Казахстан  
Филиал РГП «Казгидромет»  
по Атырауской области

	<b>СОДЕРЖАНИЕ</b>	<b>Стр.</b>
	<b>Предисловие</b>	3
<b>1</b>	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
<b>2</b>	Состояние качества атмосферного воздуха	4
<b>3</b>	Состояние качества поверхностных вод	13
<b>4</b>	Химический состав атмосферных осадков	17
<b>5</b>	Радиационная обстановка	17
	<b>Приложение 1</b>	18
	<b>Приложение 2</b>	23
	<b>Приложение 3</b>	24
	<b>Приложение 4</b>	25
	<b>Приложение 5</b>	26
	<b>Приложение 6</b>	32

## **Предисловие**

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Атырауской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

## Оценка качества атмосферного воздуха в Атырауской области

### 1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

По сообщениям Департамента экологии Атырауской области основными источниками загрязнения в г. Атырау являются объекты нефтепереработки, транспортировки:

«Атырауский нефтеперерабатывающий завод», «Тенгизшевройл», «Атыраунефтемаш», «Эмбаунайгаз», «Интергаз-Центральная Азия». Кроме того, в городе имеется два пруда-накопителя производственных сбросов, расположенных с обеих подветриваемых сторон города (северо-западная сторона - пруд-накопитель «Квадрат» и восточная сторона – «Тухлая балка»). Все городские сбросы в накопитель осуществляются практически без очистки, в итоге формируется основной источник сероводорода – накопитель в 1000 гектаров, в котором идут процессы гниения органических веществ – канализационных стоков, в том числе нефтепродуктов.

В Атырауской области имеется 142 предприятий первой категории. Фактический суммарный выброс от предприятий за 2020 год составил 150,07 тыс. тонн.

Город Атырау, город Кульсары и Макатский район полностью снабжены природным газом.

Согласно данным АПФ АО «КазТрансгазАймак» автономных котельных по городу Атырау – 80 030 ед., по Макатскому району – 1783 ед.

### 2. Мониторинг качества атмосферного воздуха

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Атырау проводятся на 6 постах наблюдения, в том числе на 2 постах ручного отбора проб и на 4 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется по 16 показателям: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3) взвешенные частицы РМ-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) аммиак; 9) сероводород; 10) озон; 11) фенол; 12) формальдегид; 13) бензол; 14) толуол;

15) этилбензол; 16) ортоксилол (C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>).

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	3 раза в сутки	ручной отбор проб (дискретные)	мкр Самал, ул. А. Кекильбаева 15	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, фенол, аммиак, формальдегид, бензол, толуол,

		методы)		этилбензол, ортоксилол (C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> )
5			мкр Курсай, ул. Карабау строение12	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота сероводород, фенол, аммиак, формальдегид
6	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	в непрерывном режиме	мкр Жулдыз, 6-я улица, 29	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, озон
8			район Сырдарья 3	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота
9			мкр.Береке, район промзоны Береке	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода, диоксид и оксид азота озон
10			мкр Нурсая, пр. Елорда д. 24, территория ТОО «высший колледж АРЕС»	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород.

### Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Атырау за май 2023 года.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением **СИ** равным 4,2 (повышенный уровень) сероводороду в районе поста №10 и **НП=10%** (повышенный уровень) по озону в районе поста №6.

Максимально-разовые концентрации составили: взвешенные частицы (пыль)- 1,8 ПДК<sub>м.р.</sub>, взвешенные частицы РМ-2,5 – 1,1 ПДК<sub>м.р.</sub>, диоксида азота – 3,4 ПДК<sub>м.р.</sub>, озон-1,39 ПДК<sub>м.р.</sub>, сероводорода – 4,2 ПДК<sub>м.р.</sub>. По другим показателям превышений ПДК не наблюдалось.

Средние концентрации озон (приземный) составил – 1,74 ПДК<sub>с.с.</sub>, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.

Таблица 2


#### Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация	Максимальная разовая концентрация	НП	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>
---------	----------------------	-----------------------------------	----	--

	мг/м <sup>3</sup>	Кратнос ть ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратнос ть ПДК <sub>м.р.</sub>	%	>ПД К	>5 ПД К	>10 ПД К
<b>г. Атырау</b>								
Взвешенные вещества	0,15	1,02	0,90	1,8	6	8		
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,02	0,55	0,17	1,1	0	1		
Взвешенные частицы РМ-10	0,02	0,31	0,16	0,55	0			
Диоксид серы	0,03	0,58	0,26	0,51	0			
Оксид углерода	0,85	0,28	4,47	0,9	0			
Диоксид азота	0,03	0,84	0,68	3,4	4	50		
Оксид азота	0,001	0,02	0,03	0,07	0			
Озон	0,05	1,74	0,22	1,39	10	223		
Сероводород	0,003		0,03	4,2	4	41		
Фенол	0,002	0,71	0,003	0,30	0			
Аммиак	0,01	0,16	0,01	0,06	0			
Формальдегид	0,002	0,21	0,003	0,06	0			
Бензол	0,0000	0,000	0,000	0,001	0			
Толуол	0,0000		0,000	0,000	0			
Этилбензол	0,0000	0,00	0,000	0,01	0			
Ортоксилол (С2Н6)	0,0000		0,000	0,000	0			

### Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения атмосферного воздуха в мае г. Атырау за последние пять лет оценивался как «повышенный», за исключением 2020 год где уровень «высокий».

Количество превышений максимально-разовых ПДК было отмечено по взвешенным частицам (пыль) (8 случаев), взвешенным частицам РМ-2,5 (1 случай), диоксида азота (50 случаев), озон (223 случая), сероводорода (41случай).

Увеличению концентрации сероводорода способствуют объекты нефтепереработки, транспортировки и пруд-накопителя производственных сбросов «Тухлая балка», расположенных на восточной подветриваемой стороне города, которые являются основными источниками загрязнения воздуха сероводородом. Основные источники диоксида азота в атмосфере — выхлопные газы автомобилей, а также нефтеперерабатывающие, химические заводы. Повышению концентрации озона способствуют нисходящие потоки воздуха и высокая температура.

Повышению концентрации взвешенных частиц в воздухе способствуют частые ветра в регионе, поднимающие пыль с подстилающей поверхности земли.

### **2.1 Метеорологические условия**

Погодные условия по Атырауской области формировались под чередующимся влиянием полей повышенного давления и циклонических воздействий . При этом чаще наши районы оказывались в мало градиентной барической поле повышенного давления. С прохождением фронтальных разделов, наблюдалась неустойчивая погода, местами прошли кратковременные дожди с грозами, наблюдалась часто в первой и середине второй, начале и конце третьей декады, усиливался ветер местами до 15-22 м/с. По метеорологическим условиям *ожидалось* неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

### **Состояние атмосферного воздуха по данным экспедиционных наблюдений**

Помимо стационарных постов наблюдений в городе Атырау действует передвижная экологическая лаборатория, с помощью которой измерение качества воздуха проводятся 3 раза в сутки по неполной программе (07,13,19 час. местного времени) на 3 точках. Точка №1-п.Жумыскер, улица Жастар; точка №2-вокзал Атырау; точка №3- Черная речка, городской пруд-испаритель по 11 показателям: 1) взвешенные частицы (РМ-10); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) взвешенные частицы (РМ-2,5); 6) Летучие органические соединения (ЛОС); 7) сероводород; 8) углеводороды (С<sub>12</sub>-С<sub>19</sub>); 9) формальдегид; 10) фенол; 11) метан.

Концентрации загрязняющих веществ, по данным наблюдений на всех точках находились в пределах допустимой нормы.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 13.

Таблица 13

#### **Максимальные концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений г.Атырау**

Определяемые примеси	Точки отбора
----------------------	--------------

	№1		№2		№3	
	Qm мг/м <sup>3</sup>	Qm/ПДК	Qm мг/м <sup>3</sup>	Qm/ПДК	Qm мг/м <sup>3</sup>	Qm/ПДК
Взвешенные частицы (PM-2,5)	0,020	0,125	0,042	0,263	0,012	0,075
Взвешенные частицы (PM-10)	0,019	0,063	0,120	0,40	0,016	0,080
Оксид углерода	2,7	0,5	2,52	0,504	4,2	0,84
Диоксид азота	0,005	0,025	0,013	0,065	0,007	0,035
Метан	1,0	-	20	-	5,0	-
Сероводород	0,002	0,250	0,002	0,250	0,004	0,500
Фенол	0,001	0,100	0,002	0,2	0,003	0,3
Углеводороды (C <sub>12</sub> -C <sub>19</sub> )	0,3	0,005	1,0	0,017	0,3	0,005
Диоксид серы	0,030	0,060	0,080	0,160	0,100	0,200
Формальдегид	0,001	0,020	0,002	0,040	0,001	0,028
Летучие органические соединения (ЛОС)	0,3	-	0,3	-	0,4	-

## 2.2 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Кульсары.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Кульсары проводятся на стационарном посту наблюдения (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 7 показателей: 1) взвешенные частицы PM-10; 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота; 6) озон; 7) аммиак.

В таблице 3 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 3

### Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
7	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	ул.Махамбет Утемисова,37 А	взвешенные частицы PM-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон (приземный), сероводород

## Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Кульсары за май 2023 года.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **высокое**, он определялся значением СИ=1,5 (низкий уровень) и НП=41% (высокий уровень) по озону.

Максимально-разовые концентрации составили: сероводорода-2,41ПДК м.р., озон (приземный) – 1,5 ПДК м.р.

Средние концентрации озон (приземный) составил – 4,8 ПДК<sub>с.с.</sub>, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.



Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 4.


Таблица 4

### Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>м.р.</sub>		%	>ПДК	>5 ПДК
<b>г. Кульсары</b>								
Взвешенные частицы РМ-10	0,00	0,00	0,13	0,25	0			
Диоксид серы	0,03	0,59	0,34	0,68	0			
Оксид углерода	0,12	0,04	1,57	0,31	0			
Диоксид азота	0,02	0,38	0,13	0,65	0			
Оксид азота	0,00	0,04	0,16	0,40	0			
Озон	0,15	4,8	0,23	1,5	41	914		
Сероводород	0,001		0,02	2,41	4	89		

#### Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения атмосферного воздуха в мае г. Кульсары за последние пять лет 2023 год оценивался как «высокий», в 2020, 2021, гг. «низкий», а в 2019 и 2022 годах уровень загрязнения оценивался как «повышенный».

### 2.3 Мониторинг качества атмосферного воздуха в районе Макат.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Магатского района проводится на 1 компактной станции наблюдения (Приложение 1).

В целом по району Магат определяется до 4 показателей: 1) диоксид серы; 2) диоксид азота; 3) сероводород; 4) оксид углерода.

В таблице 5 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 5

**Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси**

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	Магатский район, п.Магат ул.Алаш 23, дом культуры.	диоксид серы, диоксид азота, сероводород, оксид углерода.

**Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п. Магат за май 2023 года.**

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **высокое**, он определялся значением СИ равным 6,5 (высокий уровень) и **НП=19%** (повышенный уровень) по сероводороду.

Максимально-разовые концентрации составила: сероводорода – 6,5 ПДК<sub>м.р.</sub>.

Средние концентрации диоксида азота составила – 2,7 ПДК<sub>с.с.</sub>, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 6.

Таблица 6

**Характеристика загрязнения атмосферного воздуха**

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>м.р.</sub>		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
<b>район Магат</b>								
Диоксид серы	0,001	0,02	0,00	0,00	0			
Оксид углерода	0,27	0,09	0,79	0,16	0			
Диоксид азота	0,11	2,7	0,18	0,89	0			
Сероводород	0,003		0,05	6,5	19	417	2	

**2.4 Мониторинг качества атмосферного воздуха в Индерском районе.**

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Индерского района проводится на 1 компактной станции наблюдения (Приложение 1).

В целом по району Индер определяется до 4 показателей: 1) диоксид серы; 2) диоксид азота; 3) сероводород; 4) оксид углерода.

В таблице 7 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 7

**Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси**

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	пос. Индерборский, ул. Н.Мендигалиев а д. 47.	диоксид серы, диоксид азота, сероводород, оксид углерода.

**Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п. Индерборский за май 2023 года.**

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением **СИ** равным 1,5 (низкий уровень) и **НП**=4% (повышенный уровень) по диоксиду азота.

Максимально-разовые концентрации составили: оксида углерода-1,35 ПДК<sub>м.р.</sub>, диоксида азота 1,5 ПДК<sub>м.р.</sub>.

Средние концентрации составили: диоксида серы-1,86 ПДК<sub>с.с.</sub>, оксида углерода-1,14 ПДК<sub>с.с.</sub>, диоксида азота – 2,3 ПДК<sub>с.с.</sub>, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 8.

Таблица 8

**Характеристика загрязнения атмосферного воздуха**

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>м.р.</sub>		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
<b>район Индер</b>								
Диоксид серы	0,093	1,86	0,33	0,66	0			
Оксид углерода	3,43	1,14	6,77	1,35	0	1		
Диоксид азота	0,09	2,3	0,29	1,5	4	9		
Сероводород	0,000		0,000	0,00	0			

## 2.5 Мониторинг качества атмосферного воздуха в селе Жанбай.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории с.Жанбай проводится на 1 компактной станции наблюдения (Приложение 1).

В целом в селе Жанбай определяется до 4 показателей: 1) диоксид серы; 2) диоксид азота; 3) сероводород; 4) оксид углерода.

В таблице 9 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 9

**Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси**

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	с.Жанбай, ул.Т. Нысанов уч 96	диоксид серы, диоксид азота, сероводород, оксид углерода.

## Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в с. Жанбай за май 2023 года.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением **СИ** равным 4,2 (повышенный уровень) и **НП**=8% (повышенный уровень) по сероводороду.

Максимально-разовые концентрации составили: диоксида серы – 3,0 ПДК<sub>м.р.</sub>, сероводорода – 4,2 ПДК<sub>м.р.</sub>. По другим показателям превышений ПДК не наблюдалось.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 10.

Таблица 10

**Характеристика загрязнения атмосферного воздуха**

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>м.р.</sub>		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
<b>село Жанбай</b>								
Диоксид серы	0,04	0,9	1,52	3,0	1	32		
Оксид углерода	0,67	0,22	1,53	0,31	0			
Диоксид азота	0,02	0,62	0,32	1,59	0			
Сероводород	0,003		0,03	4,2	8	165		

## 2.6 Мониторинг качества атмосферного воздуха в с. Ганюшкино.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории п. Ганюшкино проводится на 1 компактной станции наблюдения (Приложение 1).

В целом в поселке Ганюшкино определяется до 4 показателей: 1) диоксид серы; 2) диоксид азота; 3) сероводород; 4) оксид углерода.

В таблице 11 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 11

**Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси**

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	с.Курмангазы, «ДК им.С.Кушекбаев а».	диоксид серы, диоксид азота, сероводород, оксид углерода.

**Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в с. Ганюшкино за май 2023 года.**

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением **СИ** равным 1,6 (низкий уровень) и **НП**=7% (повышенный уровень) по диоксиду азота.

Максимально-разовые концентрации составила: диоксида азота – 1,6ПДК<sub>м.р.</sub>.

Средние концентрации составила: диоксида азота – 3,7 ПДК<sub>с.с.</sub>, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 12

Таблица 12

**Характеристика загрязнения атмосферного воздуха**

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>м.р.</sub>		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
<b>пос. Ганюшкино</b>								
Диоксид серы	0,001	0,02	0,14	0,29	0			
Оксид углерода	0,01	0,00	1,71	0,34	0			
Диоксид азота	0,15	3,7	0,31	1,6	7	159		
Сероводород	0,001		0,007	0,84	0			

**3. Мониторинг качества поверхностных вод на территории Атырауской области**

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Атырауской области проводились на 21 створах на 6 водных объектах (реки Жайык, Кигаш, Эмба, проток Шаронова, протоки Перетаска и Яик).

Мониторинг качества морской воды проводится на следующих 22 прибрежных точках Северного Каспийского моря: морской судоходный канал (2), взморье р. Жайык (5), взморье р. Волга (5), станции острова залива Шалыги (5), п. Жанбай (5).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 39 гидрохимических показателей качества: *визуальные наблюдения, температура, взвешенные вещества, прозрачность, цветность, водородный показатель (рН), растворенный кислород, БПК<sub>5</sub>, ХПК, сухой остаток, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы.*

Мониторинг за состоянием качества поверхностных и морских вод по гидробиологическим показателям на территории Атырауской области за отчетный период проводился на 5 водных объектах (рек Жайык, Эмба, Кигаш и в протоке Шаронова, Каспийское море) на 28 створах. Было проанализировано 84 проб на определение острой токсичности исследуемой воды на тестируемый объект.

Мониторинг качества донных отложений по тяжелым металлам (*медь, марганец, нефтепродукты, свинец, цинк, кадмий, никель, хром*) на территории Атырауской области проводится на 10 створах р.Жайык, пр.Яик и Перетаска и на 22 точках Каспийского моря. Анализировалось содержание нефтепродуктов и тяжелых металлов (медь, хром, кадмий, никель, марганец, свинец и цинк).

### 3.1 Результаты мониторинга качества поверхностных по гидрохимическим показателям вод на территории Атырауской области

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 3

Наименование водного объекта	Класс качества воды		Параметры	ед. изм.	концентрация
	Май 2022 г.	Май 2023г.			
р. Жайык	2 класс	4 класс	Магний	мг/дм <sup>3</sup>	34,3
пр.Перетаска	2 класс	4 класс	Магний	мг/дм <sup>3</sup>	37,7
пр.Яик	2 класс	4 класс	Магний	мг/дм <sup>3</sup>	34,2
р.Кигаш	3 класс	не нормируется (>5 класс)	Взвешенные вещества	мг/дм <sup>3</sup>	174,0
пр.Шаронова	5 класс**	4 класс	Магний	мг/дм <sup>3</sup>	32,2
р.Эмба	3 класс	4 класс	Магний	мг/дм <sup>3</sup>	34,3

\*\* - 5 класс вода «наихудшего качества»

Как видно из таблицы в сравнении с май месяцем 2022 года качество поверхностной воды пр.Шаронова с 5 класса перешло в 4 класс – улучшилось.

Качество поверхностных вод р.Жайык, протоков Перетаска и Яик с 2 класса перешло в 4 класс, р.Эмба с 3 класса перешло в 4 класс, р.Кигаш с 3 класса перешло с выше 5 класса –ухудшилось.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах по Атырауской области является магний и взвешенные вещества.

### **Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ)**

За май 2023 года на территории Атырауской области ВЗ и ЭВЗ не обнаружены.

Информация по качеству водных объектов по гидрохимическим показателям в разрезе створов указана в Приложении 2.

### **3.2. Результаты мониторинга качества поверхностных вод по гидробиологическим (токсикологическим) показателям на территории Атырауской области**

**Река Жайык. Перифитон.** В обрастаниях перифитона доминировали диатомовые водоросли. Диатомовые водоросли встречались во всех створах. Средний индекс сапробности равен 1,90. Умеренно загрязненная вода.

**Зообентос.** Зообентос был предоставлен брюхоногими моллюсками. Биотический индекс по Вудивиссу составил-5. Класс воды- третий.

**Биотестирование.** По данным биотестирования тест-параметр по реке Жайык был предоставлен в последовательном расположения точек наблюдения: поселок Дамба - 0%, г. Атырау 0,5 км ниже сброса КГП «Атырау су арнасы» - 0%, п. Индер «в створе водопоста» - 0%. Полученные данные показывает отсутствие токсического влияния исследуемой воды на тест-объект.

**Проток Шаронова. Перифитон.** Видовой состав перифитона был представлен диатомовыми водорослями. Индекс сапробности составил 1,8. Качество воды- умеренно загрязненные воды.

**Зообентос.** По бентосу биотический индекс составил-5. Качество воды соответствовало к 3 классу умеренно загрязненных вод.

**Биотестирование.** В процессе определения острой токсичности воды на тест-объект процент погибших дафний по отношению к контролю (тест-параметр) в протоке - 0%. Токсического влияния на тест-объект не обнаружено.

**Река Кигаш. Перифитон.** Видовой состав перифитона был представлен диатомовыми водорослями. Индекс сапробности составил 2,18. Качество воды- умеренно загрязненные воды.

**Зообентос.** По бентосу биотический индекс составил-5. Качество воды соответствовало к 3 классу умеренно загрязненных вод.

**Биотестирование.** Данные полученные в ходе биотестирования по реке Кигаш показали отсутствие токсического влияние на тест-объект. Число выживших дафний в исследуемой воде составило 100%. Тест- параметр составил - 0%.

#### **Река Эмба.**

*Перифитон.* Видовой состав перифитона был представлен диатомовыми водорослями. Индекс сапробности равен 2,04. Качество воды соответствовало к 3 классу умеренно загрязненных вод.

*Зообентос.* Биотический индекс был равен-5. По результатам исследования зообентоса реки Эмба, дно водоема оценивалось как умеренно загрязненное.

*Биотестирование.* В процессе определения острой токсичности воды на тест-объект процент погибших дафний по отношению к контролю (тест-параметр) в протоке 0%. Токсического влияния на тест-объект не обнаружено.

**Каспийское море.** *Перифитон.* Альгоценоз обрастаний был богат диатомовыми водорослями. Индексы сапробности варьировали от 1,32 до 2,48. Средний индекс сапробности по 22 точкам Каспийского моря составил 1,92 умеренно загрязненной воды и остался в пределах 3 класса.

*Зообентос.* По бентосу биотический индекс составил - 5. Качество воды соответствовало к 3 классу - умеренно загрязненных вод.

Качество воды *по перифитону и бентосу* относится к третьему классу, умеренно загрязненные воды.

*Биотестирование* (определение острой токсичности воды) Каспийского моря (Морской судоходный канал, Взморье р. Жайык, Взморье р. Волга, п. Жанбай, Остров залива Шалыги).

Качество морских вод по токсикологическим показателям Каспийского моря не оказывали острого токсического действия на живые организмы. Тест-параметр в створах Каспийского моря составил 0%.

Информация по качеству водных объектов по токсикологическим показателям в разрезе створов указана в Приложении 4.

### **3.3. Результаты мониторинга качества донных отложений поверхностных и морских вод по тяжелым металлам на территории Атырауской области**

По результатам исследования в донных отложениях реки Жайык, пр. Перетаска и Яик содержание тяжелых металлов колеблется в следующих пределах: медь от 0,26 до 0,54 мг/кг, марганец от 0,05 до 0,1 мг/кг, хром от 0,07 до 0,15 мг/кг, свинец от 0,16 до 0,35 мг/кг, цинк от 1,57 до 2,5 мг/кг, никель от 0,35 до 0,72 мг/кг, кадмий от 0,14 до 0,26 мг/кг. Содержание нефтепродуктов отмечена в пределах от 0,05% до 2,2%.

По результатам мониторинга донных отложениях Каспийского моря содержание тяжелых металлов колеблется в широких пределах: медь от 0,22 до 0,59 мг/кг, марганец от 0,05 до 0,12 мг/кг, хром от 0,06 до 0,25 мг/кг, свинец от 0,1 до 0,36 мг/кг, цинк от 1,6 до 2,5 мг/кг, никель от 0,26 до 0,76 мг/кг, кадмий от 0,1 до 0,31 мг/кг. Содержание нефтепродуктов отмечена в пределах 0,12% до 2,05%

Информация по качеству донных отложений по показателям в разрезе створов указана в Приложении 5.



#### **4. Химический состав атмосферных осадков на территории Атырауской области**

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 3 метеостанции (Атырау, Ганюшкино, Пешной) (рис. 4.3.).

Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).

В пробах осадков преобладало содержание сульфатов 34,76%, хлоридов 16,87%, гидрокарбонатов 17,51%, ионов натрия 10,5%, ионов калия 5,43%, ионов магния 2,32%, ионов кальция 10,97%.

Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Атырау – 524,27 мг/л, наименьшая на МС Ганюшкино – 100,00 мг/л.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась в пределах от 187,10 (МС Ганюшкино) до 980,90 мкСм/см (МС Атырау).


Кислотность выпавших осадков находится в пределах от 4,2 (МС Ганюшкино) до 22,03 (МС Атырау).

#### **5. Радиационная обстановка**


Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) и 1 автоматическом посту г. Кульсары (ПНЗ № 7).

Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы в области находились в пределах 0,08-0,15 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.


Мониторинг за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на метеорологической станции Атырау, путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На станции проводился пятисуточный отбор проб. Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы г. Атырау колебалась в пределах 1,5-1,7 Бк/м<sup>2</sup>. Средняя величина плотности выпадений составила 1,6 Бк/м<sup>2</sup>, что не превышает предельно-допустимый уровень.




Карта расположения стационарной и передвижной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Атырау




Карта расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Кульсары




Карта расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Макатского района



Карта расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Индерского района




Карта расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха пос. Ганюшкино



Карта расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха село Жанбай





Расположения метеостанций за наблюдением атмосферных осадков и снежного покрова на территории Атырауской области



Расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территории Атырауской области

**Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха  
г. Атырау за май 2023 года.**

Было зафиксировано в городе Атырау 15 случая ВЗ (по данным постов компаний NCOС)

**Высокое загрязнение - г. Атырау**

При месь	День. Месяц, Год	Время	Номер поста	Концентрация		Ветер		Темпе ратура, °С	Атмо сферное давление	Причины от КЭРК
				мг/м <sup>3</sup>	Кратнос ть превыш ения ПДК	Напр авлен ие, град	Скорость, м/с			
Серо- водород	01.05. 2023	03:40	№ 102 Самал (Макатский район Вахтовый поселок Самал)	0.09028	<b>11.28458</b>	-	-	19.30	1009.26	
		04:00		0.08077	<b>10.09581</b>	-	-	19.19	1009.38	
		04:20		0.08940	<b>11.17535</b>	-	-	18.90	1009.44	
		05:00		0.08192	<b>10.23962</b>	-	-	18.92	1009.61	
Серо- водород	04.05. 2023	04:40	№ 102 Самал (Макатский район Вахтовый поселок Самал)	0.0865	<b>10.8</b>	-	-	12.33	1015.42	
Серо- водород	29.05. 2023	03:20	№ 102 Самал (Макатский район Вахтовый поселок Самал)	0.1555	<b>19.4</b>	-	-	23.23	1012.00	
		04:20		0.1157	<b>14.4</b>	-	-	23.02	1012.12	
		04:40		0.1147	<b>14.3</b>	-	-	22.71	1012.29	
		05:00		0.1336	<b>16.7</b>	-	-	22.59	1012.54	
		05:40		0.1048	<b>13.0</b>	-	-	22.68	1012.66	
Серо- водород		05:20	№ 117 Карабатан (Железнодорожная станция Карабатан)	0.1146	<b>14.3</b>	115.83 <b>В</b>	8.03	23.07	1011.35	
		05:40		0.1264	<b>15.8</b>	115.44 <b>В</b>	7.76	22.84	1011.43	
		06:00		0.1159	<b>14.4</b>	115.12 <b>В</b>	7.68	22.51	1011.63	
		06:20		0.1048	<b>13.1</b>	115.55 <b>В</b>	7.08	22.34	1011.98	
Серо- водород	30.05. 2023	21:20	№ 102 Самал (Макатский район Вахтовый поселок Самал)	0.0826	<b>10.3</b>	-	-	30.91	1011.72	

### Информация о качестве поверхностных вод по Атырауской области по створам

Водный объект и створ	Характеристика физико-химических параметров	
<b>река Жайык</b>	температура воды отмечена в пределах 14,5-15,1°С, водородный показатель 7,72-7,9, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,8-7,4 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 2,0-3,0 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 10,8-11,5 см	
п.Индер , в створе водпоста	4 класс	магний – 32,3 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация магния превышает фоновый класс.
АО «Казтрансойл» НПС Индер 0,5 км выше реки Жайык	4 класс	магний – 35,5 мг/дм <sup>3</sup>
АО «Казтрансойл» НПС Индер 0,5 км ниже реки Жайык	4 класс	магний – 32,1 мг/дм <sup>3</sup>
с.Береке 0,5 км выше р.Жайык	4 класс	магний – 37,6 мг/дм <sup>3</sup>
с.Береке 0,5 км ниже р.Жайык	4 класс	магний – 34,5 мг/дм <sup>3</sup>
1 км выше города Атырау	4 класс	магний – 35,4 мг/дм <sup>3</sup> ХПК – 30,7 мг/дм <sup>3</sup>
г.Атырау, 0,5 км выше сброса КГП «Атырау су арнасы»	4 класс	магний – 33,3 мг/дм <sup>3</sup>
г.Атырау, 0,5 км ниже сброса КГП «Атырау су арнасы»	4 класс	магний – 32,8 мг/дм <sup>3</sup>
1 км ниже города Атырау	4 класс	магний – 36,5 мг/дм <sup>3</sup>
3 км ниже сброса РГКП «Урало-Атырауский осетровый завод» р-н Курилкино	4 класс	магний – 33,1 мг/дм <sup>3</sup>
0,5 км выше сброса РГКП «Урало-Атырауский осетровый завод» р-н Курилкино	4 класс	магний – 36,5 мг/дм <sup>3</sup>
пос. Дамба	4 класс	магний – 32,1 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация магния превышает фоновый класс.
<b>проток Перетаска</b>	температура воды отмечена в пределах 14,9-18,2°С, водородный показатель 7,75-7,8, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,7-6,9 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 2,3-2,8 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 11,0-11,2см	
г.Атырау 0,5 км ниже ответвления протока Перетаска	4 класс	магний – 41,3 мг/дм <sup>3</sup>
г.Атырау 2 км выше сброса АО «Атырауский ТЭЦ»	4 класс	магний – 39,1 мг/дм <sup>3</sup>
г.Атырау 2 км ниже сброса АО «Атырауский ТЭЦ»	4 класс	магний – 32,8 мг/дм <sup>3</sup>
<b>проток Яик</b>	температура воды отмечена в пределах 14,2-14,6°С, водородный показатель 7,84-7,9, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,7-6,9 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 2,0-2,5 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 11,1-11,3см	
с.Ракуша 0,5км ниже ответвления протока Яик	4 класс	магний – 35,0 мг/дм <sup>3</sup>
п.Еркинкала, 0,5 км выше сброса РГКП «Атырауский осетровый рыбоводный завод»	4 класс	магний – 34,6 мг/дм <sup>3</sup>

п.Еркинкала, 0,5 км ниже сброса РГКП «Атырауский осетровый рыболовный завод»	4 класс	магний – 33,1 мг/дм <sup>3</sup>
<b>проток Шаронова</b>	температура воды отмечена на уровне 14,9 °С, водородный показатель 7,86, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,8 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 2,3 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 11,5 см	
с.Ганюшкино, в створе водпоста	4 класс	магний – 32,2 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация магния превышает фоновый класс.
<b>река Кигаш</b>	температура воды отмечена на уровне 14,5°С, водородный показатель 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,9 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 2,8 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 11,8см, цветность – 18,2 градусов	
с.Котьяевка, в створе водпоста	не нормируется (>5 класса)	взвешенные вещества – 174,0 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
<b>река Эмба</b>	температура воды отмечена на уровне 14,6°С, водородный показатель 7,86, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,1 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 2,2мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 11,2 см	
п.Аккизтогай, гидропост	4 класс	магний – 34,3 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация магния превышает фоновый класс.
Каспийское море	температура воды в пределах 14,8-17,2°С, величина водородного показателя морской воды – 7,75-7,96, содержание растворенного кислорода – 6,8-7,3мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 2,0-3,0 мг/дм <sup>3</sup> , ХПК-18,9-22,7мг/дм <sup>3</sup> , взвешенные вещества- 54-124мг/дм <sup>3</sup> , минерализация- 2040-2852мг/дм <sup>3</sup> .	

### Приложение 3

#### Результаты качества морских вод Каспийского моря на территории Атырауской области

	Наименование ингредиентов	Единицы измерения	Май 2023
			Северный Каспий
1	Визуальные наблюдения		
2	Температура	°С	16,2
3	Водородный показатель		7,9
4	Растворенный кислород	мг/дм <sup>3</sup>	7,1
5	Прозрачность	см	11,3
6	Взвешенные вещества	мг/дм <sup>3</sup>	89,6
7	БПК <sub>5</sub>	мг/дм <sup>3</sup>	2,6
8	ХПК	мг/дм <sup>3</sup>	20,9
9	Гидрокарбонаты	мг/дм <sup>3</sup>	83,3
10	Жесткость	мг/дм <sup>3</sup>	18,2
11	Минерализация	мг/дм <sup>3</sup>	2395
12	Натрий	мг/дм <sup>3</sup>	38,0
13	Калий	мг/дм <sup>3</sup>	33,5
14	Сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	2467



15	Кальций	мг/дм <sup>3</sup>	140,3
16	Магний	мг/дм <sup>3</sup>	136,2
17	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	1110
18	Хлориды	мг/дм <sup>3</sup>	850,3
19	Фосфат	мг/дм <sup>3</sup>	0,061
20	Фосфор общий	мг/дм <sup>3</sup>	0,006
21	Азот нитритный	мг/дм <sup>3</sup>	0,023
22	Азот нитратный	мг/дм <sup>3</sup>	0,015
23	Железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,03
24	Аммоний солевой	мг/дм <sup>3</sup>	0,3
25	Свинец	мг/дм <sup>3</sup>	0,002
26	Медь	мг/дм <sup>3</sup>	0,001
27	Цинк	мг/дм <sup>3</sup>	0,002
28	Хром общий	мг/дм <sup>3</sup>	0,002
29	Хром (6+)	мг/дм <sup>3</sup>	0,002
30	АПАВ /СПАВ	мг/дм <sup>3</sup>	0,02
31	Фенолы	мг/дм <sup>3</sup>	0,001
32	Нефтепродукты	мг/дм <sup>3</sup>	0,02
33	Бор	мг/дм <sup>3</sup>	0,014
34	Пестициды альфа -ГХЦГ	мкг/дм <sup>3</sup>	0,0
35	Пестициды гамма-ГХЦГ	мкг/дм <sup>3</sup>	0,0
36	Пестициды 4,4-ДДЕ	мкг/дм <sup>3</sup>	0,0
37	Пестициды 4,4-ДДТ	мкг/дм <sup>3</sup>	0,0

Приложение 4

**Информация о качестве поверхностных и морских вод по гидробиологическим (токсикологическим) показателям**

№	Водный объект	Пункт контроля	Пункт привязки	Индекс соприобности		Класс качества воды	Биотестирование	
				Пери фитон	Бентос		Тест параметр, %	Оценка воды
1	р.Жайык	пос.Дамба		2	5	3	0%	Не оказывает токсического действия
2		г.Атырау	0,5 км ниже сброса КПП «Атырау Су арнасы»	1,82	5	3	0%	
3		п.Индер	в створе водпоста	1,90	5	3	0%.	
4	пр. Шаронова	с.Ганюшкино	в створе водпоста	1,8	5	3	0%	
5	р.Кигаш	с.Котяевка	в створе водпоста	2,18	5	3	0%.	
6	р.Эмба	п.Аккизтогай	гидропост	2,04	5	3	0%	
7	Каспийское море	Морской судоходный канал	1 км ниже нач. судоходного канала ст.1 46°55'11.85"С 51°40'22.69"В	1,80	5	3	0%	Не оказывает токсического действия
8		Морской судоходный канал	6 км ниже нач. судоходного канала ст.2	2,36	5	3	0%	

			46°50'49.59"C 51°33'38.63"B				
9	Взморье р. Жайык		46°48'6.71"C 51°29'38.55"B	1,58	5	3	0%
10			46°52'34.05"C 51°27'39.87"B	2,48	5	3	0%
11			46°56'8.07"C 51°23'30.54"B	2,35	5	3	0%
12			46°54'20.02"C 51°17'18.97"B	2,08	5	3	0%
13			46°53'5.79"C 51°8'23.56"B	2,12	5	3	0%
14	Взморье р.Волга		46°22'24.57"C 49°12'47.38"B	1,84	5	3	0%
15			46°15'52.46"C 49°21'16.40"B	1,65	5	3	0%
16			46°13'7.94"C 49°26'54.14"B	1,85	5	3	0%
17			46°10'30.78"C 49°33'14.54"B	1,55	5	3	0%
18			46°11'30.98"C 49°36'2.32"B	1,84	5	3	0%
19	п.Жанбай		46°55'46.69"C 50°47'7.10"B	2,14	5	3	0%
20			46°55'24.34"C 50°46'49.64"B	1,75	5	3	0%
21			46°55'2.11"C 50°46'43.50"B	2,45	5	3	0%
22			46°54'32.22"C 50°46'36.09"B	1,9	5	3	0%
23			46°53'58.51"C 50°46'14.87"B	1,80	5	3	0%
24	Остров залива Шалыги		46°48'25.94"C 51°34'54.08"B	2,12	5	3	0%
25			46°49'26.90"C 51°37'4.85"B	1,94	5	3	0%
26			46°48'52.15"C 51°39'41.97"B	1,84	5	3	0%
27			46°47'1.30"C 51°42'11.94"B	1,32	5	3	0%
28			46°44'2.87"C 51°43'0,92"B	1,55	5	3	0%

Приложение 5

**Информация по донным отложениям по Атырауской области по створам**

Водный объект и створ	Анализируемые компоненты	Концентрация
река Жайык 1 км выше г.Атырау	Медь	0,26 мг/кг
	Марганец	0,08 мг/кг
	Хром	0,1 мг/кг
	Нефтепродукты	0,97%
	Свинец	0,27 мг/кг
	Цинк	2,2 мг/кг
	Никель	0,37 мг/кг
	Кадмий	0,21 мг/кг
	Медь	0,37 мг/кг

<b>0,5 км выше сброса КГП «Атырау су арнасы»</b>	Марганец	0,07 мг/кг
	Хром	0,12 мг/кг
	Нефтепродукты	1,6%
	Свинец	0,25 мг/кг
	Цинк	1,97 мг/кг
	Никель	0,45 мг/кг
	Кадмий	0,16 мг/кг
<b>0,5 км ниже сброса КГП «Атырау су арнасы»</b>	Медь	0,31 мг/кг
	Марганец	0,06 мг/кг
	Хром	0,11 мг/кг
	Нефтепродукты	1,8%
	Свинец	0,3 мг/кг
	Цинк	2,5 мг/кг
	Никель	0,35 мг/кг
Кадмий	0,26 мг/кг	
<b>пос.Дамба</b>	Медь	0,30 мг/кг
	Марганец	0,08 мг/кг
	Хром	0,15 мг/кг
	Нефтепродукты	1,55%
	Свинец	0,22 мг/кг
	Цинк	1,7 мг/кг
	Никель	0,62 мг/кг
Кадмий	0,25 мг/кг	
<b>3 км ниже сброса РГКП «Урало – Атырауский осетровый завод» р-н Курилкино</b>	Медь	0,37 мг/кг
	Марганец	0,05 мг/кг
	Хром	0,1 мг/кг
	Нефтепродукты	1,25%
	Свинец	0,3 мг/кг
	Цинк	2,0 мг/кг
	Никель	0,59 мг/кг
Кадмий	0,19 мг/кг	
<b>0,5 км выше сброса РГКП «Урало – Атырауский осетровый завод» р-н Курилкино</b>	Медь	0,4 мг/кг
	Марганец	0,08 мг/кг
	Хром	0,07 мг/кг
	Нефтепродукты	1,1%
	Свинец	0,2 мг/кг
	Цинк	1,57 мг/кг
	Никель	0,49 мг/кг
Кадмий	0,16 мг/кг	
<b>2 км выше сброса АО «Атырауский ТЭЦ»</b>	Медь	0,54 мг/кг
	Марганец	0,08 мг/кг
	Хром	0,09 мг/кг
	Нефтепродукты	2,2%
	Свинец	0,35 мг/кг
	Цинк	1,87 мг/кг
	Никель	0,72 мг/кг
Кадмий	0,24 мг/кг	
<b>2 км ниже сброса АО «Атырауский ТЭЦ»</b>	Медь	0,5 мг/кг
	Марганец	0,06 мг/кг
	Хром	0,1 мг/кг
	Нефтепродукты	0,85%
	Свинец	0,32 мг/кг
	Цинк	2,25 мг/кг
	Никель	0,7 мг/кг
Кадмий	0,2 мг/кг	
<b>п.Еркинкала, 0,5 км выше сброса РГКП «Атырауский осетровый рыболовный завод».</b>	Медь	0,52 мг/кг
	Марганец	0,1 мг/кг
	Хром	0,07 мг/кг

	Нефтепродукты	0,92%
	Свинец	0,21 мг/кг
	Цинк	2,3 мг/кг
	Никель	0,62 мг/кг
	Кадмий	0,14 мг/кг
<b>п.Еркинкала, 0,5 км ниже сброса РГКП «Атырауский осетровый рыбоводный завод»</b>	Медь	0,36 мг/кг
	Марганец	0,07 мг/кг
	Хром	0,11 мг/кг
	Нефтепродукты	0,05%
	Свинец	0,16 мг/кг
	Цинк	2,12 мг/кг
	Никель	0,44 мг/кг
	Кадмий	0,25 мг/кг
<b>Морской судоходный канал 1 км ниже</b>	Медь	0,36 мг/кг
	Марганец	0,08 мг/кг
	Хром	0,07 мг/кг
	Нефтепродукты	0,12%
	Свинец	0,22 мг/кг
	Цинк	1,8 мг/кг
	Никель	0,34 мг/кг
	Кадмий	0,15 мг/кг
<b>Морской судоходный канал 6 км ниже</b>	Медь	0,3 мг/кг
	Марганец	0,1 мг/кг
	Хром	0,06 мг/кг
	Нефтепродукты	0,17%
	Свинец	0,25 мг/кг
	Цинк	1,75 мг/кг
	Никель	0,32 мг/кг
	Кадмий	0,22 мг/кг
<b>Взморье р.Жайык 1 точка</b>	Медь	0,39 мг/кг
	Марганец	0,1 мг/кг
	Хром	0,07 мг/кг
	Нефтепродукты	1,4%
	Свинец	0,31 мг/кг
	Цинк	1,85 мг/кг
	Никель	0,39 мг/кг
	Кадмий	0,14 мг/кг
<b>Взморье р.Жайык 2 точка</b>	Медь	0,35 мг/кг
	Марганец	0,07 мг/кг
	Хром	0,1 мг/кг
	Нефтепродукты	1,25%
	Свинец	0,25 мг/кг
	Цинк	1,6 мг/кг
	Никель	0,46 мг/кг
	Кадмий	0,1 мг/кг
<b>Взморье р.Жайык 3 точка</b>	Медь	0,40 мг/кг
	Марганец	0,12 мг/кг
	Хром	0,22 мг/кг
	Нефтепродукты	1,5%
	Свинец	0,36 мг/кг
	Цинк	2,25 мг/кг
	Никель	0,34 мг/кг
	Кадмий	0,2 мг/кг
<b>Взморье р.Жайык 4 точка</b>	Медь	0,37 мг/кг
	Марганец	0,09 мг/кг
	Хром	0,15 мг/кг
	Нефтепродукты	1,2%
	Свинец	0,27 мг/кг

	Цинк	2,1 мг/кг
	Никель	0,47 мг/кг
	Кадмий	0,12 мг/кг
<b>Взморье р.Жайык 5 точка</b>	Медь	0,55 мг/кг
	Марганец	0,07 мг/кг
	Хром	0,25 мг/кг
	Нефтепродукты	1,8%
	Свинец	0,3 мг/кг
	Цинк	2,0 мг/кг
	Никель	0,36 мг/кг
	Кадмий	0,22 мг/кг
<b>Взморье р. Волга 1 точка</b>	Медь	0,29 мг/кг
	Марганец	0,07 мг/кг
	Хром	0,11 мг/кг
	Нефтепродукты	1,85%
	Свинец	0,31 мг/кг
	Цинк	2,4 мг/кг
	Никель	0,31 мг/кг
	Кадмий	0,3 мг/кг
<b>Взморье р. Волга 2 точка</b>	Медь	0,34 мг/кг
	Марганец	0,08 мг/кг
	Хром	0,16 мг/кг
	Нефтепродукты	2,0%
	Свинец	0,22 мг/кг
	Цинк	1,95 мг/кг
	Никель	0,56 мг/кг
	Кадмий	0,25 мг/кг
<b>Взморье р. Волга 3 точка</b>	Медь	0,22 мг/кг
	Марганец	0,11 мг/кг
	Хром	0,1 мг/кг
	Нефтепродукты	1,2%
	Свинец	0,24 мг/кг
	Цинк	1,92 мг/кг
	Никель	0,75 мг/кг
	Кадмий	0,22 мг/кг
<b>Взморье р. Волга 4 точка</b>	Медь	0,3 мг/кг
	Марганец	0,06 мг/кг
	Хром	0,07 мг/кг
	Нефтепродукты	1,6%
	Свинец	0,27 мг/кг
	Цинк	1,87 мг/кг
	Никель	0,67 мг/кг
	Кадмий	0,19 мг/кг
<b>Взморье р. Волга 5 точка</b>	Медь	0,37 мг/кг
	Марганец	0,12 мг/кг
	Хром	0,09 мг/кг
	Нефтепродукты	2,05%
	Свинец	0,35 мг/кг
	Цинк	1,94 мг/кг
	Никель	0,37 мг/кг
	Кадмий	0,1 мг/кг
<b>Острова з.Шалыги 1 точка</b>	Медь	0,49 мг/кг
	Марганец	0,07 мг/кг
	Хром	0,09 мг/кг
	Нефтепродукты	1,7%
	Свинец	0,1 мг/кг
	Цинк	1,81 мг/кг
	Никель	0,35 мг/кг

	Кадмий	0,14 мг/кг
<b>Острова з.Шалыги 2 точка</b>	Медь	0,41 мг/кг
	Марганец	0,08 мг/кг
	Хром	0,07 мг/кг
	Нефтепродукты	1,45%
	Свинец	0,15 мг/кг
	Цинк	1,96 мг/кг
	Никель	0,26 мг/кг
	Кадмий	0,15 мг/кг
<b>Острова з.Шалыги 3 точка</b>	Медь	0,31 мг/кг
	Марганец	0,09 мг/кг
	Хром	0,1 мг/кг
	Нефтепродукты	1,5%
	Свинец	0,25 мг/кг
	Цинк	2,5 мг/кг
	Никель	0,49 мг/кг
	Кадмий	0,21 мг/кг
<b>Острова з.Шалыги 4 точка</b>	Медь	0,26 мг/кг
	Марганец	0,06 мг/кг
	Хром	0,19 мг/кг
	Нефтепродукты	1,25%
	Свинец	0,29 мг/кг
	Цинк	2,2 мг/кг
	Никель	0,46 мг/кг
	Кадмий	0,3 мг/кг
<b>Острова з.Шалыги 5 точка</b>	Медь	0,4 мг/кг
	Марганец	0,05 мг/кг
	Хром	0,17 мг/кг
	Нефтепродукты	1,2%
	Свинец	0,3 мг/кг
	Цинк	1,9 мг/кг
	Никель	0,32 мг/кг
	Кадмий	0,2 мг/кг
<b>п.Жанбай 1 точка</b>	Медь	0,32 мг/кг
	Марганец	0,06 мг/кг
	Хром	0,07 мг/кг
	Нефтепродукты	1,5%
	Свинец	0,25 мг/кг
	Цинк	2,16 мг/кг
	Никель	0,76 мг/кг
	Кадмий	0,24 мг/кг
<b>п.Жанбай 2 точка</b>	Медь	0,27 мг/кг
	Марганец	0,07 мг/кг
	Хром	0,1 мг/кг
	Нефтепродукты	1,75%
	Свинец	0,3 мг/кг
	Цинк	2,1 мг/кг
	Никель	0,32 мг/кг
	Кадмий	0,27 мг/кг
<b>п.Жанбай 3 точка</b>	Медь	0,59 мг/кг
	Марганец	0,08 мг/кг
	Хром	0,07 мг/кг
	Нефтепродукты	1,6%
	Свинец	0,31 мг/кг
	Цинк	2,4 мг/кг
	Никель	0,67 мг/кг
	Кадмий	0,19 мг/кг
<b>п.Жанбай 4 точка</b>	Медь	0,47 мг/кг

	Марганец	0,05 мг/кг
	Хром	0,11 мг/кг
	Нефтепродукты	1,3%
	Свинец	0,22%
	Цинк	2 мг/кг
	Никель	0,46 мг/кг
	Кадмий	0,22 мг/кг
	п.Жанбай 5 точка	Медь
Марганец		0,06 мг/кг
Хром		0,09 мг/кг
Нефтепродукты		1,85%
Свинец		0,2 мг/кг
Цинк		2,3 мг/кг
Никель		0,42 мг/кг
Кадмий		0,31 мг/кг

Приложение 6

Справочный раздел Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м <sup>3</sup>		Класс опасности
	максимально разовая	средне-суточная	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м <sup>3</sup>	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	
Хлористый водород	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фтористый водород	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (СанПин №КР ДСМ-70 от 2 августа 2022 года)

### Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение атмосферного воздуха	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, %	0-1 0
II	Повышенное	СИ НП, %	2-4 1-19
III	Высокое	СИ НП, %	5-10 20-49
IV	Очень высокое	СИ НП, %	>10 >50

РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке построению, изложению и содержанию

**ФИЛИАЛ РГП «КАЗГИДРОМЕТ»  
ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ  
АДРЕС:  
ГОРОД АТЫРАУ  
УЛ. ТАЛГАТА БИГЕЛЬДИНОВА 10А  
ТЕЛ. 8-(7122)-52-20-96**

**E MAIL: [INFO\\_ATR@METEO.KZ](mailto:INFO_ATR@METEO.KZ)**