

Краткий агрометеорологический обзор за 3-ю декаду июня 2023 года.

В третьей декаде июня в основном сложились удовлетворительные условия для роста и развития яровых зерновых культур в северной половине страны, выпавшие осадки на севере, на востоке, юго-востоке и местами на западе страны несколько улучшили атмосферное и почвенное увлажнение.

Повсеместно приступили к химической обработке сорняков гербицидами, а также против вредителей и болезней.

В западных областях у яровых зерновых культур отмечается фаза развития «выход в трубку» – «цветение», на отдельных участках - «восковая спелость», в северных областях «кущение»- «колошение», в центре и на востоке страны «кущение» - «колошение», на отдельных участках – «цветение». Состояние зерновых культур в основном отличное и хорошее, местами удовлетворительное. На юге страны приступили к уборке ярового ячменя, фаза развития «полная спелость», на поздних посевах «появление нижнего стеблевого узла» - «колошение».

В третьей декаде июня в районах возделывания озимой пшеницы были благоприятные условия для полного созревания зерна, фаза развития «молочная спелость» - «полная спелость». В Жамбылском районе (агропост Аса) на наблюдаемых участках приступили к уборке урожая озимой пшеницы.

Состояние теплолюбивых культур (рис, кукуруза на зерно, сахарная свекла, соя, хлопчатник) отличное и хорошее, повсеместно приступили к вегетационному поливу, к напуску воды в рисовые чеки.

В Актюбинской, Северо-Казахстанской, Абайской и Карагандинской областях у картофеля отмечается фаза «появление боковых побегов» - «появление соцветий», в отдельных районах наблюдается - «цветение».

На юге и юго-востоке республики в яблоневых садах продолжается фаза развития «формирование плодов» - «созревание побегов». Состояние плодовых культур (вишня, груша, яблоня) повсеместно хорошее.

В южных областях продолжается укос трав люцерны и клевера, подпитывающий полив эспарцета.

Погода в истекшей декаде благоприятствовала повсеместно выпасу скота. Продолжаются ветеринарные мероприятия, уборка трав и подвоз кормов к местам зимовки животных. Пастбища были слабо и умеренно стравлены, состояние травостоя в основном хорошее и удовлетворительное. На большей территории пастбищного животноводства отмечалось в основном сухое и сырое состояние дернины.