

СОЛТУСТИК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ҚОРШАҒАН ОРТА ЖАЙ-КҮЙІ ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ БЮЛЛЕТЕНІ

ШПДЕ 2023 жыл



«КАЗГИДРОМЕТ» РМК СОЛТУСТИК
ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ФИЛИАЛЫ

| | Мазмұны | Бет. |
|----------|--|-------------|
| 1 | Алғы сөз | 3 |
| 2 | Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері | 4 |
| 3 | Атмосфералық ауа сапасының жай-күйі | 4 |
| 4 | Жер үсті сулары сапасының жай-күйі | 7 |
| 5 | Радиациялық жағдай | 8 |
| 6 | Топырақтың ауыр металдармен ластану жай-күйі | 8 |
| 7 | Қосымша 1 | 9 |
| 8 | Қосымша 2 | 9 |
| 9 | Қосымша 3 | 10 |

1. Алғы сөз

Ақпараттық бюллетенің Ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің бақылау желісінде қоршаған ортаның жай-күйіне мониторинг жүргізу бойынша "Қазгидромет" РМК мамандандырылған бөлімшелері орындастын жұмыстардың нәтижелері бойынша дайындалған.

Бюллетені мемлекеттік органдарды, жұртшылықты және халықты Солтүстік Қазақстан облысының аумағындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттандыруға арналған және ластану деңгейінде болып жатқан өзгерістер үрдісін ескере отырып, КР Қоршаған ортаны қорғау саласындағы іс- шаралардың тиімділігін одан әрі бағалау үшін қажет.

Солтүстік Қазақстан облысының атмосфералық ауа сапасын бағалау

2. Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері

Солтүстік Қазақстан облысында атмосфералық ауаға ластаушы заттардың түсінің негізгі көздері энергетика объектілері, өнеркәсіптік кәсіпорындар және автокөлік болып табылады.

Есептік деректерге (өндірістік экологиялық бақылау нәтижелері бойынша есептер) сәйкес Солтүстік Қазақстан облысында ластаушы заттар шығарындыларының жалпы саны 27,127 мың тоннаны құрады.

Облыс орталығы-Петропавл қаласы-СҚО әуе бассейнін ластауға ең көп үлес қосады. Мұнда облыстың стационарлық көздерінен ластауыш заттардың жалпы шығарындыларының 46,9% — ға жуығын беретін кәсіпорын- "СевКазЭнерго" АҚ (ЖЭО-2) орналасқан.

3. Петропавл қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жайкүйі.

Петропавл қаласы аумағында атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 4 бақылау бекетінде, оның ішінде 2 сынаманы қолмен іріктеу бекетінде және 2 автоматты станцияда жүргізіледі(Косымша 1).

Жалпы қала бойынша 10 көрсеткіш анықталады: 1) қалқыма бөлшектер (шан);

5) 2) PM-10 қалқыма бөлшектері; 3) күкірт диоксиді; 4) көміртегі оксиді; 5) азот диоксиді; 6) азот оксиді; 7) озон (жербеті); 8) күкірт сутегі; 9) фенол; 10) формальдегид.

1- кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

1 кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

| № | Бақылау жүргізу | Бекет мекен-жайы | Анықталатын қоспалар |
|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | қол күшімен алынған сынама | Ш. Уалиханов көшесі, 19 Б | қалқыма бөлшектер (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, фенол, формальдегид, азот оксиді |
| 3 | | Жумабаев көшесі, 101А | |
| 5 | үзіліссіз режимде 20 минут сайын | Парковая көшесі, 57В | PM-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, озон (жербеті), күкірт сутегі |
| 6 | | Ж. Кизатов көшесі, 3Т | |

Солтүстік Қазақстан облысында ауаның ластануына бақылау Петропавл қ., жүргізілді (№1 нұктеде- «Береке» шағын ауданы).

Күкірт диоксидінің, көміртегі оксидінің, азот диоксидінің, фенолдың, формальдегиддың, күкірт сутегінің шоғырлары өлшеннеді.

Петропавл қ. 2023 жылғы шілде айындағы атмосфералық ауа сапасы мониторинг нәтижелері

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі **жоғары** болып бағаланды, ол №6 бекет аумағында күкірт сутегі бойынша СИ=9,3 (жоғары деңгей) және ЕЖҚ = 2% (көтерінкі деңгей) мәнімен анықталды.

Орташа – тәулік шоғыры озон бойынша 2,65 ШЖШ_{о.т}

Максималды – бірлік шоғырлар күкірт сутегі – 9,3 ШЖШ_{м.б.}. Басқа ластаушы заттардың максималды-бірлік шоғырлары ШЖШ - дан аспады.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: Атмосфералық ауаның жоғары ластануы (ЖЛ), экстремалды жоғары ластануы (ЭЖЛ) жағдайлары анықталған жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінен асып кету еселігі және асып кету жағдайларының саны 2-кестеде көрсетілген.

2-кесте

Атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы

| Қоспа | Орташа шоғыр | | Ең үлкен бір реттік шоғыр | | ЕЖҚ % | ШЖШ арту жағдайларының саны | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------|----------|---------|
| | МГ/М ³ | ШЖШ _{о.т.} асу еселігі | МГ/М ³ | ШЖШ _{м.б.} асу еселігі | | >ШЖШ | >5 ШЖШ | >10 ШЖШ |
| Петропавл қаласы | | | | | | | | |
| Қалқымабөлшектер (шан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PM-10 қалқымабөлшектері | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Күкіртдиоксиді | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Көміртегіоксиді | 0,59 | 0,20 | 3,03 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Азот диоксиді | 0,03 | 0,63 | 0,10 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Азот оксиді | 0,03 | 0,49 | 0,21 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Күкірт сутегі | 0,001 | | 0,07 | 9,3 | 2 | 53 | 8 | 0 |
| Озон (жербеті) | 0,0794 | 2,65 | 0,130 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фенол | 0,002 | 0,59 | 0,006 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Формальдегид | 0,01 | 0,92 | 0,03 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Көртынды:

Соңғы бес жылда шілде айында ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, 2019-2022 жылдар аралығындағы шілде айындағы ластану деңгейі жоғары деп бағаланды. 2023 жылы шілдеде ауаның ластану деңгейі жоғары деп бағаланды.

Метеорологиялық жағдайлар

Шілде айында облыс бойынша ауаның орташа айлық температурасы $^{\circ}\text{C}$ жылы болды, бұл мөлшер шамасында және мөлшерден $^{\circ}\text{C}$ жоғары.

Жауын-шашынның мөлшері облыс бойынша мөлшерден көп мм, бұл мөлшерден ауып кетуі % құрады, кей жерлерде мөлшер шамасында және мөлшерден аз мм, бұл мөлшерден ауып кетуі % құрады.

Бірінші онкүндіктің бірінші жартысында, екінші онкүндіктің ортасында және екінші жартысында, үшінші онкүндікте облыс аумағына циклондар мен атмосфералық фронттар әсер етті. Тұраксыз ауа райы бақыланды: ауа температурасының ауытқуы, жауын-шашын, наизағай, бұршақ, шаңды бұрқасын, ұйтқыма жел күші 15-28 м/с, кей жерлерде екпіні 30 м/с дейін.

Солтүстік Қазақстан облысының аумағындағы атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамы

Атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамына бақылау Петропавл метеостанциясында алынған жаңбыр суына сынама алушмен жүргізілді.

Петропавл МС жауын-шашын құрамында барлық анықталатын заттардың шоғырлары шекті жол берілген шоғырлардан (ШЖШ) аспады. Жауын-шашын сынамаларында сульфаттар 43,18 %, гидрокарбонаттар 10,62 %, хлоридтер 12,97 %, кальций иондары 11,18 % және натрий иондары 7,03 % болды. Жалпы минерализация 19,50 мг/дм³, электротәжігіштік – 36,00 мкСм/см құрады.

Тұсken жауын-шашын қышқылдылығы нейтралды сипатқа ие болды (5,99).

4. Солтүстік Қазақстан облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторингі

Солтүстік Қазақстан облысы аумағында жер үсті суларының сапасына бақылау 2 су нысанында (Есіл өзені), 6 тұстамада жүргізіледі

Жер үсті суларын зерттеу кезінде су сынамаларында су сапасының **47** физикалық және химиялық көрсеткіштері анықталады: *көзбен шолу, температура, қалқыма заттар, менишікті электроткізгіштік, тұсі, иісі, мөлдірлігі, сутегі көрсеткіші (рН), еріген оттегі, % оттекпен қанықтыру, құргақ қалдық, ОБТ₅, ОХТ, құрамында тұз бар негізгі иондар, биогенді элементтер, органикалық заттар (мұнай өнімдері, фенолдар), ауыр металдар, пестицидтер.*

Солтүстік Қазақстан облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторинг нәтижелері

Қазақстан Республикасының су объектілерінің су сапасын бағалауға арналған негізгі нормативтік құжаттар «Су объектілерінде судың сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі» (бұдан әрі - Бірыңғай жіктеме) болып табылады.

Су объектілерінің су сапасы Бірыңғай жіктеме бойынша келесідей бағаланады:

3 кесте

| Су объектісінің атауы | Су сапасының класы | | Көрсеткіштер | Елш. бірл. | Концентрация |
|------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| | 2022 ж. Шілде | 2023 ж. Шілде | | | |
| Есіл өзені | 4 класс | Нормалан байды (>3 класстан) | Фенолдар | мг/дм ³ | 0,0015 |
| Сергеевское су қоймасы | 3 класс | Нормалан байды (>3 класстан) | Фенолдар | мг/дм ³ | 0,0017 |

* - бұл кластагы заттар нормаланбайды

Кестеден көріп отырганымыздай, 2022 жылғы шілде айымен салыстырғанда Есіл өзеніндегі судың сапасы – жақсарды, Сергеевское су қоймасы – нашарлады.

Солтүстік Қазақстан облысының су объектілеріндегі негізгі ластаушы заттар фенолдар болып табылады. Осы көрсеткіштер бойынша сапа нормативтерінің асып кетуі, негізінен, елді-мекендердің ағынды суларын төгілуімен байланысты.

Су объектілерінің тұстамалар шегіндегі су сапасы бойынша 2-қосымшада көрсетілген

Жоғары (ЖЛ) және экстремалды жоғары ластану (ЭЖЛ) жағдайлары

2023 жылдың шілде айында облыс аумағында жоғары ластану (ЖЛ) және экстремалды жоғары ластану (ЭЖЛ) жағдайлары анықталмады.

5. Радиациялық жағдай

Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне құнсайын жергілікті 3 метеорологиялық станцияларда (Возвышенка, Петропавл, Сергеевка) бақылау жүргізілді.

Облыстың елді-мекендері бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатының орташа радиациялық гамма-фонның мәні 0,05-0,17 мкЗв/сағ. шегінде болды. Облыс бойынша радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,10 мкЗв/сағ. және шекті жол берілетін шама аралығында болды.

Атмосфераның жерге жақын қабатының радиоактивті ластануына бақылау Солтүстік Қазақстан облысының аумағында 2 метеорологиялық станцияда (Петропавл, Сергеевка) ауа сынамасын горизонтальді планшеттермен бес тәуліктік сынама алу жолымен жүзеге асырылды. Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатының радиоактивті түсулерінің орташа тәуліктік тығыздығы 1,4-1,9 Бк/м² шегінде болды. Радиоактивті түсулер тығыздығының орташа мәні 1,6 Бк/м² құрады, ол шекті жол берілетін шегі деңгейінен аспады.

6. 2023 жылдың жаз мезгіліндегі Солтүстік Қазақстан облысы бойынша топырақтың жай-күйі

Петропавл қаласында аудандардан алынған топырақта мыс концентрациясы 0,82-14,44 мг/кг, қорғасын – 8,48-31,27 мг/кг, мырыш – 0,07-2,98 мг/кг, хром – 0,38-2,83 мг/кг және кадмий – 0,12- 0,37 мг/кг шамасында болды.

"Киров" зауыты ауданында топырақ сынамаларында мыс бойынша шекті рұқсат етілген концентраттың артуы 4,77 ШЖК.

№ 4 мектеп ауданында топырақ сынамасынан мыс бойынша шекті рұқсат етілген концентраттың артуы 4,81 ШЖК.


Мир және Интернационал көшелерінің қылышында топырақ сынамаларында мыс 3,78 ШЖК асып кеткендігі анықталды.

Саябақ аймағы ауданында топырақ сынамаларында мыс бойынша 3,78 ШЖК артық екені анықталды.

ТЭЦ-2 ауданында топырақ сынамаларында мыс бойынша 1,00 ШЖК артық екені анықталды.

Алқаптардан ірітелген топырақтың қалған сынамаларында барлық анықталған қоспалардың құрамы рұқсат етілген норма шегінде болды.

1-қосымша



Сур.1 – Ластануды бақылаудың стационарлық желісінің орналасу
схемасы СКО атмосфералық ауасы

2-қосымша

3-

Солтүстік Қазақстан облысы аумағындағы жер үсті су сапасының тұстамалар бойынша ақпараты

| Су объектісі және тұстама | Физика-химиялық көрсеткіштер бойынша сипаттамасы | |
|--|--|--|
| Есіл өзені | су температурасы 19,8 – 23,3 °C, сутегі көрсеткіші 7,98 - 8,38, суда еріген оттегінің концентрациясы –8,01 – 9,08 мг/дм ³ құрады, ОБТ ₅ – 0,85 – 2,51 мг/дм ³ , мөлдірлік – 14 - 30 см. | |
| Сергеевка қ. Сергеевка қаласынан 0,2 км жоғары | Нормаланбайды (>3 класстан) | Фенолдар – 0,0021 мг/дм ³ . Фенолдар нақты концентрациясы фондық кластан асады |
| Покровка а., Покровка ауылынан 0,2 км жоғары | Нормаланбайды (>3 класстан) | Фенолдар – 0,0014 мг/дм ³ . Фенолдар нақты концентрациясы фондық кластан асады |
| Петропавл қ., Петропавл қаласынан 0,2 км жоғары | Нормаланбайды (>3 класстан) | Фенолдар – 0,0011 мг/дм ³ . Фенолдар нақты концентрациясы фондық кластан асады |
| Петропавл қ., Петропавл қаласынан 4,8 км төмен, 5,8 км ТЭЦ-2 ағын суларынан төмен | Нормаланбайды (>3 класстан) | Фенолдар – 0,0012 мг/дм ³ . Фенолдар нақты концентрациясы фондық кластан асады |
| Долматово а., Долматово а. 0,4 км төмен | 4 класс | Қалқыма заттар – 10,5 мг/дм ³ , фенолдар – 0,0019 мг/дм ³ . Қалқыма заттар және фенолдар нақты концентрациясы фондық кластан асады |
| Сергеевское су қоймасы | су температурасы 20,4 °C, сутегі көрсеткіші 7,69, суда еріген оттегінің концентрациясы –8,92 мг/дм ³ құрады, ОБТ ₅ – 0,76 мг/дм ³ , мөлдірлік - 30 см | |
| Сергеевска қ. Сергеевка қаласынан ОБ қарай 1 км; КГБ 95° азимут бойынша бөгеттен 2м жоғары | Нормаланбайды (>3 класстан) | Фенолдар – 0,0017 мг/дм ³ . Фенолдар нақты концентрациясы фондық кластан асады |

* - бұл кластагы заттар нормаланбайды

4-қосымша

Анықтама бөлім

Елді мекендердің ауасындағы ластаушы заттардың рұқсат етілген шекті шоғырлануы (ШЖК)

| Қоспа атауы | ШЖК мәні , мг/м³ | | Қауіпсіздік класы |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| | Максималды бір реттік | Орташа-тәуліктік | |
| Азот диоксиді | 0,2 | 0,04 | 2 |
| Азот оксиді | 0,4 | 0,06 | 3 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Бенз/а/пирен | - | 0,1 мкг/100 м³ | 1 |
| Бензол | 0,3 | 0,1 | 2 |
| Бериллий | 0,09 | 0,00001 | 1 |
| Қалқыма бөлшектер (шан) | 0,5 | 0,15 | 3 |
| М-10 қалқыма бөлшектері | 0,3 | 0,06 | |
| РМ-2,5 қалқыма бөлшектері | 0,16 | 0,035 | |
| Хлорлы сутегі | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Кадмий | - | 0,0003 | 1 |
| Кобальт | - | 0,001 | 2 |
| Марганец | 0,01 | 0,001 | 2 |
| Мыс | - | 0,002 | 2 |
| Күшала | - | 0,0003 | 2 |
| Озон (жербеті) | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Қорғасын | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Құқірт диоксиді | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Құқірт қышқылы | 0,3 | 0,1 | 2 |
| Құқіртті сутегі | 0,008 | - | 2 |
| Көміртегі оксиді | 5,0 | 3 | 4 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,05 | 0,01 | 2 |
| Фторлы сутегі | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |
| Мырыш | - | 0,05 | 3 |

«Қалалық және ауылдық елді-мекендердегі атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық нормативтер» (2022 жылғы 2 тамыздағы № КР ДСМ-70 СанЕН);

Атмосфераның ластану индексінің дәрежесін бағалау

| Градациялар | Атмосфераның ластануы | Атмосфера ластануының көрсеткіштері | Бір айға бағалау |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|
| I | Тәмен | СИ ЕЖҚ, % | 0-1 0 |
| II | Көтеріңкі | СИ ЕЖҚ, % | 2-4 1-19 |
| III | Жоғары | СИ ЕЖҚ, % | 5-10 20-49 |
| IV | Өте жоғары | СИ ЕЖҚ, % | >10 >50 |

Мемлекеттік органдарды тұрғындар қогамдастығын ақпараттандыру үшін қалалардың атмосфера ластануының жай-күйі жөніндегі күжат 52.04.667-2005 БҚ. Өзірлеуге, салуга,

баяндауғажәнемазмұндауғақойылатынжалпыталаңтар.

Су пайдаланудың санаттары (түрлөрі) бойынша суды пайдалану сыныптарын саралау

| Суды пайдаланусанаты (түрі) | Тазартумақсаты/түрі | Суды пайдаланусыныптары | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 1- сынып | 2- сынып | 3- сынып | 4- сынып | 5- сынып |
| Балықшаруашылығы | Албыртбалық | + | + | - | - | - |
| | Тұқыбалық | + | + | + | - | - |
| Шаруашылық- ауызсұменжабдықтау | Қарапайым су дайындау | + | + | - | - | - |
| | Дағдылы су дайындау | + | + | + | - | - |
| | Қарқынды су дайындау | + | + | + | + | - |
| Рекреация | | + | + | + | - | - |
| Суару | Дайындықсыз | + | + | + | + | - |
| | Картадатұнбалау | + | + | + | + | + |
| Өнеркәсіптік: | | | | | | |
| технологиялық мақсатта, салқыннатуурдісі | | + | + | + | + | - |
| гидроэнергетика | | + | + | + | + | + |
| пайдалықазбалардың діру | | + | + | + | + | + |
| су көлігі | | + | + | + | + | + |

Су обьектілерінде су сапасынжіктеудің бірыңғай жүйесі (КР АШМ СРК 09.11.2016 жылғы №151 бұйрығы)

Радиациялық қауіпсіздік нормативі*

| Нормаланатын шамалар | Дозалар шектері | |
|----------------------|-----------------|--|
| | Тиімді доза | Халық |
| | | кез келген соңғы 5 жыл ішінде орташа жылына 1 мЗв, бірақ жылына 5 мЗв артық емес |

*«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар»

**«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК СҚО БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
МЕКЕН ЖАЙЫ:
ПЕТРОПАВЛ ҚАЛАСЫ
ПАРКОВАЯ КӨШЕСІ 57А
ТЕЛ. 8-(7152)-50-09-42
E MAIL:LABOR_XIM@MAIL.RU**