


# Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды по г.Шымкент и Туркестанской области за октябрь месяц 2023 года



Министерство экологии и природных ресурсов  
Республики Казахстан  
Филиал РГП "Казгидромет"  
по Туркестанской области  
г.Шымкент, ул.Жылқышнева, 44  
[lmzps\\_uko@meteo.kz](mailto:lmzps_uko@meteo.kz)

	<b>СОДЕРЖАНИЕ</b>	<b>Стр.</b>
	<b>Предисловие</b>	3
<b>1</b>	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
<b>2</b>	Состояние качества атмосферного воздуха	4
<b>3</b>	Состояние качества атмосферных осадков	8
<b>4</b>	Мониторинг качества поверхностных вод	13
<b>5</b>	Результаты мониторинга качества поверхностных вод	13
<b>6</b>	Результаты мониторинга донных отложений водных объектов	14
<b>7</b>	Радиационная обстановка	15
<b>8</b>	Состояние загрязнения почв тяжелыми металлами	15
<b>9</b>	<b>Приложение 1</b>	17
<b>10</b>	<b>Приложение 2</b>	20
<b>11</b>	<b>Приложение 3</b>	21
<b>12</b>	<b>Приложение 4</b>	22
<b>13</b>	<b>Приложение 5</b>	24

## **Предисловие**

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Туркестанской области, и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

## **Оценка качества атмосферного воздуха Туркестанской области. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха.**

Согласно статистическим данным по городу Шымкент количество стационарных источников выбросов загрязняющих веществ составляет 5166 единиц, за 2019 год объем фактических выбросов составил 29793,5 тонн /год, при разрешенном объеме 59420,8 тонн/год.

В г. Шымкент насчитывается 14716 домов, не обеспеченных природным газом. В городе Туркестан насчитывается 72123 индивидуальных домов, в городе Кентау 68669 индивидуальных домов.

По состоянию на ноябрь 2020 года в городе Шымкент имеются 251510 единиц автотранспортных средств. Из них: легковые автомобили 206292 единиц и составляют 90,4% от общего количества АТС, автобусы 5623 единиц, составляют 2,5%, грузовые автомобили 16087 единиц составляют 7,0% и специальная техника 304 единиц, составляет 0,1%.

Объем выбросов вредных загрязняющих веществ от автомобильного транспорта по городу Шымкент за 2019 год составил 40409,1 тонн.

Расчетное валовое количество выбросов вредных загрязняющих веществ от автомобильного транспорта по городу Шымкент на 2020 год (годовое расчетное количество выбросов) составит 46778,9 тонн.

Основное количество вредных выбросов приходится на долю легковых автомобилей 73,2% от общего количества. Грузовыми автомобилями выделяются 17,5% и автобусами 8,9% выбросов.

### **1. Мониторинг качества атмосферного воздуха г. Шымкент.**

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха г. Шымкент проводятся на 6 постах наблюдения, в том числе на 4 постах ручного отбора проб и на 2 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 16 показателей 1) *взвешенные частицы(пыль);* 2) *взвешенные частицы PM 2,5;* 3)*взвешенные частицы PM 10;* 4) *диоксид серы;* 5) *оксид углерода;* 6)*диоксид азота;* 7) *аммиак;* 8) *сероводород;* 9) *формальдегид;* 10) *оксид азота;* 11) *бенз(a)пирен,*12) *кадмий;* 13) *медь;* 14) *мышьяк;* 15) *свинец;* 16) *хром.*

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6 стационарных постах (таблица 1).

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№ поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адреса постов	Определяемые примеси
1			пр. Абая, АО «Южполиметалл»	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак, сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен Тяжелые металлы: кадмий, медь, мышьяк, свинец, хром
2	3 раза в сутки	ручной отбор проб (дискретные методы)	площадь Ордабасы, пересечение ул. Казыбек би и Толе би	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак, сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен Тяжелые металлы: кадмий, медь, мышьяк, свинец, хром
3			ул. Алдиярова, б/н, АО «Шымкентцемент»	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак, сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен Тяжелые металлы: кадмий, медь, мышьяк, свинец, хром
8			ул. Сайрамская, 198, ЗАО «Пивзавод»	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак, сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен Тяжелые металлы: кадмий, медь, мышьяк, свинец, хром
5	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	микрорайон Самал-3	взвешенные частицы РМ 2.5, взвешенные частицы РМ 10, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сероводород
6			микрорайон Нурсат	диоксид серы, сероводород,

## Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха г. Шымкент за октябрь месяц 2023 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха города Шымкент оценивался как **высокий**, он определялся значением **СИ=4,83** (повышенный уровень) и **НП=31%** (высокий уровень) по сероводороду в районе поста №6 (мкр.Нурсат).

*\*Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.*

Средние концентрации формальдегида – 2,02 ПДК<sub>с.с.</sub>, диоксида азота – 1,40 ПДК<sub>с.с.</sub>, взвешенных веществ – 1,47 ПДК<sub>с.с.</sub>, содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации сероводорода – 4,83 ПДК<sub>м.р.</sub>, диоксид серы – 1,60 ПДК<sub>м.р.</sub>, оксид углерода-2,20 ПДК<sub>м.р.</sub>, содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 2).

Случай экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.

*Таблица 2*  
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>м.р.</sub>		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
г. Шымкент								
Взвешенные вещества	0,2207	1,47	0,400	0,80	0,00	0	0	0
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0000	0,00	0,000	0,00	0,00	0	0	0
Взвешенные частицы РМ-10	0,0000	0,00	0,000	0,00	0,00	0	0	0
Диоксид серы	0,0162	0,32	0,800	1,60	0,15	7	0	0
Оксид углерода	1,9680	0,66	11,00	2,20	1,18	30	0	0
Диоксид азота	0,0560	1,40	0,100	0,50	0,00	0	0	0
Оксид азота	0,0209	0,35	0,040	0,10	0,00	0	0	0
Сероводород	0,0136		0,039	4,83	17,0	810	0	0
Аммиак	0,0186	0,47	0,040	0,20	0,00	0	0	0
Формальдегид	0,0202	2,02	0,029	0,58	0,00	0	0	0
Бенз(а)пирен	0,0001	0,06						
кадмий	0,000024	0,080	0,0000 28					
медь	0,000023	0,012	0,0000					

			27				
мышьяк	0,000012	0,004	0,0000 15				
свинец	0,000023	0,077	0,0000 27				
хром	0,000001	0,001	0,0000 02				

### Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха изменялся следующим образом:



Как видно из графика, в 2019-2022гг уровень загрязнения атмосферного воздуха города Шымкент оценивался как повышенный, в 2023г оценивался высоким.

Увеличение показателя наибольшей повторяемости отмечено в основном за счет сереводорода.

### Метеорологические условия

Влияние погодных условий на формирование загрязнения воздуха за октябрь месяц не отмечено, дней с НМУ (неблагоприятных условий) не зафиксировано.

## 2. Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха жилого массива Кызылсай за октябрь месяц 2023 года

В целом определяется 4 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) озон.

В таблице 3 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 3

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	п. Кызылсай, ул Омарташы, 1	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон

Уровень загрязнения атмосферного воздуха жилого массива Кызылсай оценивался как **повышенный** уровень, он определялся значением **СИ=1,68** (низкий уровень) и **НП =19%** (повышенный уровень).

\*Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Средние концентрации диоксида азота – 4,18 ПДК<sub>с.с.</sub>, содержание других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации диоксида азота – 1,68 ПДК<sub>м.р.</sub>, содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 4).

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 4.

Таблица 4  
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>м.р.</sub>		%	>ПДК	>5 ПДК
<b>Кызылсай</b>								
Диоксид серы	0,0337	0,67	0,3161	0,63	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,6328	0,21	3,2866	0,66	0,00	0	0	0
Диоксид азота	0,1673	4,18	0,3357	1,68	18,6	415	0	0
Озон	0,0038	0,13	0,1073	0,67	0,00	0	0	0
<b>В том числе</b>								

### 3. Состояние качества атмосферных осадков

Наблюдение за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды 2 метеостанциях (Казыгурт, Шымкент) (рис. 14.4).

Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ, в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).

В пробах осадков преобладало содержание гидрокарбонатов 37,05%, сульфатов 26,30%, ионов кальция 18,34 %, ионов натрия 4,21 %, хлоридов 5,61 %.

Наибольшая минерализация составила на МС Казыгурт – 116,09 мг/л, наименьшая на МС Шымкент – 99,22 мг/л.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков на МС Казыгурт составила –167,8 мкСм/см, на МС Шымкент – 196,0 мкСм/см.

Кислотность выпавших осадков находится в пределах от 6,88 (МС Шымкент) до 7,05 (МС Казыгурт).

#### **4. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Туркестан**

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Туркестан проводятся на 3 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 6 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) оксид азота; 5) озон; 6)сереводород.

В таблице 5 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

*Таблица 5*  
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

<b>Номер поста</b>	<b>Сроки отбора</b>	<b>Проведение наблюдений</b>	<b>Адрес поста</b>	<b>Определяемые примеси</b>
1			ул. Алаша Байтак жырау, район Оралман	Диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сереводород
2	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	Пр. Б.Саттарханова	диоксид азота, диоксид серы,
3			ул. А. Сандыбая, 58В	оксид углерода, озон

#### **Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Туркестан за октябрь месяц 2023 года.**

По данным стационарной сети наблюдений г. Туркестан, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался **высокий, СИ = 4,87** (повышенный уровень) по диоксида серы и **НП = 49%** (высокий уровень) по диоксиду азота в районе поста №3 (в центре города ул. Н. Назарбаева 1).

*\*Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.*

Средние концентрации диоксида азота – 3,17 ПДК<sub>с.с.</sub>, оксид азота – 1,51 ПДК<sub>с.с.</sub>, диоксид серы – 2,07 ПДК<sub>с.с.</sub>, содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимальная разовая концентрация диоксида азота – 3,80 ПДК<sub>м.р.</sub>, диоксид серы – 4,87 ПДК<sub>м.р.</sub>, оксид азота – 1,81 ПДК<sub>м.р.</sub>, оксид углерода –

1,48 ПДК<sub>м.р.</sub>, содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 6).

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 6.


Таблица 6

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>			
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>м.р.</sub>		>ПДК	>5ПДК	>10ПДК	
						в том числе			
<b>г.Туркестан</b>									
Диоксид азота	0,127	3,17	0,761	3,80	23,16	1551	0	0	
Диоксид серы	0,103	2,07	2,437	4,87	8,69	540	0	0	
Оксид азота	0,091	1,51	0,724	1,81	6,54	146	0	0	
Оксид углерода	0,812	0,27	7,401	1,48	0,52	35	0	0	
Озон	0,026	0,87	0,047	0,30	0,00	0	0	0	
Сероводород	0,0008		0,008	0,99	0,00	0	0	0	

**Выводы:**

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха изменялся следующим образом:



Как видно из графика, в 2019-2022 гг уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Туркестан оценивался как повышенный, в 2023 г оценивался высоким.

Увеличение показателя наибольшей повторяемости отмечено в основном за счет диоксида азота.

## 5. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Кентау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории города Кентау проводятся на 1 автоматической станции (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 3 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) сероводород.

В таблице 7 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 7

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
7	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	ул. Валиханова, уч. 3 «А»	Сероводород, оксид углерода, диоксид серы

### Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в городе Кентау за октябрь месяц 2023 года.

По данным сети наблюдений города Кентау, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался **повышенным**, он определялся значениями СИ=1,84 (повышенный уровень) и НП = 14 % ( повышенный уровень).

Средние разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимальная разовая концентрация сероводорода – 1,84 ПДК<sub>м.р.</sub>, содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 8).

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.


Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 8.

Таблица 8

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>м.р.</sub>		>ПДК	>5ПДК	>10ПДК
	в том числе							
<b>г. Кентау</b>								
Диоксид серы	0,0042	0,08	0,0202	0,04	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,3162	0,11	4,403	0,88	0,00	0	0	0
Сероводород	0,0024		0,0147	1,84	13,7	306	0	0

### Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха изменялся следующим образом:



Как видно из графика, за период 2019-2022гг уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Кентау оценивался как низким, уровень загрязнения в октябре месяце 2023г оценивался повышенным.

## 6. Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха поселка Састобе Туркестанской области за октябрь месяц 2023года

В целом определяется 4 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) озон.

В таблице 9 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 9  
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	п.Састобе, ул Г.Муратбаева, 1А	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха поселка **Састобе** оценивался как **низкий**, он определялся значением **СИ=0,46** (низкий уровень) и **НП=0%** (низкий уровень).

Средние концентрации диоксида азота – 1,31 ПДК<sub>с.с.</sub>, озон – 1,91 ПДК<sub>с.с.</sub>, содержание других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.

Максимально разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 10).

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 10.

Таблица 10  
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>м.р.</sub>		%	>ПДК	>5 ПДК
в том числе								
Состоиние								
Диоксид серы	0,0011	0,02	0,0539	0,11	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,6392	0,21	1,7482	0,35	0,00	0	0	0
Диоксид азота	0,0524	1,31	0,0924	0,46	0,00	0	0	0
Озон	0,0572	1,91	0,0644	0,40	0,00	0	0	0

## 7. Мониторинг качества поверхностных вод на территории Туркестанской области

Мониторинг за состоянием качества поверхностных вод проводились на **6** водных объектах, реки: Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Аксу, Катта-Бугунь на 11 створах.

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются **40** физико-химические показателей качества (*температура воды, растворенный кислород, водородный показатель, взвешенные вещества, прозрачность, БПК<sub>5</sub> и ХПК, главные ионы, биогенные (аммоний-, нитрит-, нитрат-ионы, фосфаты и общий фосфор) и органические вещества (нефтепродукты, СПАВ, фенолы), тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, кадмий, хром, никель, ртуть), пестициды (ДДТ, ДДЕ, альфа и гамма ГХЦГ)*).

Мониторинг **качества донных отложений** проводились по 2 контрольным точкам реки Сырдария.

В пробе донных отложений проведен анализ тяжелых металлов (свинец, кадмий, марганец, медь, цинк, никель, хром) и органических веществ (нефтепродукты).

## 8. Результаты мониторинга качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Туркестанской области

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 3

Наименование водного объекта	Класс качества воды		Параметры	Ед. изм.	Концентрация
	Октябрь 2022 г.	Октябрь 2023 г.			
Река Сырдария	4 класс	4 класс	Магний	мг/дм <sup>3</sup>	48,8
			Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	352,2
Река Келес	Не нормируется (>5 класс)	4 класс	Фосфор общий	мг/дм <sup>3</sup>	0,412
			Магний	мг/дм <sup>3</sup>	42,0
Река Бадам	3 класс	3 класс	Магний	мг/дм <sup>3</sup>	27,6
Река Арыс	3 класс	3 класс	Магний	мг/дм <sup>3</sup>	26,4
Река Аксу	1 класс*	1 класс*			
Река Катта-буғунь	1 класс*	Не нормируется (>5 класс)	Взвешенные вещества	мг/дм <sup>3</sup>	42,6
Водохранилище Шардара	Не нормируется (>5 класс)	Не нормируется (>5 класс)	Взвешенные вещества	мг/дм <sup>3</sup>	63,0

Примечание: \* - вода «наилучшего класса»

\*\*\* - Вещества по данному классу не нормируются

Как видно из таблицы 3, сравнение с октябрем 2022 года качество поверхностных вод реки Келес перешло с выше 5 класса в 4 класс – улучшилось.

Качество поверхностных вод реки Катта-буғунь перешло с 1 класса в выше 5 класс - ухудшилось.

Качество поверхностных вод рек Сырдария, Бадам, Арыс, Аксу и водохранилище Шардара существенно не изменилось.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах Туркестанской области являются магний, сульфаты, фосфор общий и взвешенные вещества. Превышения нормативов качества по данным показателям в основном характерны для бытовых, индустриальных и сельскохозяйственных сбросов.

За октябрь 2023 года случаи высокого и экстремально-высокого загрязнения поверхностных вод на территории Туркестанской области не выявлены.

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

## 9. Результаты мониторинга донных отложений водных объектов на территории Туркестанской области

По результатам исследования донных отложений в бассейне реки Сырдария содержание тяжелых металлов изменилось в следующих пределах: медь – 0,68-0,78 мг/кг, никель – 0,72-0,85 мг/кг, марганец – 0,60-0,75 мг/кг, хром – 0,06-0,09 мг/кг, цинк – 2,1-2,4 мг/кг, концентрации свинца и кадмий не обнаружено. Содержание нефтепродуктов составило – 1,68-1,85 %.

Результаты исследования донных отложений воды бассейна реки Сырдария представлена в Приложении 3.

## **10. Радиационная обстановка**

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) и на 1-ом автоматическом посту наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Туркестан (ПНЗ №1) (рис. 14.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,00-0,27 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,10 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Туркестанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.4). На станции проводился пятисугочный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3-1,7 Бк/м<sup>2</sup>.

Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,5 Бк/м<sup>2</sup>, что не превышает предельно-допустимый уровень.

## **11. Состояние загрязнения почв тяжелыми металлами Туркестанской области за осенний период 2023 года.**

*За осенний период* в пробах почвы, отобранных в различных районах города Шымкент, концентрации свинца находились в пределах 19,88 – 67,42 мг/кг, меди 1,02 – 5,44 мг/кг, цинка 2,91 – 30,08 мг/кг, хрома 0,85 – 3,14 мг/кг, кадмия 0,45 – 19,20 мг/кг.

По содержанию тяжелых металлов район ЗАО «Южполиметалл» (расстояние от источника загрязнения 0,5 и 0,9 км) наиболее загрязненный, где концентрация свинца – 1,89 – 2,11 ПДК, меди – 1,64 – 1,81 ПДК, цинка – 1,18 -1,31 ПДК.

В районе центрального парка, школы № 9 и площади Ордабасы концентрации тяжелых металлов находились в пределах нормы.

*За осенний период* в пробах почвы, отобранных в различных районах города Туркестан, концентрации свинца находились в пределах 8,04 – 34,02 мг/кг, меди 1,39 – 2,29 мг/кг, цинка 3,28 – 18,49 мг/кг, хрома 0,94 – 2,63 мг/кг, кадмия 0,78 – 1,58 мг/кг.

В районе Казметалпродакшн концентрации свинца составляла 1,06 ПДК. Остальные концентрации тяжелых металлов находились в пределах нормы.

*За осенний период* в пробах почвы, отобранных в различных районах города *Кентау*, концентрации свинца находились в пределах 5,61 – 48,77 мг/кг, меди 1,20 – 1,72 мг/кг, цинка 7,01 – 32,12 мг/кг, хрома 1,63 – 2,67 мг/кг, кадмия 1,32– 4,02 мг/кг.

В районе ЗАО «Южполиметалл» (500м и ) в пробах почвы было обнаружено превышение по свинцу-1,12 ПДК, по цинку – 1,02 ПДК.

В районе обогатительной фабрики "Южполиметалл" 1.5 км – концентрации свинца - 1,56 ПДК, по цинку – 1,40 ПДК.

Остальные концентрации тяжелых металлов находились в пределах нормы.

*За осенний период* в пробах почвы, отобранных в различных точках *Сарыагашского района* Туркестанской области, концентрации свинца находились в пределах 2,89– 3,30 мг/кг, меди 1,49 – 2,46 мг/кг, цинка 2,06 – 2,87 мг/кг, хрома 1,03-3,85 мг/кг, кадмия 1,24 – 1,36 мг/кг.

Содержание тяжелых металлов находились в пределах нормы.

*В Мактарадальском районе* Туркестанской области, концентрации свинца находились в пределах 5,69– 9,23 мг/кг, меди 1,84 – 2,18 мг/кг, цинка 1,87 – 3,21 мг/кг, хрома 1,24-1,68 мг/кг, кадмия 0,98 – 1,34 мг/кг.

Содержание тяжелых металлов находились в пределах нормы.

*В Ордабасинском районе* Туркестанской области, концентрации свинца находились в пределах 6,55 – 7,44 мг/кг, меди 1,35 – 1,79 мг/кг, цинка 2,92 – 3,35 мг/кг, хрома 1,57 – 1,99 мг/кг, кадмия 1,14-1,86 мг/кг.

Содержание тяжелых металлов находились в пределах нормы.

*В Байдибекском районе* Туркестанской области, концентрации свинца находились в пределах 4,27– 5,77 мг/кг, меди 1,04– 1,32 мг/кг, цинка 1,59 – 2,91 мг/кг, хрома 1,37-2,37 мг/кг, кадмия 0,96-1,88 мг/кг.

Содержание тяжелых металлов находились в пределах нормы.

## Приложение 1



Рис 1 Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха г.Шымкент




Рис 2 Схема расположения экспедиционных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Шымкент.




Рис 3 Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха поселка Кызылсай




Рис 4. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Туркестан.




Рис 5. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Кентау.




Рис 6. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха поселка Саистобе.




Рис.4 – Схема расположения створов Туркестанской области

## Приложение 2

### Информация о качестве поверхностных вод Туркестанской области по створам

Водный объект и створ	Характеристика физико-химических параметров	
река Сырдария	температура воды отмечена в пределах 15,4-21,2°C, водородный показатель 7,6-7,9, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,9-9,4 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 2,1-2,3 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 9,0-25,0 см.	
с. Кокбулак (10,5 км к ССЗ от поста)	4 класс	магний – 49,2 мг/дм <sup>3</sup> , сульфаты-365 мг/дм <sup>3</sup> . Фактические концентрации магния и сульфатов не превышает фоновый класс.
с.Азаттык (мост через реку Сырдария- 5 км от села)	4 класс	магний – 51,6 мг/дм <sup>3</sup> , фосфор общий – 0,478 мг/дм <sup>3</sup> , сульфаты - 403,4 мг/дм <sup>3</sup> .
г. Шардара (2,7 км к З от города, 2 км ниже плотины вдхр. Шардара)	>5 класс	взвешенные вещества – 95,2 мг/дм <sup>3</sup> , Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
река Келес	температура воды отмечена в пределах 13,2-15,1°C, водородный показатель 7,7-7,9, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,9-10,4 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 2,0-2,6 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 3,0-25,0 см.	
с. Казыгурт, 0,2 км выше села, 0,8 км выше водпоста	4 класс	магний – 39,6 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация магния не превышает фоновый класс.
устье (1,2 км выше устья р. Келес	4 класс	магний – 44,4 мг/дм <sup>3</sup> , фосфор общий –

		0,747 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация магния не превышает фоновый класс, фактическая концентрация фосфора общего превышает фоновый класс.
<b>река Бадам</b>		температура воды отмечена в пределах 13,8-15,2°C, водородный показатель 7,7-7,8, концентрация растворенного в воде кислорода 5,5-6,5 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 1,5-1,8 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 15,0-23,0 см.
г/п Шымкент (2 км ниже города)	3 класс	магний – 28,8 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация магния не превышает фоновой класс.
с. Караспан, (0,5 км ниже села, 0,99 км выше устья р. Бадам, 0,1 км ниже моста)	3 класс	магний – 26,4 мг/дм <sup>3</sup> , фосфор общий – 0,275 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация магния не превышает фоновый класс, фактическая концентрация фосфора общего превышает фоновый класс.
<b>река Арыс</b>		температура воды отмечена 15,3°C, водородный показатель 7,3, концентрация растворенного в воде кислорода – 4,6 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 1,9 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 23,0 см.
г. Арыс (ж.д. ст.Арыс)	3 класс	магний – 26,4 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация магния не превышает фоновой класс.
<b>река Аксу</b>		температура воды отмечена в пределах 8,8-16,5°C, водородный показатель 7,1-7,8, концентрация растворенного в воде кислорода 6,8-7,5 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> 1,7-2,1 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность 23,0-25,0 см.
с. Саркырама (к юго-западу от населения, раст. от устья 52 км)	1 класс*	-
с. Колкент (1,5-2 км к северу от села, ниже от 10 м водопоста)	1 класс*	-
<b>река Катта-буғунь</b>		температура воды отмечена 18,8°C, водородный показатель 7,5, концентрация растворенного в воде кислорода 5,8 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> 2,3 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность 25,0 см.
с. Жарықбас (1,5 км выше села, 0,4 км ниже водопоста, 74 км выше впадины р. Алмалы)	>5 класс	взвешенные вещества – 42,6 мг/дм <sup>3</sup> , Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
<b>Водохранилище Шардара</b>		температура воды отмечена в пределах 20,2°C, водородный показатель 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,2 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 2,0 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 25,0 см.
г. Шардара (1 км к ЮВ от г. Шардара, по А 2190 от навигационного знака N 17,2 км выше плотины)	>5 класс	взвешенные вещества – 63,0 мг/дм <sup>3</sup> , Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.

Примечание: \* - вода «наилучшего класса»

\*\*\* - Вещества по данному классу не нормируются

### Приложение 3

#### Результаты исследования донных отложений воды реки Сырдария Түркестанской области за октябрь 2023 года

№ п/п	Место отбора проб	Нефте продук ты %	Донные отложения, мг/кг						
			Медь	Хром	Кад мий	Ни кель	Марга нец	Свинец	Цинк
1	река Сырдария - Кокбулак (10,5 км к северу, севера западу)	1,85	0,75	0,06	0,0	0,72	0,60	0,00	2,16

	(далее ССЗ) от села)							
2	р. Сырдария, створ г. Шардара (2,7 км к З от города, 2 км ниже плотины вдхр. Шардара)	1,68	0,68	0,070	0,0	0,85	0,66	0,00
	вдхр. Шардара – г. Шардара (1 км к ЮВ от г. Шардара, 2 км выше плотины)	1,7	0,78	0,09	0,0	0,88	0,75	0,00

**Приложение 4**

**Справочный раздел**  
**Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в  
воздухе населенных мест**

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м3		Класс опасности
	максимально разовая	среднесуточная	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м <sup>3</sup>	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Об утверждении Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах , на территориях промышленных организаций» (от 2 августа 2022года №КР ДСМ-70)

**Оценка степени индекса загрязнения атмосферы**

Градации	Загрязнение атмосферного воздуха	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, %	0-1 0
II	Повышенное	СИ НП, %	2-4 1-19
III	Высокое	СИ НП, %	5-10 20-49
IV	Очень высокое	СИ НП, %	>10 >50

### **Норматив радиационной безопасности\***

Нормируемые величины	Пределы доз
Эффективная доза	Население 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год

\*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

### **Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования**

Категория (вид) водопользования	Назначение/тип очистки	Классы водопользования				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Рыбохозяйственное водопользование	Лососевые	+	+	-	-	-
	Карповые	+	+	-	-	-
Хозяйственно-питьевое водопользование	Простая водоподготовка	+	+	-	-	-
	Обычная водоподготовка	+	+	+	-	-
Рекреационное водопользование (культурно-бытовое)	Интенсивная водоподготовка	+	+	+	+	-
		+	+	+	-	-
Орошение	Без подготовки	+	+	+	+	-
	Отстаивание в картах	+	+	+	+	+
Промышленность:						
технологические цели, процессы охлаждения		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
добыча полезных ископаемых		+	+	+	+	+
транспорт		+	+	+	+	+

Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №151 от 09.11.2016)

---

## Приложение 5

**Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, вредных микроорганизмов и других биологических веществ, загрязняющих почву**

№№ п/п	Наименование вещества	Предельно- допустимая концентрация (далее - ПДК), миллиграмм на килограмм в почве	Лимитирующий показатель	Примечание
<b>Химические вещества</b>				
1	Марганец	1500	общесанитарный	
2	Медь	3,0 (подвижная форма)	общесанитарный	Подвижная форма меди извлекается ацетатно- аммонийным буферным раствором РН 4,8.
3	Мышьяк	2,0 (валовое содержание)	транслокационный	ПДК дана с учетом фона.
4	Никель	4,0 (подвижная форма)	общесанитарный	Подвижная форма никеля извлекается ацетатно- аммонийным буферным раствором РН 4,6.
5	Ртуть	2,1 (валовое содержание)	транслокационный	ПДК дана с учетом фона.
6	Свинец	32,0 (валовое содержание)	общесанитарный	ПДК дана с учетом фона.
7	Свинец + ртуть	20,0 + 1,0 (валовое содержание)	транслокационный	
8	Хром	6,0 (подвижная форма)	общесанитарный	ПДК дана с учетом фона. Подвижная форма хрома извлекается ацетатно- аммонийным буферным раствором РН 4,8.
9	Хром <sup>+6</sup>	0,05	общесанитарный	
10	Цинк	23,0 (подвижная форма)	транслокационный	Подвижная форма цинка извлекается ацетатно- аммонийным буферным раствором РН 4,8

**ЛАБОРАТОРИЯ МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  
ФИЛИАЛА РГП «КАЗГИДРОМЕТ» ПО ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДРЕС:**

**ГОРОД ШЫМКЕНТ  
УЛ. ЖЫЛКЫШИЕВА, 44  
ТЕЛ. 8-(7252)-54-05-33**

**E MAIL: LMZPS\_UKO@METEO.KZ**