

Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«Қазгидромет» РММ Түркістан облысы бойынша филиалы



**ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ ЖӘНЕ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ҚОРШАҒАН ОРТА ЖАЙ-КҮЙІ
ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ
БЮЛЛЕТЕНІ**

Маусым 2024 жыл

Шымкент, 2024 жыл

	Мазмұны	Стр.
	Алғы сөз	3
1	Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері	4
2	Шымкент қ. атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	4
2.1	Қызылсай а. атмосфералық ауа сапасының	
3	Атмосфералық жауын-шашын сапасының жай-күйі	8
4	Түркістан қ. атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	8
4.1	Кентау қ. атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	
4.2	Састөбе а. атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	
5	Жер үсті сулар сапасының мониторингі	12
5.1	Жер үсті сулары бойынша мониторинг нәтижелері.	13
5.2	Су обьектілерінің түптік шегінділерінің мониторинг нәтижелері	14
6	Радиациялық жағдай	14
	Қосымша 1	15
	Қосымша 2	18
	Қосымша 3	19
	Қосымша 4	20
	Қосымша 5	22

Алғы сөз

Ақпараттық бюллетень «Қазгидромет» РМК мамандандырылған бөлімшелері Ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің бақылау желісіндегі қоршаған ортаның жай-күйін бақылау бойынша жүргізген жұмыс нәтижелері бойынша дайындалды.

Бюллетень мемлекеттік органдарды, қоғамды және халықты Түркістан облысының аумағындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы мемлекеттік органдарды, қоғамдастықтарды және тұрғындарды ақпараттандыруға арналған және ластану деңгейінің болып жатқан өзгерістер үрдісін ескере отырып, ҚР Қоршаған ортаны қорғау саласындағы іс-шаралардың тиімділігін одан әрі бағалау үшін қажет.

Түркістан облысының атмосфералық ауасының сапасын бағалау.

1. Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері

Шымкент қаласы бойынша статистикалық мәліметтерге сәйкес ластаушы заттар шығарындыларының стационарлық көздерінің саны 25934 бірлікті құрайды, 2022 жылы нақты шығарындылардың көлемі жылына 29,7 тоннаны құрады, ал рұқсат етілген көлемі жылына 40026,026 тонна.

Түркістан облысы бойынша ластаушы заттар шығындаларының стационарлық көдерінің саны 8365 бірлікті құрайды, 2021 жылы нақты шығарындылар көлемі жылына 14,1 кг құрады.

2022 жылғы жағдай бойынша Шымкент қаласында 252400 автокөліктер бар. Оның ішінде: жеңіл автокөліктер 18290 бірлік және көлік құралдарының жалпы санының 12,0% құрайды, автобустар - 3541 бірлік, 2,3 % құрайды.

Шымкент қаласы бойынша автомобиль көлігінен зиянды ластаушы заттар шығарындыларының көлемі 2022 жылы 32900 тоннаны, Түркістан облысы бойынша 18,5 тоннаны құрады.

Зиянды шығындылардың негізгі мөлшері жеңіл автокөліктердің үлесіне келеді, жалпы санының 70,8% құрады. Жүк көліктерінен 17,5% және автобустардан 8,9% бөлінеді.

2. Шымкент қ. атмосфералық ауа сапасының жағдайы

Аумақтағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 6 бақылау бекетінде, оның ішінде қолмен сынама алушын 4 постында және 2 автоматты станцияда жүргізіледі (қосымша-1).

Жалпы қала үшін 13-ке дейін көрсеткіштер анықталады: 1) қалқыма заттар(шан); 2) күкірт диоксиді; 3) көміртегі оксиді; 4) азот диоксиді; 5) азот оксиді; 6) формальдегид; 7) күкіртті сутек; 8) аммиак; 9) бенз(а)пирен; 10) кадмий, 11) мыс; 12) қорғасын; 13) хром.

1-кестеде бақылау бекеттерінің орналасуы және әр бекетте анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат келтірілген. Атмосфералық ауаның жағдайын бақылау 6 стационарлық бекетте жүргізілді.

Kесте 1

Бақылау бекеттерінің орналасқан жері және анықталатын қоспалар

№ бекет	Алу уақыты	Бақылау	Бекет мекен-жайлары	Анықталатын қоспалар
1			Абай даңғылы, АО «Южполиметалл» АҚ	қалқыма заттар (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак, күкіртті сутек, формальдегид, бенз(а)пирен Ауыр металлдар: кадмий, мыс, күшән, қорғасын, хром
2	Тәулігіне 3 рет	Қолмен алу (дискретті әдістер)	Ордабасы алаңы, Қазыбек би мен Төле би көш. Әтеді	қалқыма заттар (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак, күкіртті сутек, формальдегид, бенз(а)пирен Ауыр металлдар: кадмий, мыс, күшән, қорғасын, хром

3			Алдияров көш.нөмірсіз, АҚ «Шымкентцемент»	қалқыма заттар (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак, күкірттісутек, формальдегид, бенз(а)пирен Ауыр металлдар: кадмий, мыс, күшән, қорғасын, хром
8			Сайрам көш, 198, ЗАО «Пив завод»	қалқыма заттар (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак, күкірттісутек, формальдегид, бенз(а)пирен Ауыр металлдар: кадмий, мыс, күшән, қорғасын, хром
5	Әр 20 мин сайын	Үздіксіз режимде	Самал-3 шағын ауданы	азот диоксиді, азот оксиді, аммиак, күкірт диоксиді, күкірттісутек
6			Нұрсат шағын ауданы	Күкірт диоксиді, күкірттісутек

Шымкент қаласының 2024 жылғы маусым айының ауа сапасын бақылау нәтижелері

Бақылау бекеттерінің мәліметтеріне сәйкес атмосфералық ауаның ластану деңгейі **көтеріңкі** болып бағаланды, ол **СИ= 3,8** (көтеріңкі деңгей) күкірттісутегі бойынша және **ЕЖҚ =10%** (көтеріңкі деңгей) азот диоксиді бойынша №5 бекет аумағында (Самал-3 ш.а.) анықталды.

Азот диоксидінің орташа концентрациясы – 1,46 ШЖШ_{о.т.}, формальдегид – 1,54 ШЖШ_{о.т.}, қалқыма бөлшектер -1,41 ШЖШ_{о.т.}, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады .

Күкірттісутегінің максималды бір реттік концентрациясы – 3,80 ШЖШ_{м.р.}, көміртегі оксиді-1,60 ШЖШ_{м.р.}, күкірт диоксиді-1,09 ШЖШ_{м.р.}, азот диоксиді-ШЖШ_{м.р.}, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады (2-кесте) .

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 2 –кестеде көрсетілген.

2-кесте

Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең үлкен бір реттік шоғыр		ЕЖҚ %	Асу еселігінің саны ШЖШ		
	МГ/М ³	ШЖШ _{о.т.} Асу еселігі	МГ/М ³	ШЖШ _{м.р.} Асу еселігі		>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
		Шымкент қаласы					соңыншынде	
Қалқыма бөлшектер (шан)	0,2113	1,41	0,300	0,60	0,00	0	0	0

Күкірт диоксиді	0,0094	0,19	0,543	1,09	0,00	0	0	0
Көміртегі оксиді	2,0533	0,68	8,000	1,60	0,67	2	0	0
Азот диоксиді	0,0584	1,46	0,620	3,10	8,92	219	0	0
Азот оксиді	0,0284	0,47	0,084	0,21	0,00	0	0	0
Күкірттісугегі	0,0105		0,030	3,80	5,22	240	0	0
Аммиак	0,0199	0,50	0,040	0,20	0,00	0	0	0
Формальдегид	0,0154	1,54	0,024	0,48	0,00	0	0	0
Бенз(а)пирен	0,0001	0,06						
Кадмий	0,000014	0,045	0,000019					
Мыс	0,000013	0,007	0,000017					
Қорғасын	0,000019	0,065	0,000022					
Хром	0,000001	0,001	0,000002					

Корытынды:

Соңғы бес жылда ауаның ластану деңгейі маусым айында келесідей өзгерді:



Шымкент қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі кестеден көріп отырғанымыздай, 2021ж төмен деп, 2020ж және 2022ж, 2024ж көтерінкі деп, 2023ж жоғары деп бағаланды.

Ең жоғары қайталану көрсеткішінің артуы күкірттісугегінің есебінен байқалды.

Метеорологиялық жағдайлар

Маусым айында ауа ластануының қалыптасуына ауа-райының әсері байқалмады, ҚМЖ қундер (қолайсыз метеорологиялық жағдайлар) тіркелген жоқ.

2.1. 2024 жылдың маусым айына Қызылсай елді-мекеніндегі атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг итижелері

Жалпы елді-мекен бойынша 4 көрсеткішке дейін анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) озон.

3-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Kесте-3

Анықтайдын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері

Бекеттің нөмірі	Сынама алу мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекеттің мекенжайы	Анықталатын қоспалар
1	әр 20 минут сайын	Үзіліссіз режимде	<i>Кызылсай елді-мекені, Омарташы, I көшесі.</i>	Күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, озон.

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Қызылсай елді-мекенінің атмосфералық ауаның ластану деңгейі **көтеріңкі** деп бағаланды, ол **СИ= 4,8** (көтеріңкі деңгей) көміргі оксиді бойынша және **ЕЖК = 23%** (көтеріңкі деңгей) азот диоксиді бойынша анықталды.

*БК деректері бойынша, егер СИ, ЕЖК артурулға түссе, онда атмосфераның ластану деңгейі осы көрсеткіштеріндегі ең жоғарғы мәні бойынша бағаланады.

Азот диоксидінің орташа концентрациясы – 3,85 ШЖШ_{о.т.}, озон-2,06 ШЖШ_{о.т.}, басқа ластаушы заттардың ШЖШ - дан аспады.

Азот диоксидінің максималды бір реттік концентрациясы-2,95 ШЖШ_{м.р.}, көміртегі оксиді-4,82ШЖШ_{м.р.}, озон-4,33 ШЖШ_{м.р.}, күкірт диоксиді-1,84 ШЖШ_{м.р.}, (4-кесте).

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелген жок.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 4 –кестеде көрсетілген.

Kесте-4

Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең үлкен бір реттік шоғыр		ЕЖК	Асу еселігінің саны ШЖШ _{м.р.}			
	МГ/М ³	ШЖШ _{о.т.} Асу еселігі	МГ/М ³	ШЖШ _{м.р.} Асу еселігі		%	>ШЖШ	>5 ШЖШ	
								соның ішінде	
Қызылсай									
Күкірт диоксиді	0,0367	0,73	0,9178	1,84	0,52	11	0	0	
Көміртегі оксиді	1,0632	0,35	24,12	4,82	5,44	114	0	0	
Азот диоксиді	0,1539	3,85	0,589	2,95	22,61	474	0	0	
Озон	0,0618	2,06	0,6931	4,33	18,75	393	0	0	

3. Атмосфералық жауын-шашын сапасының жай-күйі

Атмосфералық жауын-шашының химиялық құрамына бақылау 2 метеостанцияларда (Қазығұрт, Шымкент) алынған жаңбыр суына сынама алумен жүргізді (14.4 сур.).

Жауын-шашын құрамында анықталатын заттардың шоғырлары шекті рұқсат етілген шоғырлардан (ШЖШ) аспады.

Жауын-шашын сынамаларында гидрокарбонаттар 30,55%, сульфаттар 28,43%, кальций иондары 15,01%, натрий иондары 6,73 %, хлоридтер 11,05% болды.

Ең үлкен жалпы минералдылығы Қазығұрт МС – 85,34 мг/л, ең азы Шымкент МС – 22,10 мг/л белгіленді.

Атмосфералық жауын-шашының үлесті электрөткізгіштігі Қазығұрт МС – 135,6 мкСм/см, Шымкент МС – 36,4 мкСм/см болды.

Түскен жауын-шашын қышқылдылығы 6,74 (Шымкент МС) – 7,12 (Қазығұрт МС) аралығында болды.

4. Түркістан қаласындағы атмосфералық ауа сапасының мониторингі

Түркістан қаласының атмосфера ауасының жағдайын бақылау 1 автоматтық бекетте жүргізілді (қосымша1).

Жалпы қала бойынша б қорсеткішке дейін анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) азот оксиді; 5) озон; 6) күкірттісуге тізбесі туралы ақпарат берілген.

5-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Кесте-5

Анықтайдын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері

Бекеттің номірі	Сынама Алу мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекеттің мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	әр 20 минут сайын	Үзіліссіз режимде	Алаша Байтақ жырау көшесі, Оралман ауданы	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, күкірттісуге тізбесі, диоксид және азот оксиді, озон
2			Қала орталығында	Күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, озон
3			A.Сандыбай к., 58B	

2024 жылдың маусым айына Түркістан қаласында атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Түркістан қаласының атмосфералық ауаның ластану деңгейі **жоғары** деп бағаланды, ол СИ=3,6(көтерінкі деңгей) азот диоксиді бойынша №1 бекет аумағында (Алаша Байтақ) және ЕЖҚ =49% (жоғары деңгей) азот диоксиді бойынша №3 бекет аумағында (А.Сандыбай көш.58B) анықталды.

*БК деректері бойынша, егер СИ, ЕЖҚ әртүрлі градацияга түссе, онда атмосфераның ластану деңгейі осы қорсеткіштерідің ең жоғарғы мәні бойынша бағаланады.

Азот диоксидінің орташа концентрациясы – 2,1 ШЖШ_{о.т.}, озон-1,0 ШЖШ_{о.т.}, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады.

Азот диоксидінің максималды бір реттік концентрациясы – 3,6 ШЖШ_{м.р.}, күкірт диоксиді – 2,8 ШЖШ_{м.р.}, азот оксиді – 1,8 ШЖШ_{м.р.}, көміртегі оксиді –

2,1 ШЖШ_{м.р.} озон – 1,6 ШЖШ_{м.р.} күкірттісуге – 2,2 ШЖШ_{м.р.} (6-кесте).

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 6 –кестеде көрсетілген.


Кесте-6

Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең үлкен бір реттік шоғыр		ЕУК	Асу еселігінің саны ШЖШ _{м.р.}			
	МГ/М ³	ШЖШ _{о.т.} Асу еселігі	МГ/М ³	ШЖШ _{м.р.} Асу еселігі		%	>ШЖШ III	>5 ШЖШ	
							соның ішінде	>10 ШЖШ	
Түркістан қаласы									
Азот диоксиді	0,086	2,14	0,724	3,62	17,88	1158	0	0	
Күкірт диоксиді	0,026	0,52	1,407	2,81	1,27	81	0	0	
Азот оксиді	0,020	0,34	0,724	1,81	1,25	27	0	0	
Көміртегі оқиді	0,560	0,19	10,30	2,06	0,05	3	0	0	
Озон	0,031	1,04	0,254	1,59	0,09	6	0	0	
Күкірттісуге	0,0011		0,018	2,23	0,19	4	0	0	

Қорытынды:

Соңғы бес жылда ауаның ластану деңгейі маусым айында келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, Түркістан қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі 2021ж төмен деп, 2020ж және 2022жылы көтеріңкі деп, 2023-2024жж жоғары деп бағаланды.

Ең жоғары қайталану көрсеткішінің артуы негізі азот диоксидінің есебінен байқалды.

4.1 Кентау қаласындағы атмосфералық ауа сапасының мониторингі

Кентау қаласы аумағында атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1

автоматты станцияда жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы қала бойынша 3 көрсеткішке дейін анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) күкірт сутегі.

7-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Кесте 7

Анықтайтын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері

Бекеттің номірі	Сынама алу мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекеттің мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
7	әр 20 минут сайын	Ұзіліссіз режимде	Уалиханов көшесі, 3 «А» уч.	Көміртегі оксиді, күкірт диоксиді, күкіртсугегі

2024 жылдың маусым айындағы Кентау қаласында атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері.

Кентау қаласының бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі **көтеріңкі** деп бағаланды, ол **СИ =1,9** (төмен деңгей) және **НП =11%** (көтеріңкі деңгей).

Ластаушы заттардың орташа бір реттік концентрациясы ШЖШ-дан аспады.

Көмірсугегінің максималды бір реттік концентрациясы – 1,88 ШЖШ_{м.р.}, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады (8-кесте).

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖК астам) және ЭЖЛ (50 ШЖК астам) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асып кетуінің айқындылығы және асып кету жағдайларының саны 8-кестеде көрсетілген.


Кесте 8

Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең үлкен бір реттік шоғыр		ЕЖК	Асу еселігінің саны ШЖШ _{м.р.}		
	МГ/М ³	ШЖШ _{о.т.} Асу еселігі	МГ/М ³	ШЖШ _{м.р.} Асу еселігі		%	>ШЖШ	>5 ШЖШ
Кентау қаласы								
Күкірт диоксиді	0,0047	0,09	0,0172	0,03	0,00	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,1636	0,05	1,9784	0,40	0,00	0	0	0
Күкіртсугегі	0,0310		0,0150	1,88	11,20	242	0	0

Корытынды:

Соңғы бес жылда ауаның ластану деңгейі маусым айында келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, Кентау қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі 2020-2023жж төмен деп, 2024ж көтеріңкі деп бағаланды.

4.2 2024 жылғы маусым айындағы Түркістан облысы Сағтебе ауылдың атмосфералық ауаның сапасына мониторинг

Жалпы 4 көрсеткіш анықталынады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) озон.

9-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Кесте 9
Анықтайтын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері

Бекет номірі	Сынама алу мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекеттің мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	Әр 20 минут сайын	Үзіліссіз режимде	Сағтебе а. F. Мұратбаев көш., 1А	көміртегі оксиді, азот диоксиді, күкіртсүтегі, озон

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Сағтебе ауылдың атмосфералық ауаның ластану деңгейі **төмен** деп бағаланды, ол **СИ= 0,6** (төменгі деңгей) және **ЕЖҚ = 0 %** (төменгі деңгей).

Азот диоксидінің орташа концентрациясы - 1,2 ШЖШ_{о.т.}, озон – 1,9 ШЖШ_{о.т.} басқа ластаушы заттар ШЖШ - дан аспады.

Ластаушы заттардың максималды бір реттік концентрациясы ШЖШ-дан аспады (10-кесте).

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 10 –кестеде көрсетілген.

Кесте-10

Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр	Ең үлкен бір реттік концентрация	ЕЖҚ	Асу еселігінің саны ШЖШ _{м.р.}

	МГ/М ³	ШЖШ _{о.т.} Асу еселігі	МГ/М ³	ШЖШ _{м.р} Асу еселігі	%	>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
							соның ішінде	
Састөбе								
Азот диоксиді	0,0014	0,03	0,0856	0,17	0,00	0	0	0
Күкірт диоксиді	0,5952	0,20	1,5588	0,31	0,00	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,0484	1,21	0,1199	0,60	0,00	0	0	0
Озон	0,0589	1,96	0,0692	0,43	0,00	0	0	0

5. Түркістан облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторингі

Жер үсті су сапасының жай-күйіне мониторинг 7 су объектілерінде, өзендер: Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Ақсу, Катта-бугун, Шардара су қоймасы 12 тұстамасында жүргізілді.

Жер үсті суларын зерттеу кезінде су сынамаларында су сапасының **40** физикалық және химиялық көрсеткіштері анықталады: *көзбен шолып бақылау, су температурасы, ерітілген оттегі, сутегі көрсеткіші, өлишенген заттар, мөлдірлік, тұз құрамының басты иондары, биогенді (азот, фосфор, темір қосылыстары) және органикалық заттар (мұнай өнімдері, фенолдар), ауыр металдар (мыс, мырыш, қорғасын, кадмий, марганец, мыс, мырыш, никель, хром) және органикалық заттарға (мұнай өнімдері) талдау жүргізілді.*

Тұптік шөгінділер сапасының мониторингі Сырдария өзенінің және Шардара су қоймасының 3 бақылау нүктelerі бойынша жүргізілді. Тұптік шөгінділер сынамасында ауыр металдарға (қорғасын, кадмий, марганец, мыс, мырыш, никель, хром) және органикалық заттарға (мұнай өнімдері) талдау жүргізілді.

5.1 Түркістан облысы аумағындағы жер үсті сулар гидрохимиялық көрсеткіштері бойынша сапасының мониторинг нәтижелері.

Қазақстан Республикасының су объектілерінің су сапасын бағалауда арналған негізгі нормативтік құжаттар «Су объектілерінде судың сапасын жіктеудің бірынғай жүйесі» (бұдан әрі - Бірынғай жіктеме) болып табылады.

Су объектілерінің су сапасы Бірынғай жіктеме бойынша келесідей бағаланады:

3 кесте

Су объектісінің атауы	Су сапасының класы		Параметрлері	Өлш. бірл.	Концентрация
	Маусым 2023 г.	Маусым 2024 г.			
Сырдария өз.	4 класс	3 класс	Сульфаттар	МГ/ДМ ³	256,2
Келес өз.	3 класс	нормаланбайды (>5 класс)	Қалқыма заттар	МГ/ДМ ³	375,70
Бадам өз.	1 класс	4 класс	Қалқыма заттар	МГ/ДМ ³	96,95
Арыс өз.	1 класс	3 класс	Аммоний-ионы	МГ/ДМ ³	0,521

Аксу өз.	1 класс	1 класс			
Қатта-бөген өз.	нормаланбай ды (>5 класс)	1 класс			
Шардара су қоймасы	нормаланбай ды (>5 класс)	1 класс			

Ескерте: * - 1 класс – «ең жақсы сапа»

***- заттар берілген клас бойынша нормаланбайды

З-кестеден көріп отырғанымыздай, 2023 жылдың маусым айымен салыстырғанда Сырдария өзенінің жер үсті суларының сапасы 4 кластан 3 класқа, Қатта-бөген өзені және Шардара су қоймасы 5-тен жоғары кластан 1 класқа өтті – жақсарды.

Келес өзенінің жер үсті суларының сапасы 3 кластан 5-тен жоғары класқа, Бадам өзені 1 кластан 4 класқа, Арыс өзені 1 кластан 3 класқа өтті – нашарлады.

Ақсу өзенінің жер үсті суының сапасы айтартылғанда өзгермеген.

Түркістан облысының су объектілеріндегі негізгі ластаушы заттар сульфаттар, қалқыма заттар және аммоний-ионы болып табылады. Осы көрсеткіштер бойынша сапа нормативтерінің асып кетуі негізінен тұрмыстық, өнеркәсіптік және ауылшаруашылық төгінділеріне тән.

2024 жылғы маусымда Түркістан облысының аумағында жоғары және экстремалды жоғары ластану жағдайлары тіркеудемеді.

2 Қосымшада тұстамалар шегінде су объектілерінің сапасы бойынша ақпарат.

5.2 Түркістан облысы аумағындағы су объектілерінің түптік шөгінділерінің мониторинг нәтижелері.

Сырдария өзен бассейніндегі түптік шөгінділерді зерттеу нәтижелері бойынша ауыр металдардың құрамы келесі аралықта өзгерген: мыс – 0,75-0,84 мг/кг, мырыш – 2,16-2,35 мг/кг, никель – 0,57-0,67 мг/кг, марганец – 0,69-0,76 мг/кг, хром – 0,07-0,1 мг/кг, қорғасын мен кадмийдің концентрациясы табылған жоқ. Мұнай өнімдерінің мөлшері – 1,8-2,0 % болды.

Сырдария өзен бассейнінің суының түптік шөгінділерін зерттеу нәтижелері 3 Қосымшада көрсетілген.

6. Радиациялық жағдай

Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын жергілікті 2 метеорологиялық станцияда (Шымкент, Түркістан) және атмосфералық ауаның ластануына бақылау Түркістан қаласының (№1 ЛББ) 1 автоматты бекетінде бақылау жүргізілді (14.5-сур.).

Облыстың елді-мекендері бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатындағы радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,15-0,23 мкЗв/сағ аралығында болды. Облыс бойынша радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,15 мкЗв/сағ, яғни шекті жол берілетін шамаға сәйкес келеді.


Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің тұсу тығыздығына бақылау Түркістан облысының аумағында 2 метеорологиялық станцияда (Шымкент, Түркістан) ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды (14.5-сур.). Барлық станцияда бес тәуліктік сынама жүргізілді.

Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің тұсу тығыздығы 1,7-2,2 Бк/м²күрады. Облыс бойынша радиоактивті тұсулердің орташа тығыздығы 1,9 Бк/м², бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.


Қосымша 1




Сурет 1 - Шымкент қ. атмосфералық ауаның ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы




Сурет 2 - Шымкент қ. атмосфералық ауаның ластануын бақылаудың экспедициалық желісінің орналасу схемасы



Сурет 3 – Қызылсай елді мекенінің атмосфералық ауасының ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы.




Сурет 4 – Түркістан қаласының атмосфералық ауасының ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы.



Сурет 5 - Ластанды бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы Кентай қаласының атмосфералық ауасы.



Сурет 6—Састобе елді мекенінің атмосфералық ауасының ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы.



Сурет 4 – Түркістан облысы тұстамалардың орналасу схемасы

2 Қосымша

Түркістан облысы жер үсті су сапасының тұстамалар бойынша ақпараты

Су объектілері және тұстамалары	Физика-химиялық параметрлердің сипаттамасы	
Сырдария өзені		судың температурасы 22,0-25,0°C, сутегі көрсеткіші 7,8-8,0, суда еріген оттегінің концентрациясы 5,4-9,7 мг/дм ³ , ОБТ ₅ мәні 0,3-2,3 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 19,0-25,0 см.
тұстама - Кекбұлақ а. (бекеттен ССБ қарай 10,5 км)	3 класс	сульфаттар – 259,4 мг/дм ³ . Сульфаттардың нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
тұстама - Шардара т/б (Шардара б. кіре-берісінен 2,0 км төмен)	1 класс	-
тұстама – Азаттық а. (Сырдария өзенінің көпірі -аудыдан 5 км)	3 класс	сульфаттар – 259,4 мг/дм ³ .
Келес өзені		судың температурасы 13,3-20,1°C, сутегі көрсеткіші 7,9, суда еріген оттегінің концентрациясы 4,3-10,1 мг/дм ³ , ОБТ ₅ мәні 2,2-2,3 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 4,0-22,0 см.
тұстама – Казыгурт а. (аудыдан 0,2 км жоғары, г/п 0,8 км жоғары)	1 класс	-
Келес-сағасы (сағасынан 1,2 км жоғары)	нормаланбайды (>5 класс)	қалқыма заттар – 691,8 мг/дм ³ . Қалқыма заттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Бадам өзені		судың температурасы 17,4-17,5°C, сутегі көрсеткіші 7,7, суда еріген оттегінің концентрациясы 4,9-6,9 мг/дм ³ , ОБТ ₅ мәні 1,3-2,0 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 7,0-9,0 см.
тұстама - Шымкент гидро бекеті (Шымкентен 2,0 км төмен)	нормаланбайды (>5 класс)	қалқыма заттар - 98,2 мг/дм ³ . Қалқыма заттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
тұстама - Қараспан а. (жол көпірінен 0,1 км төмен)	1 класс	-
Арыс өзені		судың температурасы 18,2°C, сутегі көрсеткіші 7,8, суда еріген оттегінің концентрациясы – 4,6 мг/дм ³ , ОБТ ₅ – 1,9 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 5,0 см.
тұстама – Арыс қ. (жд станция)	3 класс	аммоний-ионы-0,521 мг/дм ³ . Аммоний-ионының нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Ақсу өзені		судың температурасы 10,3-18,6°C, сутегі көрсеткіші 7,8, суда еріген оттегінің концентрациясы 4,2-5,2 мг/дм ³ , ОБТ ₅ 1,6-2,0 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 14,0-23,0 см.
тұстама - Сарқырама а. (аудыдан онтүстік-батысқа қарай, сағадан қаш. 52 км)	1 класс	-
тұстама - Көлкент а. (аудыдан солтүстікке қарай 1,5-2 км, су бекетінен 10 м төмен)	1 класс	-
Қатта-бөген өзені		судың температурасы 14,2°C, сутегі көрсеткіші 7,6, суда еріген оттегінің концентрациясы – 3,9 мг/дм ³ , ОБТ ₅ 1,3 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 25,0 см.
тұстама - Жарықбас а. (аудыдан 1,5 км жоғары)	1 класс	-
Шардара су қоймасы		судың температурасы 25,4°C, сутегі көрсеткіші 7,8, суда еріген оттегінің концентрациясы 7,1 мг/дм ³ , ОБТ ₅ – 0,9 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 25,0 см.
Шардара қ. (Шардара қ. онтүстік шығысқа қарай 1 км, № 17 навигациялық белгіден А 2190 бойынша, бөгеттен 2 км жоғары)	1 класс	-

3 Қосымша
**Түркістан облысы Сырдария өзен бассейнінің суының тұптік шөгінділерін
2024 жылғы маусым айындағы зерттеу нәтижелері**

№ п/п	Сынама алу орны	Шоғыр, мг/кг							
		Мұнай өнімдері %	Мыс	Хром	Кад- мий	Нике- ль	Марга- нең	Қорға- сын	Мырыш
1	Сырдария өз, Шардара т/б, Шардара су қойм платинсынан 2км төменде.	1,90	0,80	0,090	0,0	0,57	0,76	0,0	2,16
2	Кекбұлақ а. (бекеттен ССБ қарай 10,5 км)	1,80	0,84	0,100	0,0	0,61	0,69	0,0	2,2
3	Шардара су қоймасы (А-219 бойымен Н3-17-дан 2,0 км жоғары	2,0	0,75	0,070	0,0	0,67	0,70	0,0	2,35

4 Қосымша
Анықтамалық бөлім

**Елді мекендердің ауасындағы ластаушы заттардың шекті рұқсат етілген
концентрациясы (ШЖШ)**

Қоспалардың атауы	ШЖШ мәні, мг/м³		Қауіп сыйныбы
	Максимальды бір реттік	Орташа тәуліктік	
Азот диоксиді	0,2	0,04	2
Азотоксиді	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/a/пирен	-	0,1 мкг/100 м³	1
Қалқыма заттар (частицы)	0,5	0,15	3
Қалқыма бөлшектер PM 10	0,3	0,06	
Қалқыма бөлшектер PM 2,5	0,16	0,035	
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Мыс	-	0,002	2
Құшән	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Қорғасын	0,001	0,0003	1
Құқірт диоксиді	0,5	0,05	3
Құқірт қышқылы	0,3	0,1	2
Құқірттісугең	0,008	-	2
Көміртегі оксиді	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2

Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Қалалық және ауылдық жерлердегі атмосфералық ауаның гигиеналық стандарты» (СанПин №ҚР ДСМ-70 2тамыз 2022 жылдан бастап)

Атмосфераның ластану индексінің дәрежесін бағалау

Градация	Ауаның ластануы	Көрсеткіштер	Ай сайынғы бағалау
I	Төменгі	СИ ЕЖҚ, %	0-1 0
II	Көтеріңкі	СИ ЕЖҚ, %	2-4 1-19
III	Жоғары	СИ ЕЖҚ, %	5-10 20-49
IV	Өте жоғары	СИ ЕЖҚ, %	>10 >50

РД 52.04.667–2005, Мемлекеттік органдарды, халықты және халықты ақпараттандыру үшін қалалардағы ауаның ластану жағдайы туралы құжаттар. Әзірлеуге, құрылышқа, презентацияға және мазмұнға қойылатын жалпы талаптар.

Радиациялық қауіпсіздік стандарты*

Стандартталған мәндер	Мөлшер шектері	
	Халық	
Тиімді мәндер	Кез-келген 5 жыл ішінде орта есеппен жылына 1мЗв, бірақ жылына 5мЗв аспайды.	

*«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитарлық – эпидемиологиялық талаптар »

Су пайдалану санаттары (түрлөрі) бойынша су пайдалану сыйыптарын саралау

Су пайдаланукатегориясы (түрі)	Тазалау мақсаты / түрі	Су пайдаланукластары				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Балықшаруашылығы суын пайдалану	Лосось	+	+	-	-	-
	Түкі	+	+	-	-	-
Шаруашылық-ауыз су пайдалану	Қарапайым су дайындау	+	+	-	-	-
	Кәдімгі су дайындау	+	+	+	-	-
	Қарқынды су дайындау	+	+	+	+	-
Рекреациялық су пайдалану (мәдени-тұрмыстық)		+	+	+	-	-
Суару	Дайындықсыз	+	+	+	+	-
	Карталардатұндыру	+	+	+	+	+
Өнеркәсіп:						
технологиялық мақсаттар, процестер		+	+	+	+	-

салқындану						
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
пайдалықазбалардыңндру		+	+	+	+	+
көлік		+	+	+	+	+

Су объектілеріндегі су сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі (АШМ СРК 09.11.2016 ж. №151 Бұйрығы

Қосымша 5

Зиянды микроорганизмдердің, топырақты ластайтын басқа да биологиялық және зиянды заттардың берілетін шекті шоғырлану нормативтері

№№ п/п	Заттыңнатауы	Шектірұқсатетілген концентрация (бұданәрі - ШРК), топырақтағы килограмғамыллиграмм	Шектеушікөрсеткіш	Ескертпе
Химиялық заттар				
1	Марганец	1500	жалпысанитарлық	
2	Мыс	3,0 (жылжымалынысан)	жалпысанитарлық	Мыстыңжылжымалыформасы РН 4,8 ацетатты аммоний буферліктеріндісімен алдына.
3	Мышьяк	2,0 (жалпықұрамы)	транслокациялық	ШРК фонды ескереотырыпберілген.
4	Никель	4,0 (жылжымалынысан)	жалпысанитарлық	Никельдіңжылжымалыформасы РН 4,6 ацетатты аммоний буферліктеріндісімен алдына.
5	Сынап	2,1 (жалпымазмұны)	транслокациялық	ШРК фонды ескереотырыпберілген
6	Қорғасын	32,0 (жалпықұрамы)	жалпысанитарлық	ШРК фонды ескереотырыпберілген
7	Қорғасын + сынап	20,0 + 1,0 (жалпықұрамы)	транслокациялық	
8	Хром	6,0 (жылжымалынысан)	жалпысанитарлық	ШРК фонды ескереотырыпберілген. Хромныңқозгалмалыформасы РН 4,8 ацетатты аммоний буферліктеріндісімен алдына.
9	Хром ⁺⁶	0,05	жалпысанитарлық	
10	Мырыш	23,0 (жылжымалынысан)	транслокациялық	Мырыштыңжылжымалыформасы РН 4,8 ацетатты-аммоний буферліктеріндісімен алдына.

ТАБИГИ ОРТАНЫҢ ЛАСТАНУ МОНИТОРИНГІ ЗЕРТХАНАСЫ
"ҚАЗГИДРОМЕТ" РМК ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
МЕКЕН-ЖАЙЫ:
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ЖЫЛҚЫШИЕВ КӨШЕСІ, 44
ТЕЛ. 8-(7252)-54-05-33
E MAIL: LMZPS_UKO@METEO.KZ