

**Филиал РГП «Казгидромет» по Жамбылской области Министерства экологии
и природных ресурсов Республики Казахстан**



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

Август 2024г.

Тараз
2024 г.

	СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
	Предисловие	3
1	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
2	Мониторинг качества атмосферного воздуха г. Тараз	4
2.1	Мониторинг качества атмосферного воздуха г. Жанатас	6
2.2	Мониторинг качества атмосферного воздуха г. Каратау	7
2.3	Мониторинг качества атмосферного воздуха г. Шу	8
2.4	Мониторинг качества атмосферного воздуха с. Кордай	10
3	Состояние качества атмосферных осадков	11
4	Состояние качества поверхностных вод	12
5	Радиационная обстановка Жамбылской области	12
	Приложение 1	13
	Приложение 2	15
	Приложение 3	16

Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Жамбылской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

Оценка качества атмосферного воздуха Жамбылской области

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Согласно данным департамента статистики Жамбылской области фактические суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в Жамбылской области составляют 52,9 тысяч тонн. В г.Тараз фактические суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников составляют 28,5 тысяч тонн.

В Жамбылской области наличие зарегистрированных автотранспортных средств составляет 271 483 ед., в том числе легковые автомобили 242 295 ед., грузовые автомобили 23 700 ед., автобусы 5 488 ед.

Согласно данным департамента статистики в Жамбылской области в городе Тараз насчитывается 36 474 индивидуальных домов; в городе Жанатас 1439 индивидуальных домов; городе Каратау 3 185 индивидуальных домов; городе Шу 6 650 индивидуальных домов. В городских населенных пунктах удельный вес общей площади оборудованной газом 99,8%, водоснабжением 100%, в сельских населенных пунктах газом 99,7%, водоснабжением 99,6%.

2. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г.Тараз

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Тараз проводятся на 5 постах наблюдения, в том числе на 4 постах ручного отбора проб и на 1 автоматической станции (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 13 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль), 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота; 6) фтористый водород; 7) формальдегид; 8) сероводород; 9) бенз(а)пирен; 10) марганец; 11) свинец; 12) кобальт; 13) кадмий.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	ручной отбор проб	ул. Чимкентская, 22	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, фтористый водород, формальдегид, бенз(а)пирен, свинец, марганец, кадмий, кобальт.
2		ул. Рысбек батыра, 15, угол ул. Ниеткалиева	
3		угол ул. Абая и Толе би	
4		Пересечение ул.Байзак батыра и проспекта Абая	
6	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул. Сатпаева и проспект Жамбыла	диоксид серы, оксид углерода, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха г. Тараз за август 2024 года.

По данным сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха города Тараз оценивался как **повышенный**, он определялся значением СИ равным 2,0 (повышенный) и НП = 1% (повышенный) по оксиду углероду в районе поста №6 (ул.Сатпаева и проспекта Жамбыла).

В загрязнение атмосферного воздуха основной вклад вносит оксид углерода (количество превышений ПДК за август: 26 случаев).

Максимальные разовые концентрации оксида углерода составили 2,0 ПДК_{м.р.}, фтористого водорода 1,0 ПДК_{м.р.}, концентрации других загрязняющих веществ и тяжелых металлов в атмосферном воздухе не превышали ПДК. Превышения по среднесуточным нормативам наблюдались по диоксиду азота 1,8 ПДК_{с.с.}.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.


Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		%	> ПДК	>5 ПДК
					В том числе			
г. Тараз								
Взвешенные частицы (пыль)	0,128	0,85	0,30	0,60	0,00	0	0	0
Диоксид серы	0,024	0,48	0,441	0,88	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,995	0,33	9,81	1,96	1,02	26	0	0
Диоксид азота	0,07	1,77	0,18	0,90	0,00	0	0	0
Оксид азота	0,04	0,67	0,12	0,30	0,00	0	0	0
Фтористый водород	0,003	0,52	0,020	1,00	0,00	0	0	0
Формальдегид	0,006	0,63	0,018	0,36	0,00	0	0	0
Сероводород	0,0003		0,0004	0,05	0,00	0	0	0
Бенз(а)пирен	0,0002	0,20	0,0005					
Свинец	0,000009	0,029	0,000013					
Марганец	0,000053	0,053	0,000072					
Кадмий	0	0	0					
Кобальт	0	0	0					

Выводы:

Последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в августе менялся следующим образом:



Из графика видно, что уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как повышенный, в 2020 г. как низкий.

Количество превышений максимально-разовых ПДК было отмечено по по оксиду углерода (26 случаев). Превышения нормативов среднесуточных концентраций наблюдались по диоксиду азота.

Увеличение среднесуточных показателей диоксида азота свидетельствует о значительном вкладе в загрязнение воздуха автотранспорта на загруженных перекрестках города и о постоянном накоплении этого загрязняющего вещества в атмосфере города. Основными источниками загрязнения оксидом углерода является автотранспорт и сжигание твердого топлива.

Метеорологические условия

Погодные условия в августе месяце определяла частая смена барических образований. В основном наблюдалась ясная погода, без осадков. Кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер наблюдались в горных и предгорных районах. На большей части области наблюдалась чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Сильная жара до 43 градусов наблюдалась в конце 1-ой декады на севере области.

Осадков на большей части территории области выпало меньше нормы, больше нормы, местами юго-западе, северо-востоке области. Общее количество составило 48%. В августе дней с НМУ (неблагоприятных метеоусловий) не зафиксировано.

2.1 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г.Жанатас

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Жанатас проводятся на 1 автоматической станции (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 5 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) оксид азота, 5) аммиак.

В таблице 3 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 3
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	учетный квартал 001, №18	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Жанатас за август 2024 года.

По данным сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха города Жанатас оценивался как **низкий**, он определялся значением СИ равным 0,4 (низкий) по диоксиду азоту и НП = 0% (низкий).

Средние концентрации диоксида азота составили 1,3 ПДК_{с.с.}, концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК. Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 4.


Таблица 4

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		%	> ПДК	>5 ПДК
					В том числе			
г. Жанатас								
Диоксид серы	0,017	0,34	0,021	0,04	0,0	0	0	0
Оксид углерода	0,326	0,11	0,766	0,15	0,0	0	0	0
Диоксид азота	0,053	1,32	0,079	0,40	0,0	0	0	0
Оксид азота	0,013	0,22	0,014	0,04	0,0	0	0	0
Аммиак	0,016	0,40	0,029	0,14	0,0	0	0	0

Выводы:

Последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в августе менялся следующим образом:



Из графика видно, что уровень загрязнения оценивается как низкий, в 2020 г. как повышенный.

2.2 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Каратау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Каратау проводятся на 1 автоматической станции (Приложение 1).

В целом по городу определяется 3 показателя: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода, 3) сероводород.

В таблице 5 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 5

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	в непрерывном режиме каждые 20 минут	ул. Тамды аулие, №130	диоксид серы, оксид углерода, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Каратау в августе 2024 года.

За август 2024 г. атмосферный воздух города **Каратау** оценивался по **наибольшей повторяемости как «повышенный»** уровень загрязнения (НП=7%);

по стандартному индексу как «низкий» (СИ=1,2). В загрязнение атмосферного воздуха основной вклад внес сероводород (количество превышений ПДК за август: 158 случаев).

Максимальные разовые концентрации сероводорода составили 1,2 ПДК_{м.р.}, концентрации других загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышали ПДК. Средние концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 6.


Таблица 6

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		%	> ПДК	>5 ПДК
					В том числе			
г. Каратау								
Диоксид серы	0,041	0,82	0,054	0,11	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,005	0,002	0,078	0,02	0,00	0	0	0
Сероводород	0,005		0,010	1,23	7,08	158	0	0

Выводы:

Последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в августе менялся следующим образом:



Из графика видно, что уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как низкий в 2021, 2022, 2023 гг., как повышенный в 2020, 2024 гг.

Сероводород образуется при бактериальном разложении отходов жизнедеятельности человека и животных, присутствует в выбросах очистных сооружений и свалок, образуется при разложении белков и входит в состав газовой смеси, присутствующей в коллекторах и канализациях, может скапливаться в подвалах.

2.3 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Шу

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Шу проводятся на 1 автоматической станции (Приложение 1).

В целом по городу определяется 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ 2,5; 2) взвешенные частицы РМ 10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) озон (приземный), 6) сероводород.

В таблице 7 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 7

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	в непрерывном режиме каждые 20 минут	возле Шуйской городской больницы	взвешенные частицы РМ 2,5, взвешенные частицы РМ 10, диоксид серы, оксид углерода, озон (приземный), сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Шу за август 2024 года.

За август 2024 г. атмосферный воздух города Шу оценивался по **наибольшей повторяемости как «повышенный»** уровень загрязнения (НП=1%); по стандартному индексу как «низкий» (СИ=1,2). В загрязнение атмосферного воздуха основной вклад внес сероводород (количество превышений ПДК за август: 20 случаев).

Средние концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК. Максимальные разовые концентрации сероводорода составили 1,2 ПДК_{м.р.}, концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 8.


Таблица 8

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		%	> ПДК	>5 ПДК
В том числе								
г. Шу								
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,0014	0,04	0,002	0,011	0,0	0	0	0
Взвешенные частицы РМ 10	0,0011	0,02	0,001	0,005	0,0	0	0	0
Диоксид серы	0,014	0,29	0,055	0,11	0,0	0	0	0
Оксид углерода	0,265	0,09	3,645	0,73	0,0	0	0	0
Озон (приземный)	0,03	0,93	0,03	0,19	0,0	0	0	0
Сероводород	0,001		0,009	1,16	0,90	20	0	0

Выводы:

Последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в августе менялся следующим образом:



Из графика видно, что уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризуется как повышенный, как низкий в 2020 г.

Сероводород образуется при бактериальном разложении отходов жизнедеятельности человека и животных, присутствует в выбросах очистных сооружений и свалок, образуется при разложении белков и входит в состав газовой смеси, присутствующей в коллекторах и канализациях, может скапливаться в подвалах.

2.4 Мониторинг качества атмосферного воздуха в с. Кордай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории села Кордай проводятся на 1 автоматической станции (Приложение 1).

В целом в селе определяется 4 показателя: 1) оксид углерода; 2) диоксид азота; 3) озон (приземный); 4) сероводород.

В таблице 9 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 9

Место расположения поста наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	в непрерывном режиме каждые 20 минут	ул. Жибек жолы, № 496«А»	оксид углерода, диоксид серы, озон (приземный), сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в с.Кордай за август 2024 года.

За август 2024 г. атмосферный воздух села **Кордай** оценивался по **наибольшей повторяемости** как «повышенный» уровень загрязнения (НП=2%); по стандартному индексу как «низкий» (СИ=1,2). В загрязнение атмосферного воздуха основной вклад внес сероводород (количество превышений ПДК за август: 47 случаев).

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдались по озону (приземному) 1,6 ПДК_{с.с.}. Максимальные разовые концентрации сероводорода составили 1,2 ПДК_{м.р.}, озону (приземному) 1,1 ПДК_{м.р.}, концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.


Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 10.

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		%	> ПДК	>5 ПДК
					В том числе			
с. Кордай								
Диоксид серы	0,017	0,34	0,021	0,04	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,385	0,13	0,80	0,16	0,00	0	0	0
Озон (приземный)	0,05	1,58	0,18	1,14	0,31	7	0	0
Сероводород	0,005		0,010	1,21	2,11	47	0	0

Выводы:

Последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в августе менялся следующим образом:



Из графика видно, что уровень загрязнения характеризовался как низкий в 2020, 2021, 2022 гг, как повышенный в 2023, 2024 гг.

3. Состояние качества атмосферных осадков

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 3 метеостанциях (Каратау, Тараз, Толе би).

В пробах осадков преобладало содержание гидрокарбонатов 39,79%, сульфатов 19,31%, ионов кальция 13,45%, хлоридов 10,81%.

Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Каратау 56,97 мг/л, наименьшая на МС Тараз 44,41 мг/л.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась в пределах от 76,9 мкСм/см (МС Тараз) 81,5 мкСм/см (МС Толе би).

Кислотность выпавших осадков имеет характер нейтральной среды и находится в пределах от 6,7 (МС Тараз) до 6,9 (МС Толе би).

Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ в осадках не превышали предельно допустимые концентрации (ПДК).

4. Состояние качества поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Жамбылской области проводились на 12 створах в 7 водных объектах (реки Шу, Талас, Асса, Аксу, Карабалта, оз. Биликоль и вдхр.Тасоткель).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 36 физико-химических показателей качества: *визуальные наблюдения, расход воды, температура воды, водородный показатель, прозрачность, растворенный кислород, взвешенные вещества, БПК₅, ХПК, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы, пестициды.*

Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Жамбылской области

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 11

Наименование водного объекта	Класс качества воды		Параметры	ед. изм.	Концентрация
	Август 2023 год	Август 2024 год			
река Талас	не нормируется (>5 класс)	4 класс	ХПК	мг/дм ³	30,55
река Асса	3 класс	2 класс	Свинец	мг/дм ³	0,026
			ХПК	мг/дм ³	26,4
река Шу	4 класс	3 класс	Магний	мг/дм ³	21,6
река Аксу	4 класс	4 класс	Магний	мг/дм ³	47,0
река Карабалта	5 класс	5 класс	Сульфаты	мг/дм ³	970,0
Вдхр. Тасоткель	не нормируется (>5 класс)	4 класс	Магний	мг/дм ³	30,9

* - вещества для данного класса не нормируются

Из таблицы видно, что в сравнении с августом 2023 года качество вод в реке Талас и водохранилище Тасоткель с выше 5 класса перешло в 4 класс, Асса с 3 класса перешло во 2 класс, Шу с 4 класса перешло в 3 класс – улучшилось;

В реках Аксу, Карабалта качество поверхностных вод существенно не изменилось.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах на территории Жамбылской области являются: магний, ХПК, свинец и сульфаты.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

Информация по результатам качества поверхностных вод: озера Биликоль указана в Приложении 3.

5. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак).

Значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,07-0,25 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,17 мкЗв/ч.

Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетками. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,3-2,2 Бк/м². Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,8 Бк/м².

Приложение 1




Рис.1 – карта мест расположения постов наблюдения и метеостанции г. Тараз




Рис.2 - карта мест расположения поста наблюдений и метеостанции г. Жанатас




Рис.3 - карта мест расположения поста наблюдений и метеостанции г. Каратау




Рис.4 - карта мест расположения поста наблюдений г. Шу




Рис.5 - карта мест расположения поста наблюдений с.Кордай

Приложение 2

Информация о качества поверхностных вод Жамбылской области по створам

Водный объект и створ	Характеристика физико-химических параметров	
река Талас	Температура воды находилась в пределах от 17,0,0 до 29,0°С, водородный показатель 7,40 – 8,10, концентрации растворенного в воде кислорода в пределах 7,18 – 9,89 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,43 – 3,65 мгО/дм ³ , прозрачность 7 – 10 см во всех створах.	
с. Жасоркен, 0,7 км выше с. Жасоркен, в створе водпоста	не нормируется (>5 класса)	взвешенные вещества – 60,0 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
п. Солнечный, 0,5 км ниже гидропоста	4 класс	Магний – 33,4 мг/дм ³ , свинец – 0,032 мг/дм ³ , ХПК – 34,9 мг/дм ³ . Концентрации магния, химического потребления кислорода и свинца превышают фоновый класс.
г. Тараз, 7,5 км выше г. Тараз, 0,7 км выше сброса сточных вод ГРЭС, 3,0 км выше водпоста	4 класс	Магний – 32,7 мг/дм ³ , свинец – 0,033 мг/дм ³ . Концентрации магния и свинца превышают фоновый класс.
г. Тараз, 10 км ниже г. Тараз, 0,7 км ниже выхода коллекторно-дренажных вод с полей фильтрации сахарного и спирт. комбинатов.	4 класс	ХПК – 31,8 мг/дм ³ . Фактическая концентрация химического потребления кислорода превышает фоновый класс.
река Асса	Температура воды находилась в пределах от 24,0 до 27,0°С, водородный показатель равен 8,05 – 8,10, концентрации растворенного в воде кислорода 7,12 – 8,03 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,83 – 2,00 мгО/дм ³ , прозрачность 11 см во всех створах.	
Окраина микрорайона Чолдала (Шолдала), Кумшагалский с.о.(у моста)	4 класс	ХПК – 32,5 мг/дм ³ .
р. Асса, 500м ниже с. Асса	2 класс	Свинец – 0,026 мг/дм ³ , ХПК – 20,3 мг/дм ³ . Фактическая концентрация химического потребления кислорода не превышает фоновый класс, концентрация свинца превышает фоновый класс.
озеро Биликоль	Температура воды – 27,0°С, водородный показатель равен 8,30, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,46 мг/дм ³ , БПК ₅ – 11,5 мг/дм ³ , ХПК – 52,5 мг/дм ³ , сухой остаток – 1655 мг/дм ³ , взвешенные вещества – 46,0 мг/дм ³ , минерализация – 1648 мг/дм ³ , прозрачность – 11 см.	
река Шу	Температура воды находилась в пределах от 18,0 до 24,0°С, водородный показатель 7,80 – 7,85 концентрации растворенного в воде кислорода 8,34 – 8,99, БПК ₅ 2,44 – 3,10 мгО/дм ³ , прозрачность воды 9 см во всех створах.	
с. Кайнар (с.Благовещенское), 0,5 км ниже с. Кайнар: 65 м. ниже водпоста	3 класс	Магний – 23,2 мг/дм ³ . Фактическая концентрация магния не превышает фоновый класс.
с. Д. Конаева, 0,5 км ниже с. Д. Конаева	4 класс	Свинец – 0,031 мг/дм ³ . Фактическая концентрация свинца превышает фоновый класс.

река Аксу	Температура воды – 27,6°С, водородный показатель равен 8,25, концентрации растворенного в воде кислорода 7,73 мг/дм ³ , БПК ₅ – 2,42 мгО/дм ³ , прозрачность 3 см.	
а. Аксу, 0,5 км выше а. Аксу, 10 км от устья р. Аксу	4 класс	Магний – 47,0 мг/дм ³ . Фактическая концентрация магния превышает фоновый класс.
река Карабалга	Температура воды – 24,8°С, водородный показатель равен 7,85, концентрации растворенного в воде кислорода – 8,09 мг/дм ³ , БПК ₅ – 2,56 мгО/дм ³ , прозрачность 6 см.	
на границе с Кыргызстаном, с. Баласагун 29 км от устья реки	5 класс	Сульфаты – 970,0 мг/дм ³ . Фактическая концентрация сульфатов превышает фоновый класс.
Водохранилище Тасоткель	Температура воды – 26,0°С, водородный показатель равен 8,20, концентрации растворенного в воде кислорода – 8,03 мг/дм ³ , БПК ₅ – 1,96 мгО/дм ³ , прозрачность 6 см.	
с. Тасоткель, 2,5 км к югу от ст. Тасоткель, 0,5 км выше (юго-восточнее) плотины водохранилища	4 класс	Магний – 30,9 мг/дм ³ . Фактическая концентрация магния превышает фоновый класс.

Приложение 3

Результаты качества поверхностных вод озер на территории Жамбылской области

№	Наименование ингредиентов	Единицы измерения	за август 2024 г.
			озеро Биликоль
1	Визуальные наблюдения		чисто
2	Температура	°С	27,0
3	Водородный показатель		8,30
4	Растворенный кислород	мг/дм ³	6,46
5	Прозрачность	см	11
6	БПК ₅	мгО/дм ³	11,5
7	ХПК	мг/дм ³	52,5
8	Взвешенные вещества	мг/дм ³	46,0
9	Гидрокарбонаты	мг/дм ³	336
10	Жесткость	мг/дм ³	11,1
11	Минерализация	мг/дм ³	1648
12	Натрий + калий	мг/дм ³	322
13	Сухой остаток	мг/дм ³	1655
14	Кальций	мг/дм ³	57,1
15	Магний	мг/дм ³	100
16	Сульфаты	мг/дм ³	735,0
17	Хлориды	мг/дм ³	95,0
18	Фосфат	мг/дм ³	0,014
19	Фосфор общий	мг/дм ³	0,023
20	Азот нитритный	мг/дм ³	0,007
21	Азот нитратный	мг/дм ³	0,51
22	Железо общее	мг/дм ³	0,05
23	Аммоний солевой	мг/дм ³	0,38
24	АПАВ /СПАВ	мг/дм ³	0,04
25	Фенолы	мг/дм ³	0

№	Наименование ингредиентов	Единицы измерения	за август 2024 г.
			озеро Биликоль
26	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,05
27	Уровень воды	м	3,35

**Справочный раздел
Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ
в воздухе населенных мест**

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м ³		Класс опасности
	максимально разовая	средне-суточная	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м ³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	
Хлористый водород	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фтористый водород	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (№ ҚР ДСМ-70 от 02 августа 2022 года)

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение атмосферного воздуха	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, %	0-1 0
II	Повышенное	СИ НП, %	2-4 1-19
III	Высокое	СИ НП, %	5-10 20-49

IV	Очень высокое	СИ НП, %	>10 >50
----	---------------	-------------	------------

РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, построению, изложению и содержанию

Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

Категория (вид) водопользования	Назначение/тип очистки	Классы водопользования				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Рыбохозяйственное водопользование	Лососевые	+	+	-	-	-
	Карповые	+	+	-	-	-
Хозяйственно-питьевое водопользование	Простая водоподготовка	+	+	-	-	-
	Обычная водоподготовка	+	+	+	-	-
	Интенсивная водоподготовка	+	+	+	+	-
Рекреационное водопользование (культурно-бытовое)		+	+	+	-	-
Орошение	Без подготовки	+	+	+	+	-
	Отстаивание в картах	+	+	+	+	+
Промышленность:						
технологические цели, процессы охлаждения		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
добыча полезных ископаемых		+	+	+	+	+
транспорт		+	+	+	+	+

Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР
МСХ №151 от 09.11.2016)

Норматив радиационной безопасности

Нормируемые величины	Пределы доз
Эффективная доза	Население
	1 м ³ в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 м ³ в год

*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению
радиационной безопасности»

Предельно-допустимые концентрации (далее - ПДК) химических веществ в почве

Наименование вещества	Предельно-допустимая концентрация (далее-ПДК) мг/кг в почве
Свинец (валовая форма)	32,0
Хром (подвижная форма)	6,0

**ФИЛИАЛ РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДРЕС:
ГОРОД ТАРАЗ
УЛ. ЧИМКЕНТСКАЯ 22
ТЕЛ. 8-(7262)-31-60-81
8-(7262)-56-80-51
E MAIL: info_zmb@meteo.kz**