

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Республиканское Государственное Предприятие «Казгидромет»
Филиал по Актубинской области



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Декабрь 2024 год

Актобе, 2024 г

	СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
	Предисловие	3
1	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
2	Состояние качества атмосферного воздуха в г. Актобе	4
2.1	Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений г. Актобе	6
2.2	Состояние качества атмосферного воздуха в г. Хромтау	6
2.3	Состояние качества атмосферного воздуха в г. Кандыагаш	7
2.4	Состояние качества атмосферного воздуха в п. Шубарши	8
2.5	Состояние качества атмосферного воздуха в п. Кенкияк	9
3	Состояние качества поверхностных вод	11
4	Радиационная обстановка	12
5	Химический состав атмосферных осадков	12
	Приложение 1	13
	Приложение 2	17
	Приложение 3	19
	Приложение 4	20

Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых Филиалом РГП «Казгидромет» по Актюбинской области.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Актюбинской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

Оценка качества атмосферного воздуха

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Загрязнение воздушного бассейна области обусловлено в основном крупными предприятиями: АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «КазахойлАктобе», Актюбинский завод ферросплавов и ДГОК филиалы АО «ТНК «Казхром», АО «Интергаз Центральная Азия», УМГ «Актобе», АО «Актобе ТЭЦ». Из общего объема выбросов от стационарных источников доля выбросов от сжигания попутного газа на факелах составляет 11,67 тыс. тонн 97% всех выбросов от факельных установок приходится на 3 нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия: АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «КазахойлАктобе» и ТОО «Аман Мунай».

Кроме этого, одними из основных загрязнителей атмосферного воздуха Актюбинской области являются выхлопные газы от передвижных источников.

2. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Актобе.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Актобе проводятся на 6 постах наблюдения, в том числе на 3 постах ручного отбора проб и на 3 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 10 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3) взвешенные частицы РМ-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) сероводород; 9) формальдегид; 10) хром.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	ручной отбор проб	Авиагородок 14, район аэропорта	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, формальдегид, хром, сероводород.
2		ул. Белинский 5, район Жилгородка	
3		ул. Ломоносова 7, район ЖД вокзала	
4	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул. Рыскулова 4, район Шанхай	оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород
5		ул. Есет батыра 109	оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород
6		ул. Жанкожа батыра 89, район Курмыш	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота

Помимо стационарных постов наблюдений в городе Актобе действует передвижная лаборатория, с помощью которой измерение качества воздуха проводится дополнительно по 3 точкам области по 7 показателям: 1) взвешенные

частицы (пыль); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота; 6) сероводород; 7) формальдегид.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Актобе за декабрь 2024 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением СИ=3,1 (повышенный уровень) по сероводороду в районе поста №2 и НП=1% (повышенный уровень) по сероводороду в районе поста №3.

**Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.*

В загрязнение атмосферного воздуха основной вклад вносит сероводород (количество превышений ПДК за месяц: 37 случаев); оксид углерода (количество превышений ПДК за месяц: 7 случаев).

Максимально-разовая концентрация оксида углерода составила 2,0 ПДК_{м.р.}, сероводорода 3,1 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.

Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимально-разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		>ПДК	>5	>10
					ПДК		ПДК	
г. Актобе								
Взвешенные частицы (пыль)	0,0153	0,1022	0,1000	0,2000	0,00	0	0	0
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0014	0,0389	0,0014	0,0088	0,00	0	0	0
Взвешенные частицы РМ-10	0,0015	0,0250	0,0015	0,0050	0,00	0	0	0
Диоксид серы	0,0025	0,0497	0,0050	0,0100	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,6126	0,2042	10,2123	2,0425	0,11	7	0	0
Диоксид азота	0,0229	0,5732	0,1213	0,6065	0,00	0	0	0
Оксид азота	0,0337	0,5621	0,2876	0,7190	0,00	0	0	0
Сероводород	0,0005		0,0249	3,1125	0,79	37	0	0
Формальдегид	0,0028	0,2783	0,0050	0,1000	0,00	0	0	0
Хром	0,0003	0,2191	0,0006		0,00	0	0	0

2.1. Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений г. Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха города Актобе ведутся с помощью передвижной лаборатории на 3 точках: *точка №1 – п.Кирпичный, район СШ №18; точка № 2 – п.Ясный, 41 разъезд, возле школы-гимназии №41; точка №3 – Батыс 2, район СШ №64.*

На передвижной лаборатории определяются **7 показателей**: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) сероводород; 3) формальдегид; 4) оксид азота; 5) диоксид серы; 6) диоксид азота; 7) оксид углерода. (Таблица 3).

Таблица 3

Результаты экспедиционных измерений качества атмосферного воздуха

Определяемые примеси	Батыс-2	
	Точка №1	
	мг/м ³	ПДК
Взвешенные частицы (PM-10)	0,0044	0,0147
Сероводород	0,0041	0,5125
Формальдегид	0,0049	0,0980
Оксид азота	0,0065	0,0163
Диоксид серы	0,0057	0,0114
Диоксид азота	0,0060	0,0300
Оксид углерода	15,6912	3,1382

Максимально-разовая концентрация оксида углерода составила 3,1 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ находились в пределах допустимой нормы.

2.2 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Хромтау.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Хромтау проводятся на 1 посту наблюдения.

В целом по городу определяется до 4 показателей: 1) *диоксид серы*; 2) *оксид углерода*; 3) *диоксид азота*; 4) *сероводород*.

В таблице 4 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 4

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	Ул. Горького 9	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г.Хромтау за декабрь 2024 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **низкий**, он определялся значением СИ=0,9 (низкий уровень) и НП=0% (низкий уровень).

Максимально-разовая концентрация примесей не зафиксирована.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 5.

Таблица 5

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимально-разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		>ПДК	>5	>10
					ПДК		ПДК	в том числе
г. Хромтау								
Диоксид серы	0,0028	0,0559	0,2465	0,4930	0,0			
Оксид углерода	0,0547	0,0182	4,8783	0,9757	0,0			
Диоксид азота	0,0010	0,0255	0,0129	0,0645	0,0			
Сероводород	0,0010		0,0031	0,3875	0,0			

2.3 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Кандыагаш.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Кандыагаш проводятся на 1 посту наблюдения.

По городу определяется 4 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) сероводород.

В таблице 6 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 6

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	Ул. Жабаева 64А	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г.Кандыагаш за декабрь 2024 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением СИ=4,0 (повышенный уровень) по оксиду углерода и НП=1% (повышенный уровень).

Максимально-разовая концентрация диоксида серы – 2,1 ПДК_{м.р.}, сероводорода – 1,9 ПДК_{м.р.}, оксида углерода – 4,0 ПДК_{м.р.}, диоксида азота – 1,2

ПДК_{м.р.}.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 7.

Таблица 7

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимально-разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		%	>ПДК	>5
					ПДК			ПДК
г. Кандыгааш								
Диоксид серы	0,0177	0,3531	1,0533	2,1066	1,20	24		
Оксид углерода	0,4275	0,1425	20,0369	4,0074	0,65	13		
Диоксид азота	0,0385	0,9614	0,2320	1,1600	0,30	6		
Сероводород	0,0013		0,0148	1,8500	1,15	23		

2.4 Мониторинг качества атмосферного воздуха в п.Шубарши

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории п.Шубарши проводятся на 1 посту наблюдения.

На точке наблюдения определяется 4 показателя: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) сероводород.

В таблице 8 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 8

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул.Геолог 25Д	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п.Шубарши за декабрь 2024 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением СИ=5,4 (повышенный уровень) и НП=6% (повышенный уровень) по сероводороду.

Максимально-разовая концентрация диоксида серы – 5,0 ПДК_{м.р.}, сероводорода – 5,4 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточная концентрация диоксида серы –1,7 ПДК_{с.с.}.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 9.

Таблица 9

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимально-разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5	>10
							ПДК	ПДК
п.Шубарши								
Диоксид серы	0,0829	1,6587	2,5173	5,0346	1,3649	30	1	
Оксид углерода	0,0156	0,0052	3,7154	0,7431				
Диоксид азота	0,0270	0,6748	0,0851	0,4255				
Сероводород	0,0023		0,0428	5,3500	5,8690	129	4	

2.5 Мониторинг качества атмосферного воздуха в п.Кенкияк

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории п.Кенкияк проводятся на 1 посту наблюдения.

Наточке наблюдения определяется 4 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) сероводород.

В таблице 10 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 10

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул. Алтынсарина 11 Б	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п.Кенкияк за декабрь 2024 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **высокий**, он определялся значением СИ=9,9 (высокий уровень) и НП=38% (высокий уровень) по сероводороду.

Максимально-разовая концентрация сероводорода – 9,9 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточная концентрация диоксида азота – 1,0 ПДК_{с.с.}.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 11.


Таблица 11

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимально-разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		%	>ПДК	>5
					ПДК			ПДК
п. Кенкияк								
Диоксид серы	0,0018	0,0352	0,2714	0,5428				
Оксид углерода	0,3281	0,1094	1,4352	0,2870				
Диоксид азота	0,0410	1,0239	0,1864	0,9320				
Сероводород	0,0097		0,0788	9,8500	38	824	87	

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха за декабрь



Как видно из графика, за декабрь в 2020 году наблюдался очень высокий уровень, в 2021 году высокий уровень, в 2023 году низкий уровень, в 2022 году и в 2024 году наблюдался повышенный уровень загрязнения. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит сероводород.

Метеоусловия

В первой половине месяца наблюдалась преимущественно погода без осадков, лишь в отдельные дни выпадал небольшой снег. Начало второй половины месяца

характеризовалось циклонической погодой, с выпадением обильных осадков и порывами ветра 15-20 м/с. Далее вновь наблюдалась погода без существенных осадков, лишь в конце месяца выпал снег. Всего за месяц выпало 20 мм осадков.

3. Мониторинг качества поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Актюбинской области проводились на **19** створах **12** водных объектов (реки Елек, Каргалы, Эмба, Темир, Орь, Актасты, Косестек, Ойыл, Улькен Кобда, Кара Кобда, Ыргыз, озеро Шалкар).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются **42** физико-химических показателей качества: *температура, взвешенные вещества, прозрачность, водородный показатель (рН), растворенный кислород, БПК₅, ХПК, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы.*

Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Актюбинской области

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 3

наименование водного объекта	класс качества воды		параметры	ед. изм.	концентрация
	октябрь 2023 год	октябрь 2024 год			
река Елек	4 класс	>3 класс не нормируется	Фенолы*	мг/дм ³	0,0018
			Хром (6 ⁺)	мг/дм ³	0,074
река Каргалы	3 класс	>3 класс не нормируется	Фенолы*	мг/дм ³	0,002
река Эмба	>3 класс не нормируется	4 класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,12
река Темир	4 класс	>3 класс не нормируется	Фенолы*	мг/дм ³	0,002
река Орь	4 класс	4 класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,08
река Актасты	4 класс	>3 класс не нормируется	Фенолы*	мг/дм ³	0,0018
река Косестек	4 класс	>3 класс не нормируется	Фенолы*	мг/дм ³	0,0017
река Ойыл	4 класс	4 класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,27
река Улькен Кобда	4 класс	4 класс	Магний	мг/дм ³	37
река Кара Кобда	4 класс	4 класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,07
река Ыргыз	4 класс	>3 класс не нормируется	Фенолы*	мг/дм ³	0,002

* - вещества для данного класса не нормируются

Как видно из таблицы, в сравнении с октябрём 2023 года качество поверхностных вод в реках Орь, Ойыл, Улькен Кобда, Кара Кобда существенно не изменилось.

Качество поверхностных вод в реках Елек, Темир, Актасты, Косестек, Ыргыз перешло с 4 класса в >3 класса – улучшилось.

Качество поверхностных вод в реке Каргалы перешло с 3 класса в >3 класс, в реке Эмба перешло с >3 класса в 4 класс – ухудшилось.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах Актюбинской области являются аммоний-ион, фенолы, магний, хром (6^+).

За декабрь 2024 года на территории Актюбинской области случаев ВЗ не обнаружено.

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

4. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма-излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7 метеорологических станциях (Актобе, Караул-Кельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабулак).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы в Актюбинской области находились в пределах 0,02–0,19 мкЗв/ч (норматив–до 5 мкЗв/ч). В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/ч.

Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области проводилась на метеостанциях Актобе, Караул-Кельды, Шалкар путем пятисуточного отбора проб воздуха горизонтальными планшетами.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы Актюбинской области колебалась в пределах 1,5–2,6 Бк/м². Средняя величина плотности выпадений составила 1,8 Бк/м², что не превышает предельно-допустимый уровень.

5. Химический состав атмосферных осадков на территории Актюбинской области

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 6 метеостанциях (Актобе, Аяккум, Жагабулак, Мугоджарская, Новороссийское, Шалкар). Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ, в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).

В пробах осадков преобладало содержание сульфатов 25,05%, гидрокарбонатов 35,10%, хлоридов 8,64%, ионов кальция 13,26%, ионов натрия 5,87% ионов магния 3,14% и ионов калия 3,90%.


Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Аяккум – 128,2 мг/л, наименьшая – 11,9 мг/л на МС Жагабулак.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась в пределах от 21,2 мкСм/см (МС Жагабулак) до 211,0 мкСм/см (МС Аяккум).

Кислотность выпавших осадков находится в пределах от 5,92 (МС Жагабулак) до 7,38 (МС Аяккум).



Карта мест расположения постов наблюдения и метеостанции г. Актобе




Карта места расположения точки отбора п. Кирпичный, район СШ №18




Карта места расположения точки отбора п. Ясный, район школы-гимназии №41




Карта места расположения точки отбора на Батыс-2, район СШ №64




Карта места расположения поста наблюдения г. Хромтау



Карта места расположения поста наблюдения г. Кандыгаш



Карта места расположения поста наблюдения п. Шубарши



Карта места расположения поста наблюдения п. Кенкияк

Приложение 2

Информация о качества поверхностных вод Актюбинской области по створам

водный объект и створ	характеристика физико-химических параметров	
река Елек	Температура воды отмечена в пределах 12 – 14°C, водородный показатель 8,0 – 8,08, концентрация растворенного в воде кислорода 6,53 – 10,16 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,65 – 4,67 мг/дм ³ , прозрачность 21 см, запах 0 баллов во всех створах.	
0,3 км выше города Алга, 1 км выше шламовых прудов Актюбинского хим. завода	4 класс	Магний – 36 мг/дм ³ . Фактическая концентрация магния превышает фоновый класс.
15 км ниже города Алга, 0,5 км ниже выхода подземных вод	> 3 класс	Фенолы* – 0,0018 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов не превышает фоновый класс.
0,5 км выше города Актобе, 8,0 км выше Новороссийского моста, 11,2 км выше впадения р.Карагалы	> 3 класс	Фенолы* – 0,0018 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов превышает фоновый класс.
4,5 км ниже города Актобе, 1,5 км ниже внадеше р. Дженишке 0,5 км выше выхода подземных вод	> 3 класс	Фенолы* – 0,0016 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов превышает фоновый класс.
20 км ниже города Актобе, 2,0 км ниже с. Георгиевка, 0,5 км ниже выхода подземных вод.	> 3 класс	Фенолы* – 0,002 мг/дм ³ . Хром (6 ⁺) – 0,096 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов превышает фоновый класс.

		Фактическая концентрация хром (6 ⁺) не превышает фоновый класс.
1,0 км на юго-восток п.Целинный, на левом берегу р. Елек.	4 класс	Магний – 32 мг/дм ³ . Взвешенные вещества – 15,24 мг/дм ³ . Фактические концентрации магния, взвешенных веществ не превышает фоновый класс.
река Каргалы	Температура воды отмечена 5°С, водородный показатель 8,06, концентрация растворенного в воде кислорода 5,0 мг/дм ³ , БПК ₅ 0,67 мг/дм ³ , запах 0 балл.	
п. Каргалинский, в западной части поселка в 1 км ниже впадения правого притока р. Булак:	> 3 класс	Фенолы* – 0,002 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов превышает фоновый класс.
река Эмба	Температура воды отмечена в пределах 9 – 10,4°С, водородный показатель 7,81 – 7,85, концентрация растворенного в воде кислорода 7,91 – 7,92 мг/дм ³ , БПК ₅ 0,79 – 0,91 мг/дм ³ , запах 0 балл.	
п. Жагабулак, 1,0 км на северо-запад отп. Жагабулак	4 класс	Аммоний-ион – 1,17 мг/дм ³ . Фактическая концентрация аммоний-иона не превышает фоновый класс.
п. Сага, 1,0 км к юго-западу от поселка	4 класс	Аммоний-ион – 1,07 мг/дм ³ . Фактическая концентрация аммоний-иона не превышает фоновый класс.
река Темир	Температура воды отмечена в пределах 9,8 – 10,2°С, водородный показатель 8,01 – 8,03, концентрация растворенного в воде кислорода 7,5 – 7,68 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,41 – 1,47 мг/дм ³ , запах 0 баллов во всех створах.	
с.Покровское, вс. Покровское, в 400 м ниже впадения левого притока р. Чилисай	> 3 класс	Фенолы* – 0,002 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов не превышает фоновый класс.
с. Ленинское, в 9 км ниже селения, в 2 км ниже устья левобережного притока р. Кульден-Темир	> 4 класс	Аммоний-ион – 1,07 мг/дм ³ . Фактическая концентрация аммоний-иона превышает фоновый класс.
река Орь	Температура воды 12°С, водородный показатель 8,03, концентрация растворенного в воде кислорода 7,25 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,41 мг/дм ³ , прозрачность 21 см, запах 0 балл.	
с. Бугетсай, 0,3 км ниже села, 0,2 км ниже впадения р. Богетсай	4 класс	Аммоний-ион – 1,08 мг/дм ³ . Фактическая концентрация аммоний-иона не превышает фоновый класс
река Косестек	Температура воды 3°С, водородный показатель 8,01, концентрация растворенного в воде кислорода 5,87 мг/дм ³ , БПК ₅ 0,94 мг/дм ³ , запах 0 балл.	
п. Кос-Естек, в юго-западной части села примерно в 1 км выше устья левого притока без названия, в 2 км ниже слияния рек Тарангул и	4 класс	Фенолы* – 0,0017 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов превышает фоновый класс.

Айтпайка		
река Актасты	Температура воды отмечена в пределах 5°C, водородный показатель 8,02, концентрация растворенного в воде кислорода 5,57 мг/дм ³ , БПК ₅ 0,79 мг/дм ³ , запах 0 балл.	
п. Белогорка, на северо-восточной окраине поселка, в 9 км ниже слияния притоков Тересбутак и Теренсай, составляющих Актасты	> 3 класс	Фенолы* – 0,0018 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов превышает фоновый класс.
река Ойыл	Температура воды отмечена в пределах 14,3°C, водородный показатель 8,01, концентрация растворенного в воде кислорода 8,47 мг/дм ³ , БПК ₅ 0,91 мг/дм ³ , запах 0 балл.	
п. Уил, на северо-восточной окраине поселка в 92 м выше автодорожного мост	4 класс	Аммоний-ион – 1,27 мг/дм ³ . Фактическая концентрация аммоний-иона превышает фоновый класс.
река Улькен Кобда	Температура воды отмечена в пределах 14°C, водородный показатель 7,98, концентрация растворенного в воде кислорода 9,97 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,8 мг/дм ³ , прозрачность 21 см, запах 0 балл.	
п. Кобда, 1 км к юго-востоку от окраины с. Новоалексеевка, в 400 м ниже железобетонного автодорожного моста	4 класс	Магний – 37 мг/дм ³ . Фактическая концентрация магния не превышает фоновый класс.
река Кара Кобда	Температура воды отмечена в пределах 13,1°C, водородный показатель 8,0, концентрация растворенного в воде кислорода 9,05 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,43 мг/дм ³ , запах – 0 балл	
п. Альпасай, 360 м к востоку от поселка Альпасай и в 18 км от слияния с рекой Сары - Хобда	4 класс	Аммоний-ион – 1,07 мг/дм ³ . Фактическая концентрация аммоний-иона не превышает фоновый класс.
река Ыргыз	Температура воды отмечена в пределах 11,3°C, водородный показатель 8,04, концентрация растворенного в воде кислорода 7,94 мг/дм ³ , БПК ₅ 0,88 мг/дм ³ , запах – 0 балл	
с. Шенбертал, в 8 км от селения и в 1,2 км от железобетонного моста	> 3 класс	Фенолы* – 0,002 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов превышает фоновый класс.

* - вещества для данного класса не нормируется

Приложение 3

Результаты качества поверхностных вод озер на территории Актюбинской области

№	наименование ингредиентов	единицы измерения	октябрь 2024 год
			озеро Шалкар
1	Визуальные наблюдения		
2	Температура	°С	10,2
3	Водородный показатель		7,97
4	Растворенный кислород	мг/дм ³	8,18
5	Запах воды	балл	0
6	БПК5	мг/дм ³	0,78
7	ХПК	мг/дм ³	21,13
8	Взвешенные вещества	мг/дм ³	9,34
9	Гидрокарбонаты	мг/дм ³	186
10	Жесткость	мг/дм ³	2,97
11	Минерализация	мг/дм ³	527
12	Натрий + калий	мг/дм ³	99
13	Сухой остаток	мг/дм ³	1000
14	Кальций	мг/дм ³	31
15	Магний	мг/дм ³	17
16	Сульфаты	мг/дм ³	107
17	Хлориды	мг/дм ³	87
18	Фосфат	мг/дм ³	0,013
19	Фосфор общий	мг/дм ³	0,021
20	Азот нитритный	мг/дм ³	0,004
21	Азот нитратный	мг/дм ³	0,002
22	Железо общее	мг/дм ³	0,01
23	Аммоний солевой	мг/дм ³	0,67
24	Свинец	мг/дм ³	0,009
25	Медь	мг/дм ³	0,002
26	Цинк	мг/дм ³	0,002
27	АПАВ /СПАВ	мг/дм ³	0,006
28	Фенолы	мг/дм ³	0,0017
29	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,008

Приложение 4

Справочный раздел

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м ³		Класс опасности
	максимально разовая	средне-суточная	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м ³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3

Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	
Хлористый водород	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2

Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фтористый водород	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года №ҚР ДСМ-70. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 августа 2022 года № 29011.

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, % ИЗА	0-1 0 0-4
II	Повышенное	СИ НП, % ИЗА	2-4 1-19 5-6
III	Высокое	СИ НП, % ИЗА	5-10 20-49 7-13
IV	Очень высокое	СИ НП, % ИЗА	>10 >50 >14

РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

Категория (вид) водопользования	Назначение/тип очистки	Классы водопользования				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Рыбохозяйственное водопользование	Лососевые	+	+	-	-	-
	Карповые	+	+	-	-	-
Хозяйственно-питьевое водопользование	Простая водоподготовка	+	+	-	-	-
	Обычная водоподготовка	+	+	+	-	-
	Интенсивная водоподготовка	+	+	+	+	-
Рекреационное		+	+	+	-	-

водопользование (культурно-бытовое)						
Орошение	Без подготовки	+	+	+	+	-
	Отстаивание в картах	+	+	+	+	+
Промышленность:						
технологические цели, процессы охлаждения		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
добыча полезных ископаемых		+	+	+	+	+
транспорт		+	+	+	+	+

Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №151 от 09.11.2016)

Норматив радиационной безопасности*

Нормируемые величины	Пределы доз
Эффективная доза	Население
	1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год

*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

Нормативы предельно-допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву

Наименование вещества	Предельно-допустимая концентрация (далее - ПДК) мг/кг в почве
Свинец	32,0
Хром	6,0

* Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № ҚР ДСМ-32

ФИЛИАЛ РГП «КАЗГИДРОМЕТ» ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДРЕС:

ГОРОД АКТОБЕ
УЛ. АВИАГОРОДОК 14 В
ТЕЛ. 8-(7132)-22-85-72.

E MAIL:HIMLABACGM@MAIL.RU