

Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«Қазгидромет» РМК Атырау облысы бойынша филиалы



**АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ҚОРШАҒАН ОРТА
ЖАЙ-КҮЙІ ЖӨНІНДЕГІ
АҚПАРАТТЫҚ БЮЛЛЕТЕНІ**

Желтоқсан 2024 жыл

Атырау, 2024 жыл

	МАЗМҰНЫ	Бет.
	Алғы сөз	3
1	Атмосфералық ауаның ластануының негізгі көздері	4
2	Атырау қаласы атмосфералық ауаның ластану жай-күйі	4
2.1	Құлсары қаласы атмосфералық ауаның ластану жай-күйі	6
2.2	Мақат ауданы атмосфералық ауаның ластану жай күйі	8
2.3	Индер ауданы атмосфералық ауаның ластану жай күйі	9
2.4	Жанбай кенті атмосфералық ауаның ластану жай күйі	10
2.5	Ганюшкино кенті атмосфералық ауаның ластану жай күйі.	11
3	Жер үсті суларының сапасының жай-күйі	12
4	Атмосфералық жауын-шашын сапасының жай-күйі	13
5	Радиациялық жағдай	14
	Қосымша 1	15
	Қосымша 2	19
	Қосымша 3	20
	Қосымша 4	21

Алғы сөз

Ақпараттық бюллетенің Ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің бақылау желісінде қоршаған ортаның жай-күйіне мониторинг жүргізу бойынша "Қазгидромет" РМК мамандандырылған бөлімшелері орындастын жұмыстардың нәтижелері бойынша дайындалған.

Бюллетені мемлекеттік органдарды, жүртшылықты және халықты Атырау облысы аумағындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттандыруға арналған және ластану деңгейінде болып жатқан өзгерістер үрдісін ескере отырып, ҚР Қоршаған ортаны қорғау саласындағы іс-шаралардың тиімділігін одан әрі бағалау үшін қажет.

Атырау қаласының атмосфералық ауа сапасын бағалау

1. Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері

Атырау облысы экология департаментінің хабарлауынша, Атырау қаласындағы ластаудың негізгі көздері мұнай өндеу, тасымалдау объектілері болып табылады: "Атырау мұнай өндеу зауыты", "Тенізшевройл" ЖШС, «НОРТ КАСПИАН ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИИ Н.В.» компаниясы (НКОК), АО Атырау "ЖЫЛУЭЛЕКТРОТАЛЫҒЫ", АО "Ембімұнайгаз", ТОО "WEST DALA" "ВЕСТ ДАЛА". Бұдан басқа, қалада қаланың жел соғатын екі жағында орналасқан өндірістік төгінділерді жинақтауыш екі тоған бар (солтүстік-батыс жағы - "квадратный" жинақтауыш тоғаны және шығыс жағы - "Тухлая балка"). Жинақтағышқа барлық қалалық төгінділер іс жүзінде тазартусыз жүзеге асырылады, нәтижесінде құқіртсүтектің негізгі көзі – жинақтағыш қалыптасады, онда органикалық заттардың, оның ішінде мұнай өнімдерінің ыдырау процестері жүреді.

Атырау облысында бірінші санаттағы 74 кәсіпорын бар.

Атырау қаласы, Құлсары қаласы және Мақат ауданы табиғи газбен толық қамтамасыз етілген.

"ҚазТрансГазАймақ" АҚ АӨФ деректеріне сәйкес Атырау қаласы бойынша автономды қазандықтар – 80 030 бірлік, Мақат ауданы бойынша – 1783 бірлік.

2. Атырау қаласындағы атмосфералық ауа сапасының мониторингі.

Атырау қаласы аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 6 бақылау бекетінде, оның ішінде 2 бекетте сынаманы қолмен күшімен алу және 4 автоматты станцияда жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы қала бойынша Атмосфералық ауа мониторингі 16 көрсеткіш бойынша жүргізіледі: 1) қалқыма бөлшектер (шан); 2) PM-2,5 қалқыма бөлшектер; 3) PM-10 қалқыма бөлшектер; 4) құқірт диоксиді; 5) көміртегі оксиді; 6) азот диоксиді; 7) азот оксиді; 8) аммиак; 9) құқірт сутегі; 10) озон; 11) фенол; 12) формальдегид, 13) бензол; 14) толуол; 15) этилбензол; 16) ортоксилол.

1-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

1 кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

№	Сынама мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	Тәулігіне 3 мезгіл	кол күшімен алынған сынама (дискреттік әдіс)	Самал ықшам ауданы А.Кекілбаев көшесі 15	қалқыма бөлшектер (шан), құқірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, құқірттісугеңі, фенол, аммиак, формальдегид, бензол, толуол, этилбензол, ортоксилол (C2H6)
5			Құрсай ықшам ауданы Қарабау көшесі 12	қалқыма бөлшектер (шан), құқірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, құқірттісугеңі, фенол, аммиак, формальдегид
6	әр 20 минут сайын		Жұлдыз ықшам ауданы 6-шы көше 29	қалқыма бөлшектер PM-10 және PM-2,5, озон (жер үсті қабаты)

8	үзіліссіз режимде	үзіліссіз режимде	Сырдария 3 ауданы	қалқыма бөлшектер РМ-10 және РМ-2,5, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, аммиак
9			Береке шағын ауданы, Береке өндірістік ауданы	қалқыма бөлшектер РМ-10 және РМ-2,5, азот диоксиді, азот оксиді, озон(жер үсті қабаты)
10			Атырау қ., Нұрсая ш/а (APEC колледжі)	күкірт диоксиді, азот диоксиді, күкірттісутегі, көміртегі оксиді

2024 жылғы желтоқсан айының Атырау қаласының атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері.

Атмосфералық ауа сапасы. Атырау қаласының атмосфералық ауаның ластану деңгейі «көтерінкі», стандарттық индекс СИ=1,0 (төмен деңгей) күкірттісутегі бойынша №1 бекет аумағында; ЕЖҚ=1% (көтерінкі деңгей) күкірттісутегі бойынша №1 бекет аумағында бағаланды.

Максималды-бірлік шоғырлары күкірттісутегі-1,0 ШЖШм.б. Басқа ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖКК астам) және ЭЖЛ (50 ШЖКК астам) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асу еселігі және максималды жоғары жағдайлары 2-кестеде көрсетілген.

2 кесте

Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Максималды-бірлік шоғыры		ЕЖҚ	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	мг/м3	ШЖШ о.т. асу еселігі	мг/м3	ШЖШ м.б. асу еселігі		%	> ШЖ III	>5 ШЖ III
Атырау қаласы								
Қалқыма бөлшектер (шан)	0,02	0,14	0,2	0,4	0,0			
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері	0,0164	0,47	0,1044	0,7	0,0			
РМ-10 қалқыма бөлшектері	0,0134	0,22	0,0971	0,3	0,0			
Күкірт диоксиді	0,009	0,18	0,0260	0,1	0,0			
Көміртегі оксиді	0,19	0,06	1,20	0,2	0,0			
Азот диоксиді	0,02	0,38	0,08	0,4	0,0			
Азот оксиді	0,0066	0,11	0,08	0,2	0,0			
Озон (жербеті)	0,0207	0,69	0,0805	0,5	0,0			
Күкіртті сутегі	0,0014		0,0080	1,0	1,3	1		
Фенол	0,002	0,68	0,004	0,4	0,0			
Аммиак	0,002	0,06	0,0114	0,1	0,0			
Формальдегид	0,002	0,20	0,004	0,1	0,0			
Бензол	0,000	0,00	0,000	0,0	0,0			
Толуол	0,000		0,000	0,0	0,0			
Этилбензол	0,000	0,00	0,000	0,0	0,0			
Ортоксиол (C2H6)	0,000		0,000	0,0	0,0			

Қорытынды:

Соңғы бес жыл ішінде ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді



Кестеден көріп отырғанымыздай, Атырау қаласының желтоқсан айы бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі 2021, 2023, 2024 жылдары аралығында ауа сапасы «көтеріңкі» деңгейде болды, ал 2020 жылы жоғары деңгейде болса, 2022 ауа сапасының көрсеткіші төмен деңгейде бағаланды.

Ең жоғары бір реттік ШЖШ артуының ең көп саны күкірттісуге (1 жағдай) болып тіркелді.

Ауаның күкірттісугемен ластануының негізгі көзіне айналған қаланың сол жақ бөлігінде орналасқан, өндірістік төгінділерді жинақтаушы «Тухлая балка» тоғаны мен мұнай өндеу және тасым алдау өндірістік нысандары өз әсерін тигізуде.

Метеорологиялық жағдайы

Қарашаның бірінші жартысында Атырау облысында ауа-райының қалыптасуында циклондық сипаттағы процестер басым болды. Бұлтты ауа-райы жиі жауын-шашынмен, негізінен жаңбыр түрінде байқалды. Айдың екінші жартысында алдымен скандинавиялық антициклондармен байланысты антициклондық процестер басым болды. Ауа-райы бұлтты болды. Кейбір аудандарда аздаған қар жауды. Ауыспалы ауа-райының тұрақсыздығы байқалды. Атмосфералық фронттардың ықпалымен жауын-шашын жауып, тұман және көктайғақ жиі бірінші және екінші онкүндікте байқалды, желдің екпіні бірінші онкүндік басында және үшінші онкүндіктің басында 15-23 м/с жетті. Қараша айында Атырау қаласы бойынша екінші онкүндікте әлсіз жел күші 0-5 м/с соғып осыған байланысты ауа ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары **күтілді**.

2.1 Құлсары қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай күйі

Құлсары қаласы аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1 стационарлық станцияда жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы қала бойынша Атмосфералық ауа мониторингі 8 көрсеткіш бойынша жүргізіледі: 1) *PM-10 қалқыма бөлшектер*; 2) *кукірт диоксиді* 3) *көміртегі оксиді*; 4) *азот диоксиді*; 5) *азот оксиді*; 6) *озон*; 7) *кукірттісуге*.

З-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

Бекет №	Сынама мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
7	әр 20 минут сайын үзліссіз режимде	үзліссіз режимде	Махамбет Өтемісов көшесі, 37А	қалқыма бөлшектер РМ-10, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, озон (жер үсті қабаты), күкірттісуеті.

2024 жылғы желтоқсан айының Құлсары қаласындағы атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері.

Атмосфералық ауа сапасы. Құлсары қаласының атмосфералық ауаның ластануы «төмен», стандарттық индексі СИ=0,5 (төмен деңгей), ең жоғары қайталауды ЕЖҚ=0% (төмен деңгей) болып азот оксиді бойынша бағаланды.

Барлық ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖК астам) және ЭЖЛ (50 ШЖК астам) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асу еселігі және максималды жоғары жағдайлары 4-кестеде көрсетілген.


Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр (Qo.t.)		Максималды-бірлік шоғыры (Qм.б.)		ЕЖҚ	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	мг/м3	ШЖШ о.т. асу еселігі	мг/м3	ШЖШм. б. асу еселігі		%	> III	>5 ШЖ III
Құлсары қаласы								
РМ-10 қалқыма бөлшектері	0,0001	0,00	0,1203	0,24				
Күкірт диоксиді	0,0000	0,00	0,0718	0,14				
Көміртегі оксиді	0,2097	0,07	0,9114	0,18				
Диоксид азота	0,0129	0,32	0,0917	0,46				
Оксид азота	0,0051	0,09	0,0218	0,05				
Озон (жербеті)	0,0051	0,17	0,0342	0,21				
Күкірттісуеті	0,0000		0,0000	0,000				

Қорытынды:

Соңғы бес жыл ішінде ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:

СИ және ЕЖҚ желтоқсан айының 2020-2024 жж
салыстыруы Құлсары қаласы



Кестеден көріп отырғанымыздай Құлсары қаласында соңғы бес жылда желтоқсан айы бойынша ауаның ластану деңгейі 2020,2021,2022 и 2024 жылдар аралығында «төмен» деңгейде болса, ал 2023 жылы ауа сапасының көрсеткіші «көтеріңкі» деңгейге жетті.

2.2 Мақат ауданы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай қүйі

Мақат ауданы аумағындағы атмосфералық ауаның жай-қүйін бақылау 1 стансада жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы аудан бойынша атмосфералық ауа мониторингі 4 көрсеткішке дейін анықталады 1) *кукірт диоксиді*; 2) *азот диоксиді*; 3) *кукірттисутегі*; 4) *көміртегі оксиді*.

5-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

5 кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

Бекет №	Сынама мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	әр 20 минут сайын үзіліссіз режимде	үзіліссіз режимде	Мақат ауылы, Мақат ауданының Мәдениет үйі, Алаш көшесі, 23	кукірт диоксиді, азот диоксиді, көміртегі оксиді.

2024 жылғы желтоқсан айының Мақат ауданындағы атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері.

Атмосфералық ауа сапасы. Мақат ауданының атмосфералық ауаның ластану деңгейі **көтеріңкі**, стандарттық индекс **СИ=2,7** (көтеріңкі деңгей); ең жоғары қайталауды **ЕЖҚ=0%** (төмен деңгей) болып көміртегі оксиді бойынша бағаланды.

Максималды-бірлік шоғырлары көміртегі оксиді бойынша – 2,7ШЖШм.б.

Орташа-бірлік азот диоксиді бойынша – 2,24 ШЖШо.т., басқа ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖКК астам) және ЭЖЛ (50 ШЖКК астам) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асу еселігі және максималды жоғары жағдайлары 6-кестеде көрсетілген.

6-кесте

Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Максималды- бірлік шоғыры		ЕЖК	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	мг/м3	ШЖШ о.т. асу еселігі	мг/м3	ШЖШ м.б. асу еселігі		%	> ШЖШ	>5 ШЖШ
Мақат ауданы								
Күкірт диоксиді	0,0011	0,02	0,1823	0,4				
Көміртегі оксиді	0,2745	0,09	13,4672	2,7	0,1	2		
Диоксид азота	0,0898	2,24	0,1184	0,6				

2.3 Индер ауданы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай күйі

Индер ауданы аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1 стансада жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы аудан бойынша атмосфералық ауа мониторингі 4 көрсеткішке дейін анықталады: 1) *күкірт диоксиді*; 2) *азот диоксиді*; 3) *күкірттісугеі*; 4) *көміртегі оксиді*.

7-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

7 кесте

Бақылау бекеттінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

Бекет №	Сынама мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	әр 20 минут сайын үзіліссіз режимде	үзіліссіз режимде	Индербор ауданы, Индербор Мәдениет үйі, Н. Мендіғалиев көшесі 47	күкірт диоксиді, азот диоксиді, күкірттісугеі, көміртегі оксиді.

2024 жылғы желтоқсан айының Индербор ауданының атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері.

Атмосфералық ауа сапасы. Индер ауданының атмосфералық ауаның ластану деңгейі **жоғары**, стандарттық индекс **СИ=9,2** (жоғары деңгей) болып көміртегі оксиді бойынша; ең жоғарықайталануы **ЕЖК=0%** (төмен деңгей) болып бағаланды.

Максималды-бірлік шоғырлары көміртегі оксиді -9,2 ШЖШм.б., күкірттісугеі -8,8 ШЖШм.б., күкірт диоксиді -4,7 ШЖШм.б., басқа ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Орташа-бірлік азот диоксиді бойынша – 1,95 ШЖШо.т., басқа ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асу еселігі және максималды жоғары жағдайлары 8-кестеде көрсетілген.

8-кесте

Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы

	Орташа шоғыр (Qо.т.)	Максималды- бірлік шоғыры (Qм.б.)	ЕЖК	ШЖШ арту жағдайларының саны

Қоспа	МГ/М3	ШЖШ о.т. асу еселігі	МГ/М3	ШЖШ м.б. асу еселігі	%	> ШЖ Ш	>5 ШЖ Ш	>10 ШЖ Ш
Индер ауданы								
Күкірт диоксиді	0,0029	0,06	2,3665	4,7	0,0	1		
Көміртегі оксиді	0,0273	0,01	45,9441	9,2	0,0	1	1	
Диоксид азота	0,0779	1,95	0,1522	0,8				
Күкірттісугеі	0,0010		0,0705	8,8	0,0	1	1	

2.4 Жанбай кенті бойынша атмосфералық ауаның ластану жай күйі

Жанбай селосы аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1 стансада жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы кент бойынша атмосфералық ауа мониторингі 4 көрсеткішке дейін анықталады: 1) *кукірт диоксиді*; 2) *азот диоксиді*; 3) *кукірттісугеі*; 4) *көміртегі оксиді*.

9-кестеде бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

9 кесте

Бекет №	Сынама мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	әр 20 минут сайын	үзіліссіз режимде	Жанбай кенті, Т.Нысанов көшесі 96 участкесі	кукірт диоксиді, азот диоксиді, күкірттісугеі, көміртегі оксиді.

2024 жылғы желтоқсан айының Жанбай кенті атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері.

Атмосфералық ауа сапасы. Жанбай кенті бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі **жоғары**, стандарттық индекс **СИ=9,6** жоғары деңгей) күкірттісугеі бойынша, ең жоғары қайталануы **ЕЖҚ=0%** (төмен деңгей) күкірттісугеі бойынша бағаланды.

Максималды-бірлік шоғырлары күкірттісугеі-9,6 ШЖШм.б., көміртегі оксиді-4,3 ШЖШм.б., күкірт диоксиді-1,0 ШЖШм.б., азот диоксиді -1,0 ШЖШм.б., басқа ластаушызаттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Орташа-бірлік азот диоксиді-3,11 ШЖШо.т., басқа ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асу еселігі және максималды жоғары жағдайлары 10-кестеде көрсетілген.

10-кесте

Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр (Qо.т.)		Максималды-бірлік шоғыры (Qм.б.)		ЕЖҚ	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/М3	ШЖШ о.т. асу еселігі	МГ/М3	ШЖШм.б. асу еселігі		%	> ШЖ Ш	>5 ШЖ Ш
Жанбай кенті								

Күкірт диоксиді	0,0018	0,04	0,5170	1,0	0,0	1		
Көміртегі оксиді	0,3641	0,12	21,5139	4,3	0,0	1		
Диоксид азота	0,1243	3,11	0,2051	1,0	0,1	3		
Күкірттісугеі	0,0011		0,0765	9,6	0,1	2	1	

2.5 Ганюшкино кенті бойынша атмосфералық ауаның ластану жай күйі.

Ганюшкино поселкесі аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1 стансада жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы кент бойынша атмосфералық ауа мониторингі 4 көрсеткішке дейін анықталады: 1) *күкірт диоксиді*; 2) *азот диоксиді*; 3 *күкірттісугеі*; 4) *көміртегі оксиді*.

11-кестеде бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

11кесте

Бекет №	Сынама мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	әр 20 минут сайын үзіліссіз режимде	үзіліссіз режимде	Құрманғазы (Ганюшкино) кенті Құрманғазы ауданының Мәдениет үйі, Абай көшесі, 50-үй	күкірт диоксиді, азот диоксиді, күкірттісугеі, көміртегі оксиді.

2024 жылғы желтоқсан айының Ганюшкино кенті атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері.

Атмосфералық ауа сапасы. Ганюшкино кенті бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі **көтерінкі**, стандарттық индекс **СИ=4,4** (көтерінкі деңгей) көміртегі оксиді бойынша; ең жоғары қайталануы **ЕЖК=0%** (төмен деңгей) болып бағаланды.

Максималды-бірлік шоғырлары көміртегі оксиді-4,4 ШЖШм.б., күкірттісугеі-3,3 ШЖШм.б., басқа ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Орташа-бірлік азот диоксиді бойынша – 3,13 ШЖШо.т. басқа ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асу еселігі және максималды жоғары жағдайлары 12-кестеде көрсетілген.

12-кесте

Қоспа	Орташа шоғыр (Qо.т.)		Максималды-бірлік шоғыры (Qм.б.)		ЕЖ К	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/М3	ШЖШ о.т. асу еселігі	МГ/М3	ШЖШм.б. асу еселігі		%	> III Ж III	>5 ШЖ III
Ганюшкино кенті								
Күкірт диоксиді	0,0012	0,02	0,1450	0,3				

Көміртегі оксиді	0,0145	0,00	21,8673	4,4	0,0	1		
Диоксид азота	0,1250	3,13	0,1913	1,0				
Күкірттісугеі	0,0010		0,0260	3,3	0,1	3		

3. Атырау облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторингі

Атырау қаласы бойынша жер үсті суларының сапасын бақылау 5 су объектісінің (Жайық, Қигаш өзендері, Шаронова арнасы, Перетаска және Яик арналары) 20 тұстамасында жүргізілді.

Теңіз суы сапасына мониторинг жасау Каспий теңізінің **22** жағалаулық нұктеде жүргізіледі: теңіз кеме жүретін су арнасы (2), Жайық өзені қайраны (5), Волга өзені қайраны (5), Шалығи шығанағы аралдары станциялары (5), Жанбай кенті (5).

Жер үсті суларын зерттеу кезінде су сынамаларында су сапасының **43** физикалық және химиялық көрсеткіштері анықталады: *көзбен шолып бақылау, температура, қалқыма заттар, мөлдірлігі, тұсі, сутегі көрсеткіші (pH), еріген оттегі, ОВТ5, ОХТ, құргақ қалдық, құрамында тұз бар негізгі иондар, биогенді элементтер, органикалық заттар (мұнай өнімдері, фенолдар), ауыр металдар мен пестицидтер.*

Атырау облысы аумағындағы гидробиологиялық көрсеткіштер бойынша жер үсті және теңіз сулары сапасының жай-күйіне мониторинг 5 тұстамада 3 су объектісінде (Жайық, Қигаш өзендері және Шаронова тармағында) жүргізілді. Зерттелетін объектіге судың өткір уыттылығын анықтауға арналған 5 сынама талданды.

3.1 Атырау облысы аумағындағы жер үсті сулар гидрохимиялық көрсеткіштері бойынша сапасының мониторинг нәтижелері.

Қазақстан Республикасының су объектілерінің су сапасын бағалауға арналған негізгі нормативтік құжаттар «Су объектілерінде судың сапасын жіктеудің бірынғай жүйесі» (бұдан әрі - Бірынғай жіктеме) болып табылады.

Су объектілерінің су сапасы Бірынғай жіктеме бойынша келесідей бағаланады:

13 кесте

Су объектісінің атауы	Су сапасының класы		Параметрлері	Өл. бір.	концентрациясы
	Желтоқсан 2023 ж.	Желтоқсан 2024 ж.			
Жайық өз.	4 класс	4 класс	Магний	мг/дм ³	59,71
			Бор	мг/дм ³	1,51
			Мұнай өнімдері	мг/дм ³	0,24
Перетаска тарм.	4 класс	4 класс	Магний	мг/дм ³	66,9
			Бор	мг/дм ³	1,39
			Мұнай өнімдері	мг/дм ³	0,25
Яик тарм.	4 класс	4 класс	Магний	мг/дм ³	38,3
			Бор	мг/дм ³	1,32
			Мұнай өнімдері	мг/дм ³	0,29
Қигаш өз.	нормаланбайды (>5 класс)	4 класс	Бор	мг/дм ³	1,13
Шаронова тарм.	4 класс	4 класс	Бор	мг/дм ³	1,04

Кестеден көріп отырғанымыздай, 2023 жылдың желтоқсанымен салыстырғанда Қигаш өзені жоғары 5 кластан 4 класқа өтті – жақсарды.

Жайық өзені, Перетаска, Яик пен Шаронова тармақтарының жер үсті суларының сапасы айтарлықтай өзгерген жоқ.

Атырау облысы бойынша су объектілеріндегі негізгі ластаушы заттар магний, бор және мұнай өнімдері болып табылады.

Жоғары ластану (ЖЛ) және экстремалды ластану (ЭЖЛ) жағдайлары

2024 жылғы желтоқсан айында Атырау облысының аумағында ЖЛ (жоғары ластану) және ЭЖЛ (экстремалды жоғары ластану) жағдайлары тіркелмеді.

Су объектілерінің сапасы жөніндегі ақпарат тұстамалар шегінде Гидрохимиялық көрсеткіштер бойынша 2-қосымшада көрсетілген.

3.2 Атырау облысы аумағындағы жер үсті мен теңіз суларының гидробиологиялық (токсикологиялық) көрсеткіштері бойынша сапасының мониторинг нәтижелері.

Жайық өзені. Жайық өзені бойынша биотестілеу сынақ параметріне сәйкес бақылау нүктелерінің кезекті орналасқан жері: Дамба кентінде – 0%, Атырау қаласы "Атырау су арнасы" КМК тасталуынан 0,5 км төмен – 0%. Индер кенті су бекетінің жармасында – 0%. Алынған мәліметтер сынақ объектісінде суда уытты өсерінің болмағандығын көрсетеді.

Шаронов тармағы. Сынақ объектісі үшін судың өткір уыттылығын анықтау процесінде елшенген дафнияның ағымды бақылауға (сынақ параметріне) қатысты пайызы – 0% құрайды. Сынақ объектісінде улы әсер табылған жоқ.

Қигаш өзені. Қигаш өзеніндегі биотестілеу кезінде алынған деректер сынақ объектісіне улы әсерін тигізбеді. Зерттелген суда қалған дафнилердің саны 100%-ды құрады. Сынақ параметрі – 0%.

Атырау облысының аумағында 3 су объектісінде (Жайық, Қигаш өзендері, Шаронов тармағы) биотестілік (судың өткір уыттылықты анықтау) жүзеге асырылды.

Жайық және Қигаш өзендерінде, Шаронов тармағында токсикологиялық көрсеткіштер бойынша жер үсті суларының сапасы тірі ағзаларға өте уытты әсер етпеді. Жайық өзенінің тұстамасында сынақ көрсеткіші – 0%, Қигаш өзенінде – 0%, Шаронов тармағында – 0% шегінде болды.

Су объектілерінің сапасы жөніндегі ақпарат тұстамалар шегінде токсикологиялық көрсеткіштер бойынша 3-қосымшада көрсетілген.

4. Атырау облысының аумағындағы атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамы

Атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамына бақылау 3 метеостанцияда (Атырау, Ганюшкино, Пешной) алынған жаңбыр суына сынама алумен (қосымша-1) жүргізілді.

Жауын-шашын құрамында барлық анықталатын заттардың шоғырлары шекті рұқсат етілген шоғырлардан аспады.

Жауын-шашын сынамаларында 23,76% сульфаттар, 7,82% хлоридтер, 2,52% нитрит иондары, 37,77% гидрокорбанаттар, 1,96% аммоний иондары 5,31% натрий иондары, 3,70% калий иондары, 3,16% магний иондары, 14,00% кальций иондары басым болды.

Ең үлкен жалпы минерализация Атырау МС – 95,68 мг/л, ең азы Ганюшкино МС 15,14 мг/л белгіленді.

Атмосфералық жауын-шашынның меншікті электр өткізгіштігі 24,60 (Ганюшкино МС) бастап 148,6 мкСм/см (Атырау МС) шегінде болды.

Жауын-шашынның қышқылдығы әлсіз сілтілі орта сипатына ие, 6,05-ден (Ганюшкино МС) 7,21ке (Атырау МС) дейін.


5. Радиациялық жағдай

Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын жергілікті 3 метеорологиялық стансада (Атырау, Пешной, Құлсары), (қосымша-1).


Атырау және Құлсары қалалары бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатына орташа радиациялық гамма-фонның мәні 0,08-0,18 мкЗв/сағ (норматив - 5 мкЗв/сағ дейін). Облыс бойынша радиациялық гамма- фонның орташа мәні 0,11 мкЗв/сағ., яғни шекті жол берілетін деңгейінен аспады.

Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің тұсу тығыздығына бақылау Атырау облысында метеорологиялық станцияда (Атырау) ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды. Стансада бес тәуліктік сынама жүргізілді. Атырау қаласында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің тұсу тығыздығы 1,3-2,1 Бк/м² шегінде болды. Облыс бойынша радиоактивті тұсулердің орташа тығыздығы 1,7 Бк/м², бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.

Қосымша 1




Атырау қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық және жылжымалы желісінің орналасу сызбасы



Құлсары қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы




Мақат ауданы атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сыйбасы



Индер ауданы атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сыйбасы



Ганюшкино поселкесі атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сыйбасы



Жанбай селосы атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сыйбасы



Атырау облысының аумағындағы радиациялық гамма-фон мен радиоактивті түсулдердің тығыздығын бақылау метеостансаларының орналасу сұзбасы.



Атырау облысы аумағындағы атмосфералық жауын-шашын мен қар жамылғысын бақылау метеостансаларының орналасу сұзбасы.

Атырау облысы жер үсті су сапасының тұстамалар бойынша ақпараты

Су объектісінің және тұстама	Физика-химиялық параметрлердің сипаттамасы	
Жайық өз.	судың температурасы 2,8-3,1°C шегінде, сутегі көрсеткіші 7,63-7,8, суда еріген оттегі – 9-9,4 мг/дм ³ , ОБТ5 –2,2-2,6 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 17-17,2 см	
өз. Индер ауд.	4 класс	магний – 54,1 мг/дм ³ . бор – 1,64 мг/дм ³ мұнай өнімдері – 0,24 мг/дм ³ Магний, бор және мұнай өнімдерінің нақты концентрациясы фондық кластан асады.
АҚ «Казтрансойл» НПС Индер Жайық өзенінен 0,5 км жоғары	4 класс	магний – 59,7 мг/дм ³ бор – 1,59 мг/дм ³ мұнай өнімдері – 0,26 мг/дм ³
АҚ «Казтрансойл» НПС Индер Жайық өзенінен 0,5 км төмен	4 класс	магний – 58,7 мг/дм ³ бор – 1,6 мг/дм ³ мұнай өнімдері – 0,24 мг/дм ³
с.Береке Жайық өзенінен 0,5 км жоғары	4 класс	магний – 57,2 мг/дм ³ бор – 1,48 мг/дм ³ мұнай өнімдері – 0,24 мг/дм ³
с.Береке Жайық өзенінен 0,5 км төмен	4 класс	магний – 53,1 мг/дм ³ бор – 1,51 мг/дм ³ мұнай өнімдері – 0,28 мг/дм ³
Атырау қаласы, 1 км жоғары	4 класс	магний – 62,8 мг/дм ³ бор – 1,44 мг/дм ³ мұнай өнімдері – 0,27 мг/дм ³
Атырау қ, 0,5 км жоғары «Атырау су арнасы» КМК	4 класс	магний – 56 мг/дм ³ бор – 1,62 мг/дм ³ мұнай өнімдері – 0,26 мг/дм ³
Атырау қ, 0,5 км төмен «Атырау су арнасы»КМК	4 класс	магний – 57,8 мг/дм ³ бор – 1,59 мг/дм ³ мұнай өнімдері – 0,24 мг/дм ³
Атырау қаласы, 1 км төмен	4 класс	магний – 62,5 мг/дм ³ бор – 1,48 мг/дм ³ мұнай өнімдері – 0,27 мг/дм ³
"Орал-Атырау бекіре зауыты" РМҚК тасталуынан 3 км төмен Курилкино	4 класс	магний – 64,5 мг/дм ³ бор – 1,55 мг/дм ³
«Орал-Атырау бекіре зауыты» РМҚК тасталуынан 0,5 км жоғары Курилкино	4 класс	магний – 67,8 мг/дм ³ бор – 1,26 мг/дм ³
Дамба кенті	4 класс	магний – 62,3 мг/дм ³ . бор – 1,31 мг/дм ³ мұнай өнімдері – 0,28 мг/дм ³ Магний, бор және мұнай өнімдерінің нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Перетаска тармағы	судың температурасы 3-12,3°C шегінде, сутегі көрсеткіші 7,71-7,77, суда ерітілген оттегі – 9,3-9,5 мг/дм ³ , ОБТ5 –2,2-2,5 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 17 см	
Ағыстың тармақталуынан 0,5 км төмен Перетаска	4 класс	магний – 69,5 мг/дм ³ бор – 1,54 мг/дм ³ мұнай өнімдері – 0,25 мг/дм ³

Атырау қ., "Атырау ЖЭО" АҚ тасталуынан 2 км жоғары»	4 класс	магний – 66,2 мг/дм ³ бор – 1,31 мг/дм ³ мұнай өнімдері – 0,24 мг/дм ³
Атырау қ., "Атырау ЖЭО" АҚ тасталуынан 2 км төмен»	4 класс	магний – 65,1 мг/дм ³ бор – 1,34 мг/дм ³ мұнай өнімдері – 0,26 мг/дм ³
Яик тармағы	судың температуrasesы 3-3,1°C шегінде, сутегі көрсеткіші 7,75-7,81, суда еріген оттегі – 9,4-9,5 мг/дм ³ , ОБТ5 –2,2-2,4 мг/дм ³ , мөлдірлігі 17-17,2см	
Рақуша с. Яик ағысының тармақталуынан 0,5 км төмен	4 класс	магний – 43,4 мг/дм ³ бор – 1,34 мг/дм ³ мұнай өнімдері – 0,29 мг/дм ³
Еркінқала ауылы, "Атырау бекіре балық өсіру зауыты" РМҚК тасталуынан 0,5 км жоғары»	4 класс	магний – 36,3 мг/дм ³ бор – 1,28 мг/дм ³ мұнай өнімдері – 0,29 мг/дм ³
Еркінқала ауылы, "Атырау бекіре балық өсіру зауыты" РМҚК тасталуынан 0,5 км төмен»	4 класс	магний – 35,1 мг/дм ³ бор – 1,33 мг/дм ³ мұнай өнімдері – 0,28 мг/дм ³
Шаронова тармағы	судың температуrasesы 3,1°C шегінде, сутегі көрсеткіші 7,75, суда еріген оттегі – 9,2 мг/дм ³ , ОБТ5 -2,1 мг/дм ³ , мөлдірлігі-17,0см	
аул.Ганюшкино, су бекетінің тұсы	4 класс	бор – 1,04 мг/дм ³ . Бордың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Қиғаш өзені	судың температуrasesы 3,0°C шегінде, сутегі көрсеткіші 7,68, суда еріген оттегі- 9,4 мг/дм ³ , ОБТ5 -2,1 мг/дм ³ , мөлдірлігі-15,2см, түстілігі-13 градус	
аул.Котяевка, су бекетінің тұсы	4 класс	бор – 1,13 мг/дм ³ . Бордың нақты концентрациясы фондық кластан асады.

Қосымша 3

Атырау облысының жер үсті мен теңіз сularының сапасының гидробиологиялық көрсеткіштері (уыттылық) жөнінде ақпарат

№	Су объектісі	Бақылау нүктесі	Бағдарлау нүктесі	Сапроб индексі		Су сапасы	Биотестілеу	
				Перифитон	бент ос		Сынақ параметрі, %	Суды бағалау
1	Жайық өзені	Атырау қаласы	«Атырау Су арнасы» КМК тастандыдан 0,5 км төмен	-	-	3	0%	Уыттылық жағдайы
2		Индер ауданы	су бекетінің жармасында	-	-	3	0%	
3		Дамба кенті		-	-	3	0%	
4	Шаронов арнасы	Ганюшкино селосы	су бекетінің жармасында	-	-	3	0%	
5	Қиғаш өзені	Котяевка селосы	су бекетінің жармасында	-	-	3	0%	

Анықтамалық бөлім

**Елді –мекен ауасындағы ластаушы заттардың шекті жол берілген шоғырлары
(ШЖШ)**

Наименование примесей	ШЖШ мәні, мг/м³		Қауіптілік класы
	Максималды бір ретті (ШЖШ_{М.б.})	Орта-тәуліктік (ШЖШ_{о.т.})	
Азот диоксиді	0,2	0,04	2
Азот оксиді	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Қалқыма бөлшектер (шан)	0,5	0,15	3
PM 10 қалқыма бөлшектері	0,3	0,06	
PM 2,5 қалқыма бөлшектері	0,16	0,035	
Хлорлы сутек	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Мыс	-	0,002	2
Күшән	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Қорғасын	0,001	0,0003	1
Күкірт диоксиді	0,5	0,05	3
Күкірт қышқылы	0,3	0,1	2
Күкіртсугегі	0,008	-	2
Көміртегі оксиді	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фторлы сутек	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Мырыш	-	0,05	3

«Қалалық және ауылдық елді-мекендердегі атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық нормативтер» (2022 жылғы 2 тамыз №ҚР ДСМ-70 СанЕН)

Атмосфералық ластану индексінің дәрежесін бағалау

Градациялар	Атмосфералық ауаның ластануы	көрсеткіштер	Айға бағалау
I	Төмен	СИ ЕЖК, %	0-1 0
II	Көтеріңкі	СИ ЕЖК, %	2-4 1-19
III	Жоғары	СИ ЕЖК, %	5-10 20-49
IV	Өте жоғары	СИ ЕЖК, %	>10 >50

Мемлекеттік органдарды тұрғындар қоғамдастырыған ақпараттандыру үшін қалалардың атмосфера ластануының жай-күйі жөніндегі құжат 52.04.667-2005 БҚ. Әзірлеуге, салуга баяндауга және мазмұндауга қойылатын жалпы талаптар.

**ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГ ДЕПАРТАМЕНТІ
РМК «КАЗГИДРОМЕТ» АТЫРАУ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
МЕКЕН-ЖАЙ:
АТЫРАУ ҚАЛАСЫ
ТАЛҒАТ БИГЕЛЬДИНОВА 10А
ТЕЛ. 8-(7122)-52-20-96**

E MAIL: INFO_ATR@METEO.KZ