

Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«Қазгидромет» РММ Түркістан облысы бойынша филиалы



**ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ ЖӘНЕ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ҚОРШАҒАН ОРТА ЖАЙ-КҮЙІ
ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ
БЮЛЛЕТЕНІ**

Желтоқсан 2024ж

Шымкент, 2024 жыл

	Мазмұны	Стр.
	Алғы сөз	3
1	Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері	4
2	Шымкент қ. атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	4
2.1	Қызылсай а. атмосфералық ауа сапасының	
3	Атмосфералық жауын-шашын сапасының жай-күйі	8
4	Түркістан қ. атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	8
4.1	Кентау қ. атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	
4.2	Састөбе а. атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	
5	Жер үсті сулар сапасының мониторингі	12
5.1	Жер үсті сулары бойынша мониторинг нәтижелері.	13
5.2	Су обьектілерінің түптік шегінділерінің мониторинг нәтижелері	14
6	Радиациялық жағдай	14
	Қосымша 1	15
	Қосымша 2	18
	Қосымша 3	19
	Қосымша 4	20
	Қосымша 5	22

Алғы сөз

Ақпараттық бюллетені «Қазгидромет» РМК мамандандырылған бөлімшелері Ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің бақылау желісіндегі қоршаған ортаның жай-күйін бақылау бойынша жүргізген жұмыс нәтижелері бойынша дайындалды.

Бюллетені мемлекеттік органдарды, қоғамды және халықты Түркістан облысының аумағындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы мемлекеттік органдарды, қоғамдастықтарды және тұрғындарды ақпараттандыруға арналған және ластану деңгейінің болып жатқан өзгерістер үрдісін ескере отырып, КР Қоршаған ортаны қорғау саласындағы іс-шаралардың тиімділігін одан әрі бағалау үшін қажет.

Түркістан облысының атмосфералық ауасының сапасын бағалау.

1. Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері

Шымкент қаласы бойынша статистикалық мәліметтерге сәйкес ластаушы заттар шығарындыларының стационарлық көздерінің саны 25934 бірлікті құрайды, 2022 жылы нақты шығарындылардың көлемі жылына 29,7 тоннаны құрады, ал рұқсат етілген көлемі жылына 40026,026 тонна.

Түркістан облысы бойынша ластаушы заттар шығындаларының стационарлық көдерінің саны 8365 бірлікті құрайды, 2021 жылы нақты шығарындылар көлемі жылына 14,1 кг құрады.

2022 жылғы жағдай бойынша Шымкент қаласында 252400 автокөліктер бар. Оның ішінде : жеңіл автокөліктер 18290 бірлік және көлік құралдарының жалпы санының 12,0% құрайды, автобустар - 3541 бірлік, 2,3 % құрайды.

Шымкент қаласы бойынша автомобиль көлігінен зиянды ластаушы заттар шығарындыларының көлемі 2022 жылы 32900 тоннаны, Түркістан облысы бойынша 18,5 тоннаны құрады.

Зиянды шығындылардың негізгі мөлшері жеңіл автокөліктердің үлесіне келеді, жалпы санының 70,8% құрады. Жүк көліктерінен 17,5% және автобустардан 8,9% бөлінеді.

2. Шымкент қ. атмосфералық ауа сапасының жағдайы

Аумақтағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 6 бақылау бекетінде, оның ішінде қолмен сынама алудың 4 постында және 2 автоматты станцияда жүргізіледі (қосымша-1).

Жалпы қала үшін 13-ке дейін көрсеткіштер анықталады: 1) қалқыма заттар(шан); 2) күкірт диоксиді; 3) көміртегі оксиді; 4) азот диоксиді; 5) азот оксиді; 6) формальдегид; 7) күкіртті сутек; 8) аммиак; 9) бенз(а)пирен; 10) кадмий, 11) мыс; 12) қорғасын; 13) хром.

1-кестеде бақылау бекеттерінің орналасуы және әр бекетте анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат келтірілген. Атмосфералық ауаның жағдайын бақылау 6 стационарлық бекетте жүргізілді.

Kесме 1

Бақылау бекеттерінің орналасқан жері және анықталатын қоспалар

№ бекет	Алу уақыты	Бақылау	Бекет мекен-жайлары	Анықталатын қоспалар
1			Абай даңғылы, АО «Южполиметалл» АҚ	қалқыма заттар (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак, күкіртті сутек, формальдегид, бенз(а)пирен Ауыр металлдар: кадмий, мыс, қорғасын, хром
2	Тәулігіне	Қолмен алу	Ордабасы алаңы, Қазыбек би мен Төле би көш. Әтеді	қалқыма заттар (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак, күкіртті сутек, формальдегид, бенз(а)пирен

	3 рет 3	(дискретті әдістер)		Ауыр металлдар: кадмий, мыс, қорғасын, хром
	8		Алдияров көш.нөмірсіз, АҚ «Шымкентцемент»	қалқыма заттар (шаң), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак, күкірттісутек, формальдегид, бенз(а)пирен Ауыр металлдар: кадмий, мыс, қорғасын, хром
5	Әр 20 мин сайын	Үздіксіз режимде	Самал-3 шағын ауданы	азот диоксиді, азот оксиді, аммиак, күкірт диоксиді, күкірттісутек
6			Нұрсат шағын ауданы	Күкірт диоксиді, күкірттісутек

Шымкент қаласының 2024 жылғы желтоқсан айының ауа сапасын бақылау нәтижелері

Бақылау бекеттерінің мәліметтеріне сәйкес атмосфералық ауаның ластану деңгейі **жоғары** болып бағаланды, ол **СИ= 4,4** (көтеріңкі деңгей) күкірттісутегі бойынша және **ЕЖҚ =31%** (көтеріңкі деңгей) күкірттісутегі бойынша №5 бекет аумағында (Самал-3 ш.а.) анықталды.

*БК деректері бойынша, егер СИ, ЕЖҚ әртүрлі градацияга түссе, онда атмосфераның ластану деңгейі осы көрсеткіштерідің ең жоғарғы мәні бойынша бағаланады.

Азот диоксидінің орташа концентрациясы – 1,45 ШЖШ_{о.т.}, формальдегид – 2,0 ШЖШ_{о.т.}, қалқыма бөлшектер -1,33 ШЖШ_{о.т.}, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады .

Күкірттісутегінің максималды бір реттік концентрациясы – 4,4 ШЖШ_{м.р.}, көміртегі оксиді-1,60 ШЖШ_{м.р.}, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады (2-кесте) .

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 2 –кестеде көрсетілген.


2-кесте

Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең үлкен бір реттік шоғыр		ЕЖК %	Асу еселігінің саны ШЖШ		
	МГ/М ³	ШЖШ ₀ т. Асу еселігі	МГ/М ³	ШЖШ _{м.р} Асу еселігі		>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
	соның ішінде							
Шымкент қаласы								
Қалкыма бөлшектер (шан)	0,1991	1,33	0,300	0,60	0,0	0	0	0
Күкірт диоксиді	0,0106	0,21	0,157	0,31	0,0	0	0	0
Көміртегі оксиді	1,6267	0,54	8,000	1,60	2,3	7	0	0
Азот диоксиді	0,0580	1,45	0,120	0,60	0,0	0	0	0
Азот оксиді	0,0188	0,31	0,046	0,11	0,0	0	0	0
Күкірттісугеңі	0,0139		0,035	4,38	18	873	0	0
Аммиак	0,0202	0,50	0,040	0,20	0,0	0	0	0
Формальдегид	0,0200	2,00	0,027	0,54	0,0	0	0	0
Бенз(а)пирен	0,0001	0,08						
Кадмий	0,000012	0,041	0,000015					
Мыс	0,000011	0,005	0,000014					
Қорғасын	0,000021	0,070	0,000024					
Хром	0,000001	0,001	0,000002					

Корытынды:

Соңғы бес жылда ауаның ластану деңгейі желтоқсан айында келесідей өзгерді:



Шымкент қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі кестеден көріп отырғанымыздай, 2020-2023жж көтеріңкі деп, 2024ж жоғары деп бағаланды.

Ең жоғары қайталану көрсеткішінің артуы қүкірттісугеңінің есебінен байқалды.

Метеорологиялық жағдайлар

Желтоқсан айының 17,26,27 жүлдізында аяа ластануының қалыптасуына аяа-райының әсерінен КМЖ (қолайсыз метеорологиялық жағдайлар) тіркелген.

2.1 2024 жылдың желтоқсан айына Қызылсай елді-мекеніндегі атмосфералық аяа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері

Жалпы елді-мекен бойынша 4 көрсеткішке дейін анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) озон.

3-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Kесте-3

Анықтайтын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері

Бекеттің номірі	Сынама алу мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекеттің мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
4	әр 20 минут сайын	Үзіліссіз режимде	Қызылсай елді-мекені, Омарташы, I көшесі.	Күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, озон.

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Қызылсай елді-мекенінде атмосфералық ауаның ластану деңгейі **көтеріңкі** деп бағаланды, ол СИ= 2,2 (көтеріңкі деңгей) және ЕЖҚ = 11% (жоғары деңгей) азот диоксиді бойынша анықталды.

Азот диоксидінің орташа концентрациясы – 3,91 ШЖШ_{о.т.}, басқа ластаушы заттардың ШЖШ - дан аспады.

Азот диоксидінің максималды бір реттік концентрациясы-2,2 ШЖШ_{м.р.}, басқа ластаушы заттардың ШЖШ - дан аспады (4-кесте).

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 4 –кестеде көрсетілген.

Kесте-4

Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең үлкен бір реттік шоғыр		ЕЖҚ %	Асу еселігінің саны ШЖШ _{м.р.}			
	МГ/М ³	ШЖШ _{о.т.} Асу еселігі	МГ/М ³	ШЖШ _{м.р.} Асу еселігі		>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ	
						соның ішінде			
Қызылсай									
Күкірт диоксиді	0,0339	0,68	0,3916	0,78	0,00	0	0	0	
Көміртегі оксиді	0,6916	0,23	5,0921	1,02	0,04	1	0	0	
Азот диоксиді	0,1566	3,91	0,4314	2,16	10,5	235	0	0	
Озон	0,0017	0,06	0,0558	0,35	0,00	0	0	0	

3. Атмосфералық жауын-шашын сапасының жай-күйі

Атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамына бақылау 2 метеостанцияларда (Қазығұрт, Шымкент) алынған жаңбыр сүйнен синама алумен жүргізілді (14.4 сур.).

Жауын-шашын құрамында анықталатын заттардың шоғырлары шекті рұқсат етілген шоғырлардан (ШЖШ) аспады.

Жауын-шашын синамаларында гидрокарбонаттар 37,40%, сульфаттар 23,65%, кальций иондары 12,23%, натрий иондары 5,56 %, хлоридтер 7,31% , калий иондары 3,82 %, магний иондары 2,88 %, аммоний иондары 2,58 % болды.

Ең үлкен жалпы минералдылығы Қазығұрт МС – 50,31 мг/л, ең азы Шымкент МС – 19,83 мг/л белгіленді.

Атмосфералық жауын-шашынның үлесті электрөткізгіштігі Қазығұрт МС – 79,5 мкСм/см, Шымкент МС – 33,7 мкСм/см болды.

Тұсken жауын-шашын қышқылдылығы 5,55 (Шымкент МС) – 6,85 (Қазығұрт МС) аралығында болды.

4. Түркістан қаласындағы атмосфералық ауа сапасының мониторингі

Түркістан қаласының атмосфера ауасының жағдайын бақылау 1 автоматтық бекетте жүргізілді (қосымша1).

Жалпы қала бойынша 6 көрсеткішке дейін анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) азот оксиді; 5) озон; 6) күкірттісутегі.

5-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Кесте-5

Анықтайтын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері

Бекеттің нөмірі	Сынама Алу мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекеттің мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1			<i>Алаша Байтақ жырау көшесі, Оралман ауданы</i>	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, күкірттісутегі, диоксид және азот оксиді, озон
2	әр 20 минут сайын	Үзіліссіз режимде	<i>Қала орталығында</i>	Күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, озон
3			<i>A.Сандыбай к., 58B</i>	

2024 жылдың желтоқсан айына Түркістан қаласында атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Түркістан қаласының атмосфералық ауаның ластану деңгейі **жоғары** деп бағаланды, ол СИ=4(көтеріңкі деңгей) және ЕЖК =48% (жоғары деңгей) құқірт диоксиді бойынша №3 бекет аумағында (А.Сандыбай көш.58В) анықталды.

*БК деректері бойынша, егер СИ, ЕЖК әртүрлі градацияга түссе, онда атмосфераның ластану деңгейі осы көрсеткіштерідің ең жоғарғы мәні бойынша бағаланады.

Азот диоксидінің орташа концентрациясы – 1,59 ШЖШ_{о.т.}, құқірт диоксиді-3,96 ШЖШ_{о.т.}, озон-1,09 ШЖШ_{о.т.}, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады.

Азот диоксидінің максималды бір реттік концентрациясы – 1,59 ШЖШ_{м.р.}, құқірт диоксиді – 3,99 ШЖШ_{м.р.}, көміртегі оксиді – 1,34 ШЖШ_{м.р.}, құқірттісутегі – 2,58 ШЖШ_{м.р.}, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады (бекесте).

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 6 –кестеде көрсетілген.


Кесте-6

Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең үлкен бір реттік шоғыр		ЕУК	Асу еселігінің саны ШЖШ _{м.р.}			
	МГ/М ³	ШЖШ _{о.т.} Асу еселігі	МГ/М ³	ШЖШ _{м.р.} Асу еселігі		%	>ШЖШ	>5 ШЖШ	
								>10 ШЖШ	
Түркістан қаласы									
Азот диоксиді	0,063	1,57	0,317	1,59	8,35	559	0	0	
Күкірт диоксиді	0,198	3,96	1,995	3,99	23,86	1065	0	0	
Азот оксиді	0,001	0,01	0,001	0,00	0,00	0	0	0	
Көміртегі окиді	0,990	0,33	6,716	1,34	0,37	25	0	0	
Озон	0,033	1,09	0,075	0,47	0,00	0	0	0	
Күкірттісутегі	0,0010		0,021	2,58	0,04	1	0	0	

Қорытынды:

Соңғы бес жылда ауаның ластану деңгейі желтоқсан айында келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, Түркістан қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі 2020- 2021ж.ж. көтерінкі деп, 2022-2024жж жоғары деп бағаланды.

Ең жоғары қайталану көрсеткішінің артуы негізі азот диоксидінің есебінен байқалды.

4.1 Кентау қаласындағы атмосфералық ауа сапасының мониторингі

Кентау қаласы аумағында атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1 автоматты станцияда жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы қала бойынша 3 көрсеткішке дейін анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) күкірт сутегі.

7-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Кесте 7

Анықтайтын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері

Бекеттің номірі	Сынама алу мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекеттің мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
7	әр 20 минут сайын	Ұзіліссіз режимде	Уалиханов көшесі, 3 «А» уч.	Көміртегі оксиді, күкірт диоксиді, күкіртсугегі

2024 жылдың желтоқсан айындағы Кентау қаласында атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері.

Кентау қаласының бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі **көтерінкі** деп бағаланды, ол **СИ =1,6** (төмен деңгей) және **НП =4%** (көтерінкі деңгей).

*БК деректері бойынша, егер СИ, ЕЖК әртүрлі градацияга түссе, онда атмосфераның ластану деңгейі осы көрсеткіштерідің ең жоғарғы мәні бойынша бағаланады.

Ластаушы заттардың орташа бір реттік концентрациясы ШЖШ-дан аспады.

Көмірсугегінің максималды бір реттік концентрациясы – 1,59 ШЖШ м.р., басқа lastaushy заттар ШЖШ-дан аспады (8-кесте).

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖК астам) және ЭЖЛ (50 ШЖК астам) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асып кетуінің айқындылығы және асып кету жағдайларының саны 8-кестеде көрсетілген.


Kесте 8

Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең үлкен бір реттік шоғыр		ЕЖК %	Асу еселігінің саны ШЖШ _{м.р.}		
	МГ/М ³	ШЖШ _{о.т.} Асу еселігі	МГ/М ³	ШЖШ _{м.р.} Асу еселігі		>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
				соның ішінде				
Кентау қаласы								
Күкірт диоксиді	0,0034	0,07	0,0245	0,05	0,00	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,3177	0,11	3,0601	0,61	0,00	0	0	0
Күкіртсутегі	0,0016		0,0133	1,66	3,99	89	0	0

Қорытынды:

Соңғы бес жылда ауаның ластану деңгейі желтоқсан айында келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, Кентау қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі 2022жылы төмен деп, 2020-2021жж және 2023-2024жж көтеріңкі деп бағаланды.

4.2 2024 жылғы желтоқсан айындағы Түркістан облысы Састане ауылындағы атмосфералық ауаның сапасына мониторинг

Жалпы 4 көрсеткіш анықталынады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) озон.

9-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Кесте 9

Анықтайтын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері

Бекет	Сынама	Бақылау	Бекеттің	Анықталатынқоспалар
-------	--------	---------	----------	---------------------

нөмірі	алу мерзімі	жүргізу	мекен-жайы	
1	әр 20 минут сайын	Үзіліссіз режимде	Састебе а. F. Мұратбаев көш., 1А	көміртегі оксиді, азот диоксиді, күкіртсугегі, озон

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Састебе ауылының атмосфералық ауаның ластану деңгейі **төмен** деп бағаланды, ол **СИ= 1,3** (төменгі деңгей) және **ЕЖҚ = 0 %** (төменгі деңгей).

Азот диоксидінің орташа концентрациясы - 1,28 ШЖШ_{о.т.}, озон – 1,88 ШЖШ_{о.т.} басқа ластаушы заттар ШЖШ - дан аспады.

Күкірт диоксидінің максималды бір реттік концентрациясы-1,35 ШЖШ_{м.р.}, озон –1,20 ШЖШ_{м.р.}, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады (10-кесте).

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 10 –кестеде көрсетілген.

Кесте-10

Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең үлкен бір реттік концентрация		ЕЖҚ %	Асу еселігінің саны ШЖШ _{м.р.}		
	МГ/М ³	ШЖШ _{о.т.} Асу еселігі	МГ/М ³	ШЖШ _{м.р.} Асу еселігі		>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
Састебе								
Азот диоксиді	0,0011	0,02	0,0665	0,13	0,00	0	0	0
Күкірт диоксиді	0,6973	0,23	6,7516	1,35	0,045	1	0	0
Көміртегі оксиді	0,0511	1,28	0,0897	0,45	0,00	0	0	0
Озон	0,0563	1,88	0,1923	1,20	0,045	1	0	0

5. Түркістан облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторингі

Жер үсті су сапасының жай-күйіне мониторинг 7 су объектілерінде, өзендер: Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Ақсу, Катта-бугун, Шардара су қоймасы 12 тұстамасында жүргізілді.

Жер үсті суларын зерттеу кезінде су сынамаларында су сапасының **40** физикалық және химиялық көрсеткіштері анықталады: *көзбен шолып бақылау, су температурасы, ерітілген оттегі, сутегі көрсеткіші, өлишенген заттар, мөлдірлік, тұз құрамының басты иондары, биогенді (азот, фосфор, темір қосылыстары) және органикалық заттар (мұнай өнімдері, фенолдар), ауыр металдар (мыс, мырыши, қорғасын, кадмий, хром, никель, синап), пестицидтер (ДДТ, ДДЕ, ДДТ, ГХЦГ альфа және гамма).*

Тұптік шөгінділер сапасының мониторингі Сырдария өзенінің және Шардара су қоймасының 3 бақылау нүктелері бойынша жүргізді. Тұптік шөгінділер сынамасында ауыр металдарға (қорғасын, кадмий, марганец, мыс, мырыш, никель, хром) және органикалық заттарға (мунаидері) талдау жүргізілді.

5.1 Түркістан облысы аумағындағы жер үсті сулар гидрохимиялық көрсеткіштері бойынша сапасының мониторинг нәтижелері.

Қазақстан Республикасының су объектілерінің су сапасын бағалауға арналған негізгі нормативтік құжаттар «Су объектілерінде судың сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі» (бұдан әрі - Бірыңғай жіктеме) болып табылады.

Су объектілерінің су сапасы Бірыңғай жіктеме бойынша келесідей бағаланады:

3 кесте

Су объектісінің атауы	Су сапасының класы		Параметрлері	Өлш. бірл.	Концентрация
	Желтоқсан 2023 г.	Желтоқсан 2024 г.			
Сырдария өз.	нормаланбайды (>5 класс)	3 класс	Аммоний-ионы	мг/дм ³	0,581
Келес өз.	4 класс	Не нормируются (>5 класс)	Қалқыма заттар	мг/дм ³	425,5
Бадам өз.	4 класс	1 класс*			
Арыс өз.	3 класс	1 класс*			
Аксу өз.	3 класс	1 класс*			
Катта-бөген өз.	нормаланбайды (>5 класс)	Не нормируются (>5 класс)	Қалқыма заттар	мг/дм ³	48,8

Ескерте: * - 1 класс – «ең жақсы сапа»

***- заттар берілген клас бойынша нормаланбайды

3-кестеден көріп отырғанымыздай, 2023 жылғы желтоқсан айымен салыстырғанда Сырдария өзенінің жер үсті суларының сапасы 5-тен жоғары кластан 3 класқа, Бадам өзені 4 кластан 1 класқа, Арыс және Аксу өзендері 3 кластан 1 класқа өтті – жақсарды.

Келес өзенінің жерүсті суларының сапасы 4 кластан 5-тен жоғары класқа өтті – нашарлады.

Катта-бөген өзенінің жер үсті суларының сапасы айтарлықтай өзгерген жоқ.

Түркістан облысының су объектілеріндегі негізгі ластаушы заттар аммоний-ионы және қалқыма заттар болып табылады. Осы көрсеткіштер

бойынша сапа нормативтерінің асып кетуі негізінен тұрмыстық, өнеркәсіптік және ауылшаруашылық төгінділеріне тән.

2024 жылғы желтоқсан айында Түркістан облысының аумағында жоғары және экстремалды жоғары ластану жағдайлары тіркелмеді.

2 Қосымшада тұстамалар шегінде су объектілерінің сапасы бойынша ақпарат.

5.2 Түркістан облысы аумағындағы су объектілерінің тұптік шөгінділерінің мониторинг нәтижелері.

Сырдария өзен бассейніндегі тұптік шөгінділерді зерттеу нәтижелері бойынша ауыр металдардың құрамы келесі аралықта өзгерген: мыс – 0,8-0,9 мг/кг, мырыш – 2,3-2,35 мг/кг, никель – 0,8-0,96 мг/кг, марганец – 0,70-0,81 мг/кг, хром – 0,10-0,13 мг/кг, корғасын мен кадмийдің концентрациясы табылған жоқ. Мұнай өнімдерінің мөлшері – 2,1-2,2 % болды.

Сырдария өзен бассейнінің суының тұптік шөгінділерін зерттеу нәтижелері 3 Қосымшада көрсетілген.

6. Радиациялық жағдай

Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын жергілікті 2 метеорологиялық станцияда (Шымкент, Түркістан) және атмосфералық ауаның ластануына бақылау Түркістан қаласының (№1 ЛББ) 1 автоматты бекетінде бақылау жүргізілді (14.5-сур.).

Облыстың елді-мекендері бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатындағы радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,09-0,21 мкЗв/сағ аралығында болды. Облыс бойынша радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,15 мкЗв/сағ, яғни шекті жол берілетін шамаға сәйкес келеді.


Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің тұсу тығыздығына бақылау Түркістан облысының аумағында 2 метеорологиялық станцияда (Шымкент, Түркістан) ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды (14.5-сур.). Барлық станцияда бес тәуліктік сынама жүргізілді.

Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің тұсу тығыздығы 1,6-2,5 Бк/м² құрады. Облыс бойынша радиоактивті тұсулердің орташа тығыздығы 1,9 Бк/м², бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.


Қосымша 1




Сурет 1 - Шымкент қ. атмосфералық ауаның ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы



Сурет 2 - Шымкент қ. атмосфералық ауаның ластануын бақылаудың экспедициалық желісінің орналасу схемасы



Сурет 3 – Қызылсай елді мекенінің атмосфералық ауасының ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы.




Сурет 4 – Түркістан қаласының атмосфералық ауасының ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы.



Сурет 5 - Ластануды бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы Кентай қаласының атмосфералық ауасы.



Сурет 6—Састөбе елді мекенінің атмосфералық ауасының ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы.



Сурет 4 – Туркістан облысы тұстамалардың орналасу схемасы

2 Қосымша

Түркістан облысы жер үсті су сапасының тұстамалар бойынша ақпараты

Су объектілері тұстамалары	және	Физика-химиялық параметрлердің сипаттамасы
Сырдария өзені		судың температурасы 3,8-8,7°C, сутегі көрсеткіші 7,6-7,9, суда еріген оттегінің концентрациясы 6,8-11,6 мг/дм ³ , ОБТ ₅ мәні 1,3-2,3 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 12,0-25,0 см.
тұстама - Көкбұлақ а. (бекеттен ССБ қарай 10,5 км)	3 класс	аммоний ионы - 0,681 мг/дм ³ . Аммоний ионының нақта концентрациясы фондық кластан асады.
тұстама - Шардара т/б (Шардара б. кіре-берісінен 2,0 км төмен)	1 класс	-
тұстама – Азаттық а. (Сырдария өзенінің көпірі -ауылдан 5 км)	3 класс	аммоний-ионы – 0,573 мг/дм ³
Келес өзені		судың температурасы 3,4-7,3°C, сутегі көрсеткіші 7,6-8,0, суда еріген оттегінің концентрациясы 6,2-11,1 мг/дм ³ , ОБТ ₅ мәні 1,0-1,9 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 7,0-24,0 см.
тұстама – Казыгурт а. (ауылдан 0,2 км жоғары, г/п 0,8 км жоғары)	1 класс	-

Келес-сағасы (сағасынан 1,2 км жоғары)	нормаланбайды (>5 класс)	қалкыма заттар – 830,8 мг/дм ³ . Қалкыма заттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Бадам өзені		судың температурасы 6,4-7,4°C, сутегі көрсеткіші 7,7-7,8, суда еріген оттегінің концентрациясы 5,2-6,5 мг/дм ³ , ОБТ ₅ мәні 1,0-1,6 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 16,0-19,0 см.
тұстама - Шымкент гидро бекеті (Шымкентен 2,0 км төмен)	1 класс	-
тұстама - Қараспан а. (жол көпірінен 0,1 км төмен)	1 класс	-
Арыс өзені		судың температурасы 5,1°C, сутегі көрсеткіші 7,6, суда еріген оттегінің концентрациясы – 6,8 мг/дм ³ , ОБТ ₅ – 0,6 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 17,0 см.
тұстама – Арыс қ. (жд станция)	1 класс	-
Ақсу өзені		судың температурасы 1,0-8,8°C, сутегі көрсеткіші 7,6-7,8, суда еріген оттегінің концентрациясы 6,5-7,2 мг/дм ³ , ОБТ ₅ 0,9-1,0 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 21,0-25,0 см.
тұстама - Сарқырама а. (ауылдан онтүстік-батысқа қарай, сағадан қаш. 52 км)	1 класс	-
тұстама - Көлкент а. (ауылдан солтүстікке қарай 1,5-2 км, су бекетінен 10 м төмен)	1 класс	-
Катта-бөген өзені		судың температурасы 11,2°C, сутегі көрсеткіші 7,5, суда еріген оттегінің концентрациясы – 6,2 мг/дм ³ , ОБТ ₅ 1,6 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 25,0 см.
тұстама - Жарықбас а. (ауылдан 1,5 км жоғары)	1 класс	-

Ескерте: * - 1 класс – «ең жақсы сапа»

***- заттар берілген клас бойынша нормаланбайды

3 Қосымша

Түркістан облысы Сырдария өзен бассейнінің сүйнештік тұптік шөгінділерін 2024 жылғы желтоқсан айындағы зерттеу нәтижелері

№ п/п	Сынама алу орны	Шоғыр, мг/кг							
		Мұнай өнімдері %	Мыс	Хром	Кад-мий	Никел	Марга-нең	Қорғасын	Мырыш
1	Сырдария өз, Шардара т/б, Шардара су қойм платинсынан 2км төменде.	2,1	0,8	0,10	0,0	0,80	0,70	0,0	2,3
2	Тұстама – Кекбұлақ а. (бекеттен ССБ қарай 10,5 км)	2,2	0,9	0,13	0,0	0,96	0,81	0,0	2,35

4 Қосымша

Анықтамалық бөлім

Елді мекендердің ауасындағы ластаушы заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясы (ШЖШ)

Қоспалардың атауы	ШЖШ мәні, мг/м³		Қауіп сыйныбы
	Максимальды бір реттік	Орташа тәуліктік	
Азот диоксиді	0,2	0,04	2
Азотоксиді	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/a/пирен	-	0,1 мкг/100 м³	1
Қалқыма заттар (частицы)	0,5	0,15	3
Қалқыма бөлшектер PM 10	0,3	0,06	
Қалқыма бөлшектер PM 2,5	0,16	0,035	
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Мыс	-	0,002	2
Күшән	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Корғасын	0,001	0,0003	1
Күкірт диоксиді	0,5	0,05	3
Күкірт қышқылы	0,3	0,1	2
Күкірттісутек	0,008	-	2
Көміртегі оксиді	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Қалалық және ауылдық жерлердегі атмосфералық ауаның гигиеналық стандарты» (СанПин №ҚР ДСМ-70 2тамыз 2022 жылдан бастап)

Атмосфераның ластану индексінің дәрежесін бағалау

Градация	Ауаның ластануы	Көрсеткіштер	Ай сайынғы бағалау
I	Төменгі	СИ ЕЖҚ, %	0-1 0
II	Көтерінкі	СИ ЕЖҚ, %	2-4 1-19
III	Жоғары	СИ ЕЖҚ, %	5-10 20-49
IV	Өте жоғары	СИ ЕЖҚ, %	>10 >50

РД 52.04.667–2005, Мемлекеттік органдарды, халықты және халықты ақпараттандыру үшін қалалардағы ауаның ластану жағдайы туралы құжаттар. Әзірлеуге, құрылышқа, презентацияға және мазмұнға қойылатын жалпы талаптар.

Радиациялық қауіпсіздік стандарты*

Стандартталған мәндер	Мөлшер шектері
Тиімді мәндер	Халық
	Кез-келген 5 жыл ішінде орта есеппен жылына 1м3в, бірақ жылына 5м3в аспайды.

*«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитарлық – эпидемиологиялық талаптар »

Су пайдалану санаттары (түрлері) бойынша су пайдалану сыныптарын саралау

Су пайдаланукатегориясы (түрі)	Тазалаумақсаты / түрі	Су пайдаланукластары				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Балықшаруашылығысуынпайдалану	Лосось	+	+	-	-	-
	Тұқы	+	+	-	-	-
Шаруашылық-ауыз су пайдалану	Қарапайым су дайындау	+	+	-	-	-
	Кәдімгі су дайындау	+	+	+	-	-
	Қарқынды су дайындау	+	+	+	+	-
Рекреациялық су пайдалану (мәдени-тұрмыстық)		+	+	+	-	-
Суару	Дайындықсыз	+	+	+	+	-
	Карталардатұндыру	+	+	+	+	+
Өнеркәсіп:						
технологиялық мақсаттар, процестер салқыннату		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
пайдалықазбалардыөндіру		+	+	+	+	+
көлік		+	+	+	+	+

Су обьектілеріндегі су сапасынжіктеудіңбірыңғайжүесі (АШМ СРК 09.11.2016 ж. №151Бұйрығы

Қосымша 5

Зиянды микроорганизмдердің, топырақты ластайтын басқа да биологиялық және зиянды заттардың берілетін шекті шоғырлану нормативтері

№№ п/п	Заттыңатауы	Шектірұқсатетілгенконцентрация (бұданәрі - ШРК), топырақтағыкилограмгамилиграмм	Шектеушікөрсеткіш	Ескертпе
Химиялықзаттар				
1	Марганец	1500	жалпысанитарлық	

2	Мыс	3,0 (жылжымалынысан)	жалпысанитарлық	Мыстыңжылжымалыформасы РН 4,8 ацетатты аммоний буферлікерітіндісіменалынады.
3	Мышьяк	2,0 (жалпықұрамы)	транслокациялық	ШРК фонды ескереотырыпберілген.
4	Никель	4,0 (жылжымалынысан)	жалпысанитарлық	Никельдіңжылжымалыформасы РН 4,6 ацетатты аммоний буферлікерітіндісіменалынады.
5	Сынап	2,1 (жалпымазмұны)	транслокациялық	ШРК фонды ескереотырыпберілген
6	Қорғасын	32,0 (жалпықұрамы)	жалпысанитарлық	ШРК фонды ескереотырыпберілген
7	Қорғасын + сынап	20,0 + 1,0 (жалпықұрамы)	транслокациялық	
8	Хром	6,0 (жылжымалынысан)	жалпысанитарлық	ШРК фонды ескереотырыпберілген. Хромныңқозғалмалыформасы РН 4,8 ацетатты аммоний буферлікерітіндісіменалынады.
9	Хром ^{+ 6}	0,05	жалпысанитарлық	
10	Мырыш	23,0 (жылжымалынысан)	транслокациялық	Мырыштыңжылжымалыформасы РН 4,8 ацетатты-аммоний буферліерітіндісіменалынады

ТАБИГИ ОРТАНЫҢ ЛАСТАНУ МОНИТОРИНГІ ЗЕРТХАНАСЫ
"ҚАЗГИДРОМЕТ" РМК ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
МЕКЕН-ЖАЙЫ:
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ЖЫЛҚЫШИЕВ КӨШЕСІ, 44
ТЕЛ. 8-(7252)-54-05-33
E MAIL: LMZPS_UKO@METEO.KZ