

Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі  
«Қазгидромет» РММ Түркістан облысы бойынша филиалы



**ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ ЖӘНЕ  
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША  
ҚОРШАҒАН ОРТА ЖАЙ-КҮЙІ  
ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ  
БЮЛЛЕТЕНІ**

наурыз 2025ж

Шымкент, 2025 жыл

	<b>Мазмұны</b>	<b>Стр.</b>
	<b>Алғы сөз</b>	3
<b>1</b>	Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері	4
<b>2</b>	Шымкент қ. атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	4
<b>2.1</b>	Қызылсай а. атмосфералық ауа сапасының	
<b>3</b>	Атмосфералық жауын-шашын сапасының жай-күйі	8
<b>4</b>	Түркістан қ. атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	8
<b>4.1</b>	Кентау қ. атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	
<b>4.2</b>	Састөбе а. атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	
<b>5</b>	Жер үсті сулар сапасының мониторингі	12
<b>5.1</b>	Жер үсті сулары бойынша мониторинг нәтижелері.	12
<b>6</b>	Радиациялық жағдай	13
	<b>Қосымша 1</b>	14
	<b>Қосымша 2</b>	17
	<b>Қосымша 3</b>	19
	<b>Қосымша 4</b>	20

## **Алғы сөз**

Ақпараттық бюллетень «Қазгидромет» РМК мамандандырылған бөлімшелері Ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің бақылау желісіндегі қоршаған ортаның жай-күйін бақылау бойынша жүргізген жұмыс нәтижелері бойынша дайындалды.

Бюллетень мемлекеттік органдарды, қоғамды және халықты Түркістан облысының аумағындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы мемлекеттік органдарды, қоғамдастықтарды және тұрғындарды ақпараттандыруға арналған және ластану деңгейінің болып жатқан өзгерістер үрдісін ескере отырып, ҚР Қоршаған ортаны қорғау саласындағы іс-шаралардың тиімділігін одан әрі бағалау үшін қажет.

## **Түркістан облысының атмосфералық ауасының сапасын бағалау.**

### **1. Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері**

Шымкент қаласы бойынша статистикалық мәліметтерге сәйкес ластаушы заттар шығарындыларының стационарлық көздерінің саны 3976 бірлікті құрайды, 2023 жылы нақты шығарындылардың көлемі жылына 29,3 тоннаны құрады, ал рұқсат етілген көлемі жылына 416,4 тонна.

Түркістан облысы бойынша ластаушы заттар шығындаларының стационарлық көдерінің саны 8363 бірлікті құрайды, 2023 жылы нақты шығарындылар көлемі жылына 26,7 тонна құрады.

2024 жылғы жағдай бойынша Шымкент қаласында 450000 автокөліктер бар. Оның ішінде : женіл автокөліктер 418500 бірлік және көлік құралдарының жалпы санының 93,0% құрайды, автобустар - 12600 бірлік, 2,8 % құрайды.

Шымкент қаласы бойынша автомобиль көлігінен зиянды ластаушы заттар шығарындыларының көлемі 2024 жылы 26611 тоннаны, Түркістан облысы бойынша 26,7 тоннаны құрады.

Зиянды шығындылардың негізгі мөлшері женіл автокөліктердің үлесіне келеді, жалпы санының 32,7% құрады. Жүк көліктерінен 10,6% және автобустардан 8,3% бөлінеді.

### **2. Шымкент қ. атмосфералық ауа сапасының жағдайы**

Аумақтағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 6 бақылау бекетінде, оның ішінде қолмен сынама алушын 4 постында және 2 автоматты станцияда жүргізіледі (қосымша-1).

Жалпы қала үшін 13-ке дейін көрсеткіштер анықталады: 1) қалқыма заттар(шан); 2)күкірт диоксиді; 3)көміртегі оксиді; 4)азот диоксиді; 5)азот оксиді; 6)формальдегид; 7)күкіртті сутек; 8)аммиак; 9) бенз(а)пирен; 10)кадмий, 11) мыс; 12)қорғасын; 13) хром.

1-кестеде бақылау бекеттерінің орналасуы және әр бекетте анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат келтірілген. Атмосфералық ауаның жағдайын бақылау 6 стационарлық бекетте жүргізілді.

*Kесте 1*

Бақылау бекеттерінің орналасқан жері және анықталатын қоспалар

№ бекет	Алу уақыты	Бақылау	Бекет мекен-жайлары	Анықталатын қоспалар
1			Абай даңғылы, АО «Южполиметалл» АҚ	қалқыма заттар (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак, күкіртті сутек, формальдегид, бенз(а)пирен Ауыр металлдар: кадмий, мыс,

				қорғасын, хром
2	Тәулігіне 3 рет	Қолмен алу (дискретті әдістер)	Ордабасы алаңы, Қазыбек би мен Төле би көш. өтеді	қалқыма заттар (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак, күкіртті сутек, формальдегид, бенз(а)пирен Ауыр металлдар: кадмий, мыс, қорғасын, хром
3			Алдияров көш.нөмірсіз, АҚ «Шымкентцемент»	қалқыма заттар (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак, күкіртті сутек, формальдегид, бенз(а)пирен Ауыр металлдар: кадмий, мыс, қорғасын, хром
8			Сайрам көш, 198, ЗАО «Пив завод»	қалқыма заттар (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак, күкіртті сутек, формальдегид, бенз(а)пирен Ауыр металлдар: кадмий, мыс, қорғасын, хром
5	Әр 20 мин сайын	Үздіксіз режимде	Самал-3 шағын ауданы	азот диоксиді, азот оксиді, аммиак, күкірт диоксиді, күкіртті сутек
6			Нұрсат шағын ауданы	Күкірт диоксиді, күкіртті сутек

## Шымкент қаласының 2025 жылғы наурыз айының ауа сапасын бақылау нәтижелері

Бақылау бекеттерінің мәліметтеріне сәйкес атмосфералық ауаның ластану деңгейі **көтеріңкі** болып бағаланды, ол **ЕЖҚ =16%** (көтеріңкі деңгей) және **СИ= 3,2** (көтеріңкі деңгей) күкірттісуге тіптегі бойынша №5 бекет аумағында (Самал-3 ш.а.) анықталды.

Азот диоксидінің орташа концентрациясы – 1,22 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, формальдегид – 1,77 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, қалқыма бөлшектер -1,35 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады.

Күкірттісуге тіптегінің максималды бір реттік концентрациясы – 3,23 ШЖШ<sub>м.р.</sub>, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады (2-кесте) .

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 2 –кестеде көрсетілген.

## Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең үлкен бір реттік шоғыр		ЕЖК %	Асу еселігінің саны ШЖШ		
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>о</sub> .т. Асу еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.р</sub> Асу еселігі		>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
	соның ішінде							
<b>Шымкент қаласы</b>								
Қалкыма бөлшектер (шан)	0,2030	1,35	0,400	0,80	0,0	0	0	0
Күкірт диоксиді	0,0101	0,20	0,072	0,14	0,00	0	0	0
Көміртегі оксиді	1,8182	0,61	4,000	0,80	0,00	0	0	0
Азот диоксиді	0,0487	1,22	0,090	0,45	0,00	0	0	0
Азот оксиді	0,0177	0,29	0,040	0,10	0,00	0	0	0
Күкірттісугеңі	0,0118		0,026	3,23	8,50	402	0	0
Аммиак	0,0216	0,54	0,030	0,15	0,00	0	0	0
Формальдегид	0,0177	1,77	0,026	0,52	0,00	0	0	0
Бенз(а)пирен	0,00022	0,2						
Кадмий	0,000015	0,051	0,000022					
Мыс	0,000013	0,007	0,000016					
Қорғасын	0,000018	0,059	0,000022					
Хром	0,000001	0,001	0,000002					

**Қорытынды:**

Соңғы бес жылда ауаның ластану деңгейі наурыз айында келесідей өзгерді:



Шымкент қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі кестеден көріп отырғанымыздай, 2021-2025жж көтеріңкі деп бағаланды.

Ең жоғары қайталану көрсеткішінің артуы күкірттісугеңінің есебінен байқалды.

## Метеорологиялық жағдайлар

Наурыз айында ауа ластануының қалыптасуына ауа-райының әсері байқалмады, ҚМЖ құндер (қолайсыз метеорологиялық жағдайлар) тіркелген жоқ.

### **2.1 2025 жылдың наурыз айына Қызылсай елді-мекеніндегі атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері**

Жалпы елді-мекен бойынша 4 көрсеткішке дейін анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) озон.

3-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

*Кесте-3*

*Анықтайтын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері*

<b>Бекеттің нөмірі</b>	<b>Сынама алу мерзімі</b>	<b>Бақылау жүргізу</b>	<b>Бекеттің мекен- жайы</b>	<b>Анықталатын қоспалар</b>
4	әр 20 минут сайын	Үзіліссіз режимде	<i>Қызылсай елді- мекені, Омарташи, I көшесі.</i>	Күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, озон.

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Қызылсай елді-мекеніндегі атмосфералық ауаның ластану деңгейі **көтеріңкі** деп бағаланды, ол **ЕЖК = 11%** (көтеріңкі деңгей) және **СИ= 1,5** (төмен деңгей) азот диоксиді бойынша анықталды.

\*БК деректері бойынша, егер СИ, ЕЖК әртүрлі градацияга түссе, онда атмосфераның ластану деңгейі осы көрсеткіштердің ең жоғарғы мәні бойынша бағаланады.

Азот диоксидінің орташа концентрациясы – 4,07 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, басқа ластаушы заттардың ШЖШ - дан аспады.

Азот диоксидінің максималды бір реттік концентрациясы -1,54 ШЖШ<sub>м.р.</sub>, басқа ластаушы заттардың ШЖШ - дан аспады (4-кесте).

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 4 –кестеде көрсетілген.

*Кесте-4*

*Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы*

<b>Қоспа</b>	<b>Орташа шоғыр</b>		<b>Ең үлкен бір реттік шоғыр</b>		<b>ЕЖК</b>	<b>Асу еселігінің саны ШЖШ<sub>м.р.</sub></b>		
	<b>МГ/М<sup>3</sup></b>	<b>ШЖШ<sub>о.т.</sub> Асу еселігі</b>	<b>МГ/М<sup>3</sup></b>	<b>ШЖШ<sub>м.р.</sub> Асу еселігі</b>		<b>%</b>	<b>&gt;ШЖШ</b>	<b>&gt;5 ШЖШ</b>
соның ішінде								

Қызылсай								
Күкірт диоксиді	0,0247	0,49	0,3174	0,63	0,000	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,6057	0,20	2,7265	0,55	0,000	0	0	0
Азот диоксиді	0,1628	4,07	0,3078	1,54	11,425	255	0	0
Озон	0,0028	0,09	0,1045	0,65	0,000	0	0	0

### 3. Атмосфералық жауын-шашын сапасының жай-күйі

Атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамына бақылау 2 метеостанцияларда (Қазығұрт, Шымкент) алынған жаңбыр суына сынама алумен жүргізілді (14.4 сур.).

Жауын-шашын құрамында анықталатын заттардың шоғырлары шекті рұқсат етілген шоғырлардан (ШЖШ) аспады.

Жауын-шашын сынамаларында гидрокарбонаттар 36,18%, сульфаттар 28,6%, кальций иондары 13,56%, натрий иондары 4,14 %, хлоридтер 5,16% , калий иондары 1,87 %, магний иондары 2,38 %, аммоний иондары 5,49 % болды.

Ең үлкен жалпы минералдылығы Қазығұрт МС – 60,23 мг/л, ең азы Шымкент МС – 37,9 мг/л белгіленді.

Атмосфералық жауын-шашынның үлесті электрөткізгіштігі Қазығұрт МС – 98,7 мкСм/см, Шымкент МС – 62,6 мкСм/см болды.

Тұсken жауын-шашын қышқылдылығы 6,26 (Шымкент МС) – 6,81 (Қазығұрт МС) аралығында болды.

### 4. Түркістан қаласындағы атмосфералық ауа сапасының мониторингі

Түркістан қаласының атмосфера ауасының жағдайын бақылау 1 автоматтық бекетте жүргізілді (қосымша1).

Жалпы қала бойынша 6 көрсеткішке дейін анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) азот оксиді; 5) озон; 6) күкірттісуетегі.

5-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

*Kесте-5*

*Анықтайтын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері*

Бекеттің номірі	Сынама Алу мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекеттің мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	әр 20 минут сайын	Үзіліссіз режимде	Алаша Байтақ жырау көшесі, Оралман ауданы	Күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, күкірттісуетегі, диоксид және азот оксиді, озон
2			Қала орталығында Б. Саттарханов даңғылы	көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, озон
3			А. Сандыбай к., 58B	Күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот

## 2025 жылдың наурыз айына Түркістан қаласында атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Түркістан қаласының атмосфералық ауаның ластану деңгейі **жоғары** деп бағаланды, ол **ЕЖК =49%** (жоғары деңгей) азот диоксиді бойынша және **СИ=4,2**(көтерінгі деңгей) күкірт диоксиді бойынша №3 бекет аумағында (А.Сандыбай көш.58В) анықталды.

\*БК деректері бойынша, егер СИ, ЕЖК әртүрлі градацияга түссе, онда атмосфераның ластану деңгейі осы көрсеткіштерідің ең жоғарғы мәні бойынша бағаланады.

Азот диоксидінің орташа концентрациясы – 1,74 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, күкірт диоксиді-2,32 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, озон-1,12 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады.

Азот диоксидінің максималды бір реттік концентрациясы – 1,74 ШЖШ<sub>м.р.</sub>, күкірт диоксиді – 4,24 ШЖШ<sub>м.р.</sub>, көміртегі оксиді – 1,35 ШЖШ<sub>м.р.</sub>, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады (б-кесте).

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 6 –кестеде көрсетілген.


*Кесте-6*

Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең үлкен бір реттік шоғыр		ЕУК	Асу еселігінің саны ШЖШ <sub>м.р.</sub>		
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>о.т.</sub> Асу еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.р.</sub> Асу еселігі		%	>ШЖ III	>5 ШЖШ
Түркістан қаласы								
Азот диоксиді	0,070	1,74	0,349	1,74	16,37	1096	0	0
Күкірт диоксиді	0,116	2,32	2,121	4,24	9,77	436	0	0
Азот оксиді	0,002	0,04	0,027	0,07	0,00	0	0	0
Көміртегі оқиді	0,705	0,23	6,748	1,35	0,01	1	0	0
Озон	0,034	1,12	0,056	0,35	0,00	0	0	0
Күкірттісуге	0,0009		0,007	0,88	0,00	0	0	0

### Қорытынды:

Соңғы бес жылда ауаның ластану деңгейі наурыз айында келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, Түркістан қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі 2021- 2022жж көтеріңкі деп, 2023-2025жж жоғары деп бағаланды.

Ең жоғары қайталану көрсеткішінің артуы негізі азот диоксидінің есебінен байқалды.

#### **4.1 Кентау қаласындағы атмосфералық ауа сапасының мониторингі**

Кентау қаласы аумағында атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1 автоматты станцияда жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы қала бойынша 3 көрсеткішке дейін анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) күкірттісуге.

7-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Кесте 7

*Анықтайтын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері*

Бекеттің номірі	Сынама алу мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекеттің мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
7	әр 20 минут сайын	Үзіліссіз режимде	Уалиханов көшесі, 3 «А» уч.	Көміртегі оксиді, күкірт диоксиді, күкірттісуге

#### **2025 жылдың наурыз айындағы Кентау қаласында атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері.**

Кентау қаласының бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі **төмен** деп бағаланды, ол **СИ =0,6** (төмен деңгей) және **НП =0%** (төмен деңгей) күкірттісуге бойынша анықталды.

Ластаушы заттардың орташа бір реттік концентрациясы ШЖШ-дан аспады. Ластаушы заттардың максималды бір реттік концентрациясы ШЖШ-дан аспады (8-кесте).

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖК астам) және ЭЖЛ (50 ШЖК астам) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асып кетуінің айқындылығы және асып кету жағдайларының саны 8-кестеде көрсетілген.


Кесте 8

## Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең үлкен бір реттік шоғыр		ЕЖК %	Асу еселігінің саны ШЖШ <sub>м.р.</sub>		
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>о.т.</sub> Асу еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.р.</sub> Асу еселігі		>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
				соның ішінде				
<b>Кентау қаласы</b>								
Күкірт диоксиді	0,0020	0,04	0,0073	0,01	0,00	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,2071	0,07	2,0239	0,40	0,00	0	0	0
Күкірттісутегі	0,0009		0,005	0,63	0,00	0	0	0

### Қорытынды:

Соңғы бес жылда ауаның ластану деңгейі наурыз айында келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, Кентау қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі 2021-2022жж және 2024-2025жж төмен деп, 2023ж көтеріңкі деп бағаланды.

### 4.2 2025 жылғы наурыз айындағы Түркістан облысы Састане ауылшындағы атмосфералық ауаның сапасына мониторинг

Жалпы 4 көрсеткіш анықталынады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) озон.

9-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Кесте 9

*Анықтайтын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері*

Бекет номірі	Сынама алу мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекеттің мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	әр 20 минут сайын	Үзіліссіз режимде	Састане а. F. Мұратбаев көш., 1А	көміртегі оксиді, азот диоксиді, күкірттісутегі, озон

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Састөбе ауылының атмосфералық ауаның ластану деңгейі **төмен** деп бағаланды, ол **СИ= 0,5** (төменгі деңгей) және **ЕЖҚ = 0 %** (төменгі деңгей).

Азот диоксидінің орташа концентрациясы - 1,37 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, озон – 1,90 ШЖШ<sub>о.т.</sub> басқа ластаушы заттар ШЖШ - дан аспады.

Ластаушы заттардың максималды бір реттік концентрациясы ШЖШ-дан аспады (10-кесте).

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 10 –кестеде көрсетілген.

*Кесте-10*

Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Коспа	Орташа шоғыр		Ең үлкен бір реттік концентрация		ЕЖҚ %	Асу еселігінің саны ШЖШ <sub>м.р.</sub>			
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>о.т.</sub> Асу еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.р.</sub> Асу еселігі		>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ	
						Соның ішінде			
<b>Састөбе</b>									
Азот диоксиді	0,0010	0,02	0,0108	0,02	0,00	0	0	0	
Күкірт диоксиді	0,6226	0,21	1,7134	0,34	0,00	0	0	0	
Көміртегі оксиді	0,0547	1,37	0,0930	0,47	0,00	0	0	0	
Озон	0,0571	1,90	0,0617	0,39	0,00	0	0	0	

## 5. Түркістан облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторингі

Жер үсті су сапасының жай-күйіне мониторинг 6 су объектілерінде, өзендер: Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Ақсу, Катта-бугун, 11 тұстамасында жүргізілді.

Жер үсті суларын зерттеу кезінде су сынамаларында су сапасының **40** физикалық және химиялық көрсеткіштері анықталады: *көзбен шолып бақылау, су температурасы, ерітілген оттегі, сутегі көрсеткіші, өлишенген заттар, мөлдірлік, тұз құрамының басты иондары, биогенді (азот, фосфор, темір қосылыстары) және органикалық заттар (мұнай өнімдері, фенолдар), ауыр металдар (мыс, мырыш, қорғасын, кадмий, хром, никель, синап), пестицидтер (ДДТ, ДДЕ, ДДТ, ГХЦГ альфа және гамма).*

**Тұптік шөгінділер сапасының мониторингі** Сырдария өзенінің 2 бақылау нүктelerі бойынша жүргізілді. Тұптік шөгінділер сынамасында ауыр металдарға (қорғасын, кадмий, марганец, мыс, мырыш, никель, хром) және органикалық заттарға (мұнай өнімдері) талдау жүргізілді.

## 5.1 Түркістан облысы аумағындағы жер үсті сулар гидрохимиялық көрсеткіштері бойынша сапасының мониторинг нәтижелері.

Қазақстан Республикасының су объектілерінің су сапасын бағалауға арналған негізгі нормативтік құжаттар «Су объектілерінде судың сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі» (бұдан әрі - Бірыңғай жіктеме) болып табылады.

Су объектілерінің су сапасы Бірыңғай жіктеме бойынша келесідей бағаланады:

3 кесте

Су объектісінің атауы	Су сапасының класы		Параметрлер	Өлш. бірл.	Концентрация
	Наурыз 2024 ж	Наурыз 2025 ж			
Сырдария өз.	–	3 класс (аz ластанған)	Сульфаттар	мг/дм <sup>3</sup>	227,3
		ОБТ <sub>5</sub>	мг/дм <sup>3</sup>	2,167	
Келес өз.	–	6 класс (қатты ластанған)	Қалқыма заттар	мг/дм <sup>3</sup>	433,9
Бадам өз.	–	3 класс (аz ластанған)	Сульфаттар	мг/дм <sup>3</sup>	196,91
Арыс өз.	–	3 класс (аz ластанған)	Сульфаттар	мг/дм <sup>3</sup>	172,9
Ақсу өз	–	3 класс (аz ластанған)	Сульфаттар	мг/дм <sup>3</sup>	148,895
Катта-бөген өз.	–	3 класс (аz ластанған)	Сульфаттар	мг/дм <sup>3</sup>	144,09

Ескертпе: \* - I класс – «ең жақсы сапа»

\*\*\*- заттар берілген клас бойынша нормаланбайды

3-кестеден көріп отырғанымыздай Сырдария, Бадам, Арыс, Ақсу және Қатта-бөген өзендері 3-класқа, Келес өзені 6-сыныпқа жатады.

Түркістан облысының су объектілеріндегі негізгі ластаушы заттар сульфаттар, ОБТ<sub>5</sub> және қалқыма заттар болып табылады. Осы көрсеткіштер бойынша сапа нормативтерінің асып кетуі негізінен тұрмыстық, өнеркәсіптік және ауылшаруашылық төгінділеріне тән.

2025 жылғы наурыз айында Түркістан облысының аумағында жоғары және экстремалды жоғары ластану жағдайлары тіркелмеді.

2 Қосымшада тұстамалар шегінде су объектілерінің сапасы бойынша ақпарат.

## 6. Радиациялық жағдай

Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын жергілікті 2 метеорологиялық станцияда (Шымкент, Түркістан) бақылау жүргізілді (14.5-сур.).

Облыстың елді-мекендері бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатындағы радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,08-0,22 мкЗв/сағ аралығында болды. Облыс бойынша радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,15 мкЗв/сағ, яғни шекті жол берілетін шамага сәйкес келеді.


Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің тұсу тығыздығына бақылау Түркістан облысының аумағында 2 метеорологиялық станцияда (Шымкент, Түркістан) аяу сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды (14.5-сур.). Барлық станцияда бес тәуліктік сынама жүргізілді.

Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің тұсу тығыздығы 2,0-3,0  $\text{Бк}/\text{m}^2$  құрады. Облыс бойынша радиоактивті тұсулердің орташа тығыздығы  $2,2 \text{Бк}/\text{m}^2$ , бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.


## Қосымша 1




Сурет 1 - Шымкент қ. атмосфералық ауаның ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы




## Сурет 2 - Шымкент қ. атмосфералық ауаның ластануын бақылаудың экспедициалық жөлісінің орналасу схемасы



Сурет 3 – Қызылсай елді мекенінің атмосфералық ауасының ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы.




Сурет 4 – Түркістан қаласының атмосфералық ауасының ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы.



Сурет 5 - Ластанды бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы Кентаудың қаласының атмосфералық ауасы.



Сурет 6—Састобе елді мекенінің атмосфералық ауасының ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы.



Сурет 4 – Түркістан облысы тұстамалардың орналасу схемасы

## 2 Қосымша

### Түркістан облысы жер үсті су сапасының тұстамалар бойынша ақпараты

Су объектілері тұстамалары	және	Физика-химиялық параметрлердің сипаттамасы
Сырдария өзені		судың температурасы 4,2-12,8°C, сутегі көрсеткіші 7,9-8,0, суда еріген оттегінің концентрациясы 9,1-13,1 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> мәні 2,0-2,3 мг/дм <sup>3</sup> , мөлдірлігі – 16,0-25,0 см, кермектелігі – 7,2-8,6 мг/дм <sup>3</sup>
тұстама - Кекбұлақ а. (бекеттен ССБ қарай 10,5 км)	3 класс	сульфаттар – 201,7 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> – 2,3 мг/дм <sup>3</sup> . ОБТ <sub>5</sub> нақты концентрациясы фондық кластан асады, сульфаттардың нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
тұстама - Шардара т/б (Шардара б. кіре-берісінен 2,0 км төмен)	3 класс	сульфаттар – 230,5 мг/дм <sup>3</sup> . Сульфаттардың нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
тұстама – Азаттық а. (Сырдария өзенінің көпірі -аудандан 5 км)	3 класс	сульфаттар – 249,7 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> – 2,2 мг/дм <sup>3</sup> .
Келес өзені		судың температурасы 2,1-7,1°C, сутегі көрсеткіші 7,8-8,1, суда еріген оттегінің концентрациясы 10,1-11,4 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> мәні 1,0-2,0 мг/дм <sup>3</sup> , мөлдірлігі – 12,0-22,0 см, кермектелігі – 6,2-8,2 мг/дм <sup>3</sup>
тұстама – Казыгурт а. (аудандан 0,2 км жоғары, г/п 0,8 км жоғары)	3 класс	сульфаттар – 211,3 мг/дм <sup>3</sup> . Сульфаттардың нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.

Келес-сағасы (сағасынан 1,2 км жоғары)	6 класс	қалқыма заттар – 841,4 мг/дм <sup>3</sup> . Қалқыма заттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
<b>Бадам өзені</b>		судың температуrasesы 3,8-3,9°C, сутегі көрсеткіші 7,8-7,9, суда еріген оттегінің концентрациясы 12,3-13,1 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> мәні 1,6-1,9 мг/дм <sup>3</sup> , мөлдірлігі – 20,0-22,0 см, кермектелігі – 4,4-7,2 мг/дм <sup>3</sup>
тұстама - Шымкент гидро бекеті (Шымкентен 2,0 км төмен)	3 класс	сульфаттар – 201,7 мг/дм <sup>3</sup> . Сульфаттардың нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
тұстама - Қараспан а. (жол көпірінен 0,1 км төмен)	3 класс	сульфаттар – 192,12 мг/дм <sup>3</sup> . Сульфаттардың нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
<b>Арыс өзені</b>		судың температуrasesы 4,3°C, сутегі көрсеткіші 7,7, суда еріген оттегінің концентрациясы – 13,1 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> – 1,0 мг/дм <sup>3</sup> , мөлдірлігі – 23,0 см, кермектелігі – 7,8 мг/дм <sup>3</sup>
тұстама – Арыс к. (жд станция)	3 класс	сульфаттар – 172,9 мг/дм <sup>3</sup> . Сульфаттардың нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
<b>Ақсу өзені</b>		судың температуrasesы 1,8-9,1°C, сутегі көрсеткіші 7,7, суда еріген оттегінің концентрациясы 8,1-9,1 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> – 1,3-1,5 мг/дм <sup>3</sup> , мөлдірлігі – 25,0 см, кермектелігі – 3,2-4,8 мг/дм <sup>3</sup>
тұстама - Сарқырама а. (ауылдан онтүстік-батысқа қарай, сағадан қаш. 52 км)	3 класс	сульфаттар – 153,7 мг/дм <sup>3</sup> . Сульфаттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
тұстама - Көлкент а. (ауылдан солтүстікке қарай 1,5-2 км, су бекетінен 10 м төмен)	3 класс	сульфаттар – 144,09 мг/дм <sup>3</sup> . Сульфаттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
<b>Катта-бөгөн өзені</b>		судың температуrasesы 7,2°C, сутегі көрсеткіші 7,9, суда еріген оттегінің концентрациясы – 9,8 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> 2,0 мг/дм <sup>3</sup> , мөлдірлігі – 25,0 см, кермектелігі – 5,8 мг/дм <sup>3</sup>
тұстама - Жарықбас а. (ауылдан 1,5 км жоғары)	3 класс	сульфаттар – 144,09 мг/дм <sup>3</sup> . Сульфаттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.

Ескерте: \* - I класс – «ең жақсы сапа»

\*\*\*- заттар берілген класс бойынша нормаланбайды

### 3 Қосымша

#### Анықтамалық бөлім

#### Елді мекендердің ауасындағы ластаушы заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясы (ШЖШ)

Қоспалардың атауы	ШЖШ мәні, мг/м <sup>3</sup>		Қауіп сыйныбы
	Максимальды бір реттік	Орташа тәуліктік	
Азот диоксиді	0,2	0,04	2
Азотоксиді	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/a/пирен	-	0,1 мкг/100 м <sup>3</sup>	1
Қалқыма заттар (частицы)	0,5	0,15	3
Қалқыма бөлшектер PM 10	0,3	0,06	
Қалқыма бөлшектер PM 2,5	0,16	0,035	
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Мыс	-	0,002	2

Күшән	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Қорғасын	0,001	0,0003	1
Күкірт диоксиді	0,5	0,05	3
Күкірт қышқылы	0,3	0,1	2
Күкірттісүтек	0,008	-	2
Көміртегі оксиді	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Қалалық және ауылдық жерлердегі атмосфералық ауаның гигиеналық стандарты» (СанПин №ҚР ДСМ-70 2тамыз 2022 жылдан бастап)

### Атмосфераның ластану индексінің дәрежесін бағалау

Градация	Ауаның ластануы	Көрсеткіштер	Ай сайынғы бағалау
I	Төменгі	СИ ЕЖК, %	0-1 0
II	Көтеріңкі	СИ ЕЖК, %	2-4 1-19
III	Жоғары	СИ ЕЖК, %	5-10 20-49
IV	Өте жоғары	СИ ЕЖК, %	>10 >50

РД 52.04.667–2005, Мемлекеттік органдарды, халықты және халықты ақпараттандыру үшін қалалардағы ауаның ластану жағдайы туралы құжаттар. Әзірлеуге, құрылышқа, презентацияға және мазмұнға қойылатын жалпы талаптар.

### Радиациялық қауіпсіздік стандарты\*

Стандартталған мәндер	Мөлшер шектері
Тиімді мәндер	Халық
	Кез-келген 5 жыл ішінде орта есеппен жылына 1мЗв, бірақ жылына 5мЗв аспайды.

\*«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитарлық – эпидемиологиялық талаптар»

### Су пайдалану санаттары (түрлері) бойынша су пайдалану сыныптарын саралау

Суды пайдалану	Тазалау	Су пайдалану кластары
----------------	---------	-----------------------

класы	мақсаты/түрі	1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс	6 класс
Су экожүйелерінің қызметі	-	+	+	-	-	-	-
Балық өсіру/ихтиофаунаны көрғау	Албырт балық	+	+	-	-	-	-
	Тұқы балық	+	+	+	-	-	-
Ауыз су-шаруашылық сүмен жабдықтау және тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарын сүмен жабдықтау	Қарапайым өндіріс	+	+	-	-	-	-
	Дағдылы өндіріс	+	+	+	-	-	-
	Қарқынды өндіріс	+	+	+	-	-	-
Мәдени-тұрмыстық су пайдалану	Туризм, спорт, демалыс, шомылу	+	+	+	-	-	-
Суару	Дайындықсыз	+	+	+	+	-	-
	Тұндыру карталарын пайдалану кезінде	+	+	+	+	+	-
Өнеркәсіптік су пайдалану	Технологиялық процестер, салындару процесстері	+	+	+	+	+	-
Гидроэнергетика	-	+	+	+	+	+	+
Су көлігі	-	+	+	+	+	+	+
Тау-кен өндірісі	-	+	+	+	+	+	+

Ескертпе:

"+" – судың сапасы мақсатын қамтамасыз етеді;

"-" – судың сапасы мақсатын қамтамасыз етпейді.

Су объектілеріндегі су сапасын жіктеудің бірынғай жүйесі (АШМ СРК 20.03.2024 ж. №70 Бұйрығы

#### Қосымша 4

#### Зиянды микроорганизмдердің, топырақты ластайтын басқа да биологиялық және зиянды заттардың берілетін шекті шоғырлану нормативтері

№№ п/п	Заттыңатаяуы	Шектірүқсатетілген концентрация (бұданәрі - ШРК), топырактағы килограмғамыллиграмм	Шектеушікөрсеткіш	Ескертпе
Химиялық заттар				
1	Марганец	1500	жалпысанитарлық	
2	Мыс	3,0 (жылжымалынысан)	жалпысанитарлық	Мыстыңжылжымалыформасы РН 4,8 ацетатты аммоний буферліктеріндісімен алдынарады.
3	Мышьяк	2,0 (жалпықұрамы)	транслокациялық	ШРК фонды ескереотырыпберілген.
4	Никель	4,0 (жылжымалынысан)	жалпысанитарлық	Никельдіңжылжымалыформасы РН 4,6 ацетатты аммоний буферліктеріндісімен алдынарады.
5	Сынап	2,1 (жалпымазмұны)	транслокациялық	ШРК фонды ескереотырыпберілген

6	Корғасын	32,0 (жалпықұрамы)	жалпысанитарлық	ШРК фонды ескереотырышберілген
7	Корғасын + сынап	20,0 + 1,0 (жалпықұрамы)	транслокациялық	
8	Хром	6,0 (жылжымалынысан)	жалпысанитарлық	ШРК фонды ескереотырышберілген. Хромныңқозгалмалыформасы РН 4,8 ацетатты аммоний буферлікерітіндісіменалынады.
9	Хром <sup>+6</sup>	0,05	жалпысанитарлық	
10	Мырыш	23,0 (жылжымалынысан)	транслокациялық	Мырыштыңжылжымалыформасы РН 4,8 ацетатты-аммоний буферліктерітіндісіменалынады

**ТАБИГИ ОРТАНЫҚ ЛАСТАНУ МОНИТОРИНГІ ЗЕРТХАНАСЫ  
"ҚАЗГИДРОМЕТ" РМК ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ**

**МЕКЕН-ЖАЙЫ:  
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ  
ЖЫЛҚЫШИЕВ КӨШЕСІ, 44  
ТЕЛ. 8-(7252)-54-05-33  
E MAIL: [LMZPS\\_UKO@METEO.KZ](mailto:LMZPS_UKO@METEO.KZ)**