

**Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Филиал РГП «Казгидромет» по Атырауской области**



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Март 2025 год

г.Атырау, 2025 г

	СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
	Предисловие	3
1	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
2	Состояние качества атмосферного воздуха в г. Атырау	4
2.1	Состояние качества атмосферного воздуха в г. Кульсары	7
2.2	Состояние качества атмосферного воздуха в п. Макат	8
2.3	Состояние качества атмосферного воздуха в п. Индерборский	19
2.4	Состояние качества атмосферного воздуха в с. Жанбай	10
2.5	Состояние качества атмосферного воздуха в с. Ганюшкино	11
3	Состояние качества поверхностных вод	12
4	Химический состав атмосферных осадков	14
5	Радиационная обстановка	15
	Приложение 1	16
	Приложение 2	22
	Приложение 3	24
	Приложение 4	25

Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Атырауской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

Оценка качества атмосферного воздуха в Атырауской области

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

По сообщениям Департамента экологии Атырауской области основными источниками загрязнения в г. Атырау являются объекты нефтепереработки, транспортировки:

«Атырауский нефтеперерабатывающий завод», ТОО «Тенгизшевройл», компания «НОРТ КАСПИАН ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ Н.В.», АО «АТЫРАУСКИЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ, АО «Эмбаунайгаз», ТОО «WEST DALA» «ВЕСТ ДАЛА». Кроме того, в городе имеется два пруда-накопителя производственных сбросов, расположенных с обеих подветриваемых сторон города (северо-западная сторона - пруд-накопитель «Квадрат» и восточная сторона – «Тухлая балка»). Все городские сбросы в накопитель осуществляются практически без очистки, в итоге формируется основной источник сероводорода – накопитель в 1000 гектаров, в котором идут процессы гниения органических веществ – канализационных стоков, в том числе нефтепродуктов.

В Атырауской области имеется 74 предприятий первой категории.

Город Атырау, город Кульсары и Макатский район полностью снабжены природным газом.

Согласно данным АПФ АО «КазТрансгазАймак» автономных котельных по городу Атырау – 80 030 ед., по Макатскому району – 1783 ед.

2. Мониторинг качества атмосферного воздуха

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Атырау проводятся на 6 постах наблюдения, в том числе на 2 постах ручного отбора проб и на 4 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется по 16 показателям: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3) взвешенные частицы РМ-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) аммиак; 9) сероводород; 10) озон; 11) фенол; 12) формальдегид; 13) бензол; 14) толуол; 15) этилбензол; 16) ортоксилол (C₂H₆).

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	3 раза в сутки	ручной отбор проб (дискретные методы)	мкр Самал, ул. А. Кекильбаева15	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, фенол, аммиак, формальдегид, бензол, толуол, этилбензол, ортоксилол (C ₂ H ₆)

5			мкр Курсай, ул. Карабау строение 12	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота сероводород, фенол, аммиак, формальдегид
6			мкр Жулдыз, 6-я улица, 29	озон (приземный)
8	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	в непрерывном режиме	район Сырдарья 3	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода, диоксид и оксид азота, аммиак
9			мкр. Береке, район промзоны Береке	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10
11			с. Дамба, на территории рыбной инспекции	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород.
12			мкр. Акшагала, улица 2, дом 1а	
15			ул. Ауэзова, 28А, на территории стадиона "Мунайшы"	
17			мкр. Самал улица 7, на территории д. 42	

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Атырау за март 2025 года.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **«очень высокое»** он определялся значением СИ=11,1 (очень высокий уровень) по диоксиду азота в районе поста №12 и НП равным 69% (очень высокий уровень) по диоксиду азота в районе поста №12.

Максимально-разовые концентрации составили: диоксида азота-11,1 ПДК_{м.р.}, оксида углерода-8,4 ПДК_{м.р.}, фенола-1,7 ПДК_{м.р.}, сероводорода-1,7 ПДК_{м.р.}, взвешенные частицы (пыль)-1,0 ПДК_{м.р.}, взвешенные частицы РМ-2,5-1,0 ПДК_{м.р.}, по другим показателям превышений ПДК не наблюдалось.

Средние концентрации составили: диоксида азота – 5,18 ПДК_{с.с.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

С 2 марта по 3 марта 2025 года по данным компактной станции ПНЗ №12 «Акшагала», расположенного в городе Атырау, по диоксиду азота было зафиксировано 19 случаев высокого загрязнения (ВЗ) в пределах 10.1 - 11.1 ПДК_{м.р.}.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.


Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимально-разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
г. Атырау								
Взвешенные частицы (пыль)	0,05	0,34	0,5	1,0	3,0	3		
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0212	0,60	0,1626	1,0	0,0	1		
Взвешенные частицы РМ-10	0,0184	0,31	0,1713	0,6	0,0			
Диоксид серы	0,010	0,19	0,2190	0,4	0,0			
Оксид углерода	0,12	0,04	42,01	8,4	0,3	8	2	
Диоксид азота	0,21	5,18	2,22	11,11	68,7	4882	693	19
Оксид азота	0,0134	0,22	0,07	0,2	0,0			
Озон	0,0036	0,12	0,0086	0,1	0,0			
Сероводород	0,0031		0,0135	1,7	3,0	1961		
Фенол	0,003	0,95	0,017	1,7	0,0	1		
Аммиак	0,006	0,15	0,0360	0,2	0,0			
Формальдегид	0,003	0,27	0,004	0,1	0,0			
Бензол	0,000	0,00	0,000	0,0	0,0			
Толуол	0,000		0,000	0,0	0,0			
Этилбензол	0,000	0,00	0,000	0,0	0,0			
Ортоксилол (C ₂ H ₆)	0,000		0,000	0,0	0,0			

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения атмосферного воздуха в марте г. Атырау за последние пять лет с 2022 года по 2024 год загрязнения воздуха оценивался на «повышенном» уровне, а в 2021, 2025 годах состояние атмосферного воздуха находился на «очень высоком» уровне.

Количество превышений максимально-разовых ПДК было по диоксиду азота (5594 случаев), сероводороду (1961 случай), взвешенным частицам (пыль) (3 случаев), взвешенным частицам (PM-2,5) (1 случай), оксиду углерода (10 случаев) фенолу (1 случай).

Метеорологические условия

Погодные условия г. Атырау формировались под чередующимся влиянием полей повышенного атмосферного давления и циклонических воздействий. С прохождением фронтальных разделов прошли осадки, на севере, юге сильные дожди, наблюдалась туман, низовая метель, усиливался ветер в начале третьей и в конце декады на 15-18 м/с. В середине второй и третьей декады ожидался слабый ветер 0-5 м/с в связи с этим, *ожидались* неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха по г. Атырау.

2.1 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Кульсары.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Кульсары проводятся на стационарном посту наблюдения (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 8 показателей: 1) *взвешенные частицы (пыль)*; 2) *диоксид серы*; 3) *оксид углерода*; 4) *диоксид азота*; 5) *оксид азота*; 6) *озон*; 7) *сероводорода*.

В таблице 3 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 3

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
7	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	ул. Махамбет Утемисова, 37 А	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон (приземный), сероводород.
19			г. Кульсары район Промзоны НГДУ	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Кульсары за март 2025 года.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **высокое**, он определялся значением СИ=6,1 (высокий уровень) по оксиду азота и НП=5% (повышенный уровень) по диоксиду азота.

Максимально-разовые концентрации составили: диоксида азота-6,1 ПДК_{м.р.}, по другим показателям превышений ПДК не наблюдалось.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 4.


Таблица 4

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
г. Кульсары								
Взвешенные частицы (пыль)	0,0000	0,00	0,0000	0,000				
Диоксид серы	0,0018	0,04	0,1180	0,236				
Оксид углерода	0,1186	0,04	1,7189	0,344				
Диоксид азота	0,0280	0,70	1,2171	6,086	5,1	114	3	
Оксид азота	0,0049	0,08	0,0926	0,232				
Озон	0,0008	0,03	0,0011	0,01				
Сероводород	0,0005		0,0029	0,36				

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения атмосферного воздуха в марте города Кульсары за последние пять лет в 2021, 2023 годах оценивался на «низком» уровне, в 2022 и 2025 годах загрязнения атмосферного воздуха находился на «высоком» уровне, а в 2024 году загрязнения воздуха оценивался как «повышенный».

2.2 Мониторинг качества атмосферного воздуха в районе Макат.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Макатского района проводится на 1 компактной станции наблюдения (Приложение 1).

В целом по району Макат определяется до 3 показателей: 1) диоксид серы;

2) диоксид азота; 3) оксид углерода.

В таблице 5 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 5

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	Макацкий район, п.Макад ул.Алаш 23, дом культуры.	диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п. Макад за март 2025 года.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенное**, он определялся значением **СИ** равным 3,1 (повышенный уровень) по оксиду углерода **НП**=0% (низкий уровень).

Максимально-разовые концентрации составили: оксида углерода -3,1 ПДК_{м.р.}, по другим показателям превышений ПДК не наблюдалось.

Средние концентрации диоксида азота составила – 2,47 ПДК_{с.с.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 6.

Таблица 6

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимально-разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
район Макад								
Диоксид серы	0,0010	0,02	0,0093	0,0				
Оксид углерода	0,2203	0,07	15,7076	3,1	0,1	2		
Диоксид азота	0,0987	2,47	0,1448	0,7				

2.3 Мониторинг качества атмосферного воздуха в Индерском районе.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Индерского района проводится на 1 компактной станции наблюдения (Приложение 1).

В целом по району Индер определяется до 4 показателей: 1) диоксид серы; 2) диоксид азота; 3) сероводород; 4) оксид углерода.

В таблице 7 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 7

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	пос. Индерборский, ул. Н.Мендигалиев а д. 47.	диоксид серы, диоксид азота, сероводород, оксид углерода.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п. Индерборский за март 2025 года.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенное**, он определялся значением **СИ=1,1** (низкий уровень) по диоксиду азота и **НП=1%** (повышенный уровень).

Максимально-разовые концентрации составили: диоксида серы- 1,1 ПДК_{м.р.}, диоксида азота-1,1 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Средние концентрации составили: диоксида азота – 2,98 ПДК_{с.с.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 8.

Таблица 8

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимально-разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м³	Кратно сть ПДК _{с.с.}	мг/м³	Кратно сть ПДК _{м.р.}		>ПД К	>5 ПД К	>10 ПД К
район Индер								
Диоксид серы	0,0085	0,17	0,5404	1,1	0,0	1		
Оксид углерода	0,0420	0,01	2,2276	0,4				
Диоксид азота	0,1193	2,98	0,2204	1,1	0,8	17		
Сероводород	0,0010		0,0010	0,1				

2.4 Мониторинг качества атмосферного воздуха в селе Жанбай.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории с.Жанбайпроводится на 1 компактной станции наблюдения (Приложение 1).

В целом в селе Жанбай определяется до 4 показателей: 1) диоксид серы; 2) диоксид азота; 3) сероводород; 4) оксид углерода.

В таблице 9 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 9

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси				
Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	с.Жанбай, ул.Т. Нысанов уч 96	диоксид серы, диоксид азота, сероводород, оксид углерода.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в с. Жанбай за март 2025 года.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **очень высокое**, он определялся значением СИ равным 1,3 (низкий уровень) и НП=66% (очень высокий уровень) по диоксиду азота.

Максимально-разовые концентрации составили: диоксида азота – 1,3 ПДК_{м.р.}. По другим показателям превышений ПДК не наблюдалось.

Средние концентрации составили: диоксида азота – 5,06 ПДК_{с.с.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 10.

Таблица 10

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимально-разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
село Жанбай								
Диоксид серы	0,0012	0,02	0,0380	0,1				
Оксид углерода	0,3197	0,11	0,9475	0,2				
Диоксид азота	0,2024	5,06	0,2615	1,3	66,3	1480		
Сероводород	0,0010		0,0010	0,1				

2.5 Мониторинг качества атмосферного воздуха в с. Ганюшкино.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории п. Ганюшкино проводится на 1 компактной станции наблюдения (Приложение 1).

В целом в поселке Ганюшкино определяется до 4 показателей: 1) диоксид серы; 2) диоксид азота; 3) сероводород; 4) оксид углерода.

В таблице 11 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 11

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	с.Курмангазы, «ДК им.С.Кушекбаева».	диоксид серы, диоксид азота, сероводород, оксид углерода.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в с. Ганюшкино за март 2025 года.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **высокое**, он определялся значением **СИ** равным 1,4 (низкий уровень) по диоксиду азота и **НП=24%** (высокий уровень).

Максимально-разовые концентрации составили: диоксида азота-1,4 ПДК_{м.р.}, по другим показателям превышений ПДК не наблюдалось.

Средние концентрации составила: диоксида азота – 4,47 ПДК_{с.с.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 12

Таблица 12

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимально-разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10ПДК
пос. Ганюшкино								
Диоксид серы	0,0010	0,02	0,0051	0,0				
Оксид углерода	0,0084	0,00	0,8839	0,2				
Диоксид азота	0,1788	4,47	0,2869	1,4	23,7	528		
Сероводород	0,0010		0,0010	0,1				

3. Мониторинг качества поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Атырауской области проводились на 20 створах на 5 водных объектах (реки Жайык, Кигаш, проток Шаронова, протоки Перетаска и Яик).

Мониторинг качества морской воды проводится на следующих 22 прибрежных точках Северного Каспийского моря: морской судоходный канал (2), взморье р. Жайык (5), взморье р. Волга (5), станции острова залива Шалыги (5), п.Жанбай (5).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 43 гидрохимических показателей качества: *визуальные наблюдения, температура, взвешенные вещества, прозрачность, цветность, водородный показатель (pH), растворенный кислород, БПК₅, ХПК, сухой остаток, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы, пестициды.*

Мониторинг за состоянием качества поверхностных и морских вод **по гидробиологическим показателям** на территории Атырауской области за отчетный период проводился на 3 водных объектах (рек Жайык, Кигаш и в протоке Шаронова) на 5 створах. Было проанализировано 5 проб на определение острой токсичности исследуемой воды на тестируемый объект.

3.1 Результаты мониторинга качества поверхностных по гидрохимическим показателям вод на территории Атырауской области

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах».

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 13

Наименование водного объекта	Класс качества воды		Параметры	ед. изм.	концентрация
	Март 2024 г.	Март 2025г.			
р. Жайык	-	3 класс (умеренно загрязненные)	БПК ₅	мг/дм ³	2,3
			Магний	мг/дм ³	43,9
			Нефтепродукты	мг/дм ³	0,084
пр.Перетаска	-	3 класс (умеренно загрязненные)	БПК ₅	мг/дм ³	2,39
			Магний	мг/дм ³	40,2
			Нефтепродукты	мг/дм ³	0,096
пр.Яик	-	3 класс (умеренно загрязненные)	БПК ₅	мг/дм ³	2,3
			ХПК	мг/дм ³	16,0
			Магний	мг/дм ³	41,9
			Нефтепродукты	мг/дм ³	0,08
р.Кигаш	-	3 класс (умеренно загрязненные)	ХПК	мг/дм ³	18
			Магний	мг/дм ³	22,6
			Нефтепродукты	мг/дм ³	0,081
пр.Шаронова	-	3 класс (умеренно загрязненные)	ХПК	мг/дм ³	16,4
			Магний	мг/дм ³	22,1
			Нефтепродукты	мг/дм ³	0,062

* Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №70 от 20.03.2024).

За март 2025 года реки Жайык, Кигаш, протоки Перетаска, Яик и Шаронова относятся к 3 классу.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах по Атырауской области является магний, БПК₅, ХПК и нефтепродукты.

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения

За март 2025 года на территории Атырауской области ВЗ и ЭВЗ не обнаружены.

Информация по качеству водных объектов по гидрохимическим показателям в разрезе створов указана в Приложении 1.

Информация по качеству водных объектов по токсикологическим показателям в разрезе створов указана в Приложении 2.

3.2. Результаты мониторинга качества поверхностных вод по гидробиологическим (токсикологическим) показателям на территории Атырауской области

Река Жайык. По данным биотестирования тест-параметр по реке Жайык был предоставлен в последовательном расположении точек наблюдения: поселок Дамба – 0%, г. Атырау 0,5 км ниже сброса КГП «Атырау су арнасы» – 0%, п. Индер в створе водопоста – 0%. Полученные данные показывает отсутствие токсического влияния исследуемой воды на тест-объект.

Проток Шаронова. В процессе определения острой токсичности воды на тест-объект процент погибших дафний по отношению к контролю (тест-параметр) в протоке 0%. Токсического влияния на тест-объект не обнаружено.

Река Кигаш. Данные полученные в ходе биотестирования по реке Кигаш показали отсутствие токсического влияния на тест-объект. Число выживших дафний в исследуемой воде составило 100%. Тест-параметр составил 0%.

Биотестирование (определение острой токсичности воды) на территории Атырауской области проводятся на 3 водных объектах (реки Жайык, Кигаш, проток Шаронова).

Качество поверхностных вод по токсикологическим показателям на реках Жайык, Кигаш, пр. Шаронова не оказывали острого токсического действия на живые организмы. Тест-параметр в створах реки Жайык был равен в пределах 0%, в реках Кигаш был равен -0%, в пр. Шаронова -0%.

Информация по качеству водных объектов по токсикологическим показателям в разрезе створов указана в Приложении 3.

4. Химический состав атмосферных осадков на территории Атырауской области

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 4 метеостанции (Атырау, Ганюшкино, Пешной, Кульсары) (приложение 1).

Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).

В пробах осадков преобладало содержание сульфатов 2,32%, хлоридов 12,89%, гидрокарбонатов 62,77%, ионов магния 5,59%, ионов кальция 16,44%.


Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Кульсары – 87,69 мг/л, наименьшая на МС Атырау – 49,4 мг/л.

Кислотность выпавших осадков находится в пределах от 6,9 (МС Кульсары) до 7,15 (МС Атырау).


5. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары).

Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы в области находились в пределах 0,08-0,17 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,11 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах. Мониторинг за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на метеорологической станции Атырау, путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На станции проводился пятисуточный отбор проб. Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы г. Атырау колебалась в пределах 1,6-2,2 Бк/м². Средняя величина плотности выпадений составила 1,9 Бк/м², что не превышает предельно-допустимый уровень.




Карта расположения стационарной и передвижной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Атырау




Карта расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Кульсары




Карта расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха
Макатского района




Карта расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха
Индерского района



Карта расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха село
Жанбай



Карта расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха пос.
Ганюшкино



Расположения метеостанций за наблюдением атмосферных осадков и снежного покрова на территории Атырауской области.



Расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территории Атырауской области

**Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха
г. Атырау за март 2025 года.**

Было зафиксировано в городе Атырау 22 случая ВЗ (по данным постов Филиала и компаний NCOC)

Высокое загрязнение - г. Атырау										
При месь	День. Месяц, Год	Время	Номер поста	Концентрация		Ветер		Темпе ратура, °С	Атмо сферное давление	Причины от КЭРК
				мг/м ³	Кратнос ть превыш ения ПДК	Направ ление, град	Скорость, м/с			
Диоксид азота	02.03. 2025	22:20	ПНЗ №12 мкр. Акшагала, улица 2, дом 1а	2.0314	10.1	19 С, СВ	1.15	-12	770.4	
		22:40		2.0314	10.1	19 С, СВ	1.15	-12	770.6	
		23:00		2.0314	10.1	19 С, СВ	1.15	-13	770.7	
		23:20		2.036	10.1	19 С, СВ	1.15	-13	770.9	
Диоксид азота	03.03. 2025	01:00	ПНЗ №12 мкр. Акшагала, улица 2, дом 1а	2.0792	10.3	39 С, СВ	1.11	-14	771.8	
		01:20		2.2203	11.1	39 С, СВ	1.11	-15	771.7	
		01:40		2.2213	11.1	41 С, СВ	1.11	-15	771.7	
		02:00		2.2213	11.1	41 С, СВ	1.45	-15	771.7	
		02:20		2.157	10.1	18 С, СВ	1.34	-15	771.4	
		02:40		2.157	10.1	18 С, СВ	1.34	-15	771.4	
		03:00		2.157	10.1	18 С, СВ	1.34	-15	771.4	
		03:20		2.157	10.1	75	1.1	-15	771.5	

						В, СВ				
		03:40		2.1153	10.5	75 В, СВ	1.1	-16	771.8	
		04:00		2.0322	10.1	75 В, СВ	1.1	-16	771.8	
		04:20		2.0322	10.1	75 В, СВ	1.1	-16	771.8	
		04:40		2.0322	10.1	76 В, СВ	1.13	-16	771.8	
		05:00		2.0322	10.1	76 В, СВ	1.02	-16	771.8	
		05:20		2.0732	10.3	115 В	1.02	-16	771.9	
		05:40		2.0732	10.3	115 В	1.02	-16	771.9	
Серо- водород	03.03. 2025	10:40	№ 112 Акимат (ул. Сатпаева, центральный мост)	0.0809	10.1	136 ЮВ	1.48	-13	771.6	
Серо- водород	19.03. 2025	05:00	№ 111 Жилгородок (ул. Заполярная, дом Нефтяников)	0,0919	11,5	186,12 Ю	1,5	8,3	755,05	
		05:20	№ 112 Акимат (ул. Сатпаева, центральный мост)	0,0857	10,7	317,72 СЗ	1,9	8,7	758,32	

**Информация о качестве поверхностных вод
Атырауской области по створам за март 2025г.**

Водный объект и створ	Характеристика физико-химических параметров	
река Жайык	температура воды отмечена в пределах 4-4,1°C, водородный показатель 7,15-7,42, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,08-10,7 мг/дм ³ , БПК ₅ – 2,2-2,46 мг/дм ³ , прозрачность – 19 см, жесткость – 3,46-5,7 мг/дм ³	
п.Индер, в створе водпоста	3 класс	БПК ₅ – 2,35 мг/дм ³ ХПК – 16,5 мг/дм ³ Магний – 38,1 мг/дм ³ Нефтепродукты – 0,071 мг/дм ³ Фактическая концентрация БПК ₅ , ХПК, магния и нефтепродуктов превышает фоновый класс.
АО «Казтрансойл» НПС Индер 0,5 км выше реки Жайык	3 класс	БПК ₅ – 2,24 мг/дм ³ Магний – 38,6 мг/дм ³ Нефтепродукты – 0,079 мг/дм ³
АО «Казтрансойл» НПС Индер 0,5 км ниже реки Жайык	3 класс	БПК ₅ – 2,38 мг/дм ³ ХПК – 16,1 мг/дм ³ Магний – 37,7 мг/дм ³ Нефтепродукты – 0,077 мг/дм ³
с.Береке 0,5 км выше р.Жайык	3 класс	БПК ₅ – 2,44 мг/дм ³ ХПК – 17,1 мг/дм ³ Магний – 38,9 мг/дм ³ Нефтепродукты – 0,09 мг/дм ³
с.Береке 0,5 км ниже р.Жайык	3 класс	БПК ₅ – 2,46 мг/дм ³ ХПК – 15,5 мг/дм ³ Магний – 39,1 мг/дм ³ Нефтепродукты – 0,087 мг/дм ³
1 км выше г.Атырау	3 класс	БПК ₅ – 2,25 мг/дм ³ ХПК – 18,7 мг/дм ³ Магний – 54,2 мг/дм ³ Нефтепродукты – 0,095 мг/дм ³
г.Атырау, 0,5 км выше сброса КГП «Атырау су арнасы»	3 класс	БПК ₅ – 2,2 мг/дм ³ Магний – 42,5 мг/дм ³ Нефтепродукты – 0,098 мг/дм ³
г.Атырау, 0,5 км ниже сброса КГП «Атырау су арнасы»	3 класс	БПК ₅ – 2,23 мг/дм ³ Магний – 46,9 мг/дм ³ Нефтепродукты – 0,097 мг/дм ³
1 км ниже г.Атырау	3 класс	БПК ₅ – 2,36 мг/дм ³ ХПК – 17,4 мг/дм ³ Магний – 58,1 мг/дм ³ Нефтепродукты – 0,086 мг/дм ³
3 км ниже сброса РГКП «Урало- Атырауский осетровый завод» район Курилкино	3 класс	БПК ₅ – 2,42 мг/дм ³ Магний – 44,5 мг/дм ³ Нефтепродукты – 0,079 мг/дм ³
0,5 км выше сброса РГКП «Урало-Атырауский осетровый завод» район Курилкино	3 класс	БПК ₅ – 2,38 мг/дм ³ Магний – 49,1 мг/дм ³ Нефтепродукты – 0,081 мг/дм ³
пос.Дамба	3 класс	БПК ₅ – 2,22 мг/дм ³ ХПК – 15,5 мг/дм ³ Магний – 39,6 мг/дм ³

		Нефтепродукты – 0,065 мг/дм ³ Фактическая концентрация БПК ₅ , ХПК, магния и нефтепродуктов превышает фоновый класс.
проток Перетаска	температура воды отмечена в пределах 4-11,8°С, водородный показатель 7,25-7,3, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,75-9,4 мг/дм ³ , БПК ₅ – 2,35-2,42 мг/дм ³ , прозрачность – 19 см, жесткость – 3,6-4 мг/дм ³	
г.Атырау 0,5 км ниже ответвления протока Перетаска	3 класс	БПК ₅ – 2,35 мг/дм ³ Магний – 44,2 мг/дм ³ Нефтепродукты – 0,092 мг/дм ³
г.Атырау 2 км выше сброса АО «Атырауский ТЭЦ»	3 класс	БПК ₅ – 2,42 мг/дм ³ Магний – 36,9 мг/дм ³ Нефтепродукты – 0,097 мг/дм ³
г.Атырау 2 км ниже сброса АО «Атырауский ТЭЦ»	3 класс	БПК ₅ – 2,4 мг/дм ³ ХПК – 17,4 мг/дм ³ Магний – 39,4 мг/дм ³ Нефтепродукты – 0,098 мг/дм ³
проток Яик	температура воды отмечена в пределах 4°С, водородный показатель 7,36-7,4, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,75-9,4 мг/дм ³ , БПК ₅ – 2,3-2,36 мг/дм ³ , прозрачность – 19 см, жесткость – 3,86-4,3 мг/дм ³	
с.Ракуша, 0,5 км ниже ответвления протока Яик	3 класс	БПК ₅ – 2,36 мг/дм ³ Магний – 40,3 мг/дм ³ Нефтепродукты – 0,08 мг/дм ³
п.Еркинкала, 0,5 км выше сброса РГКП «Атырауский осетровый рыбоводный завод»	3 класс	БПК ₅ – 2,35 мг/дм ³ ХПК – 18,2 мг/дм ³ Магний – 40,3 мг/дм ³ Нефтепродукты – 0,08 мг/дм ³
п.Еркинкала, 0,5 км ниже сброса РГКП «Атырауский осетровый рыбоводный завод»	3 класс	БПК ₅ – 2,3 мг/дм ³ ХПК – 16,3 мг/дм ³ Магний – 45,2 мг/дм ³ Нефтепродукты – 0,08 мг/дм ³
проток Шаронова	температура воды отмечена на уровне 3°С, водородный показатель 7,84, растворенного в воде кислорода – 7,46 мг/дм ³ , БПК ₅ – 2,1 мг/дм ³ , прозрачность – 19см, жесткость – 3,5 мг/дм ³	
с.Ганюшкино, в створе водпоста	3 класс	ХПК – 16,4 мг/дм ³ магний – 22,1 мг/дм ³ нефтепродукты – 0,062 мг/дм ³ . Фактическая концентрация ХПК, магния и нефтепродуктов превышает фоновый класс.
река Кигаш	температура воды отмечена на уровне 3°С, водородный показатель 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,13 мг/дм ³ , БПК ₅ – 2,1 мг/дм ³ , прозрачность – 21см, цветность – 19,8 градусов, жесткость – 3,76 мг/дм ³	
с.Котяевка, в створе водпоста	3 класс	ХПК – 18 мг/дм ³ магний – 22,6 мг/дм ³ нефтепродукты – 0,081 мг/дм ³ Фактическая концентрация ХПК, магния и нефтепродуктов превышает фоновый класс.

**Состояние качества поверхностных вод
по гидробиологическим показателям**

№	Водный объект	Пункт контроля	Пункт привязки	Биотестирование	
				Тест параметр, %	Оценка воды
1	Река Жайык	пос. Дамба		0%	Не оказывает токсического действия
		г. Атырау	0.5 км ниже сброса КГП «Атырау су арнасы»	0%	
		п. Индер	в створе водпоста	0%.	
2	Проток Шаронова	с. Ганюшкино	в створе водпоста	0%	
3	Река Кигаш	с. Котяевка	в створе водпоста	0%.	

Приложение 4

Справочный раздел Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м ³		Класс опасности
	максимально разовая	средне-суточная	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м ³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	
Хлористый водород	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фтористый водород	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах»
(СанПин №КР ДСМ-70 от 2 августа 2022 года)

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение атмосферного воздуха	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, %	0-1 0
II	Повышенное	СИ НП, %	2-4 1-19
III	Высокое	СИ НП, %	5-10 20-49
IV	Очень высокое	СИ НП, %	>10 >50

РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке построению, изложению и содержанию

**ФИЛИАЛ РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
АДРЕС:
ГОРОД АТЫРАУ
УЛ. ТАЛГАТА БИГЕЛЬДИНОВА 10А
ТЕЛ. 8-(7122)-52-20-96**

Е MAIL: INFO_ATR@METEO.KZ