Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Республиканское Государственное Предприятие «Казгидромет» Филиал по Актюбинской области



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Октябрь 2025 год

| | СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
|-----|---|------|
| | Предисловие | 3 |
| 1 | Основные источники загрязнения атмосферного воздуха | 4 |
| 2 | Состояние качества атмосферного воздуха в г. Актобе | 4 |
| 2.1 | Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений г. Актобе | 6 |
| 2.2 | Состояние качества атмосферного воздуха в г. Хромтау | 6 |
| 2.3 | Состояние качества атмосферного воздуха в г. Кандыагаш | 7 |
| 2.4 | Состояние качества атмосферного воздуха в п. Шубарши | 8 |
| 2.5 | Состояние качества атмосферного воздуха в п. Кенкияк | 9 |
| 3 | Состояние качества поверхностных вод | 11 |
| 4 | Радиационная обстановка | 13 |
| 5 | Химический состав атмосферных осадков | 13 |
| 6 | Состояние загрязнения почв тяжелыми металлами | 14 |
| | Приложение 1 | 15 |
| | Приложение 2 | 18 |
| | Приложение 3 | 21 |
| | Приложение 4 | 22 |

Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых Филиалом РГП «Казгидромет» по Актюбинской области.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Актюбинской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

Оценка качества атмосферного воздуха

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Загрязнение воздушного бассейна области обусловлено в основном предприятиями: «СНПС-Актобемунайгаз», крупными AO TOO «КазахойлАктобе», Актюбинский завод ферросплавов и ДГОК филиалы АО «ТНК «Казхром», АО «Интергаз Центральная Азия», УМГ «Актобе», АО «Актобе ТЭЦ». Из общего объема выбросов от стационарных источников доля выбросов от сжигания попутного газа на факелах составляет 11,67 тыс. тонн 97% всех выбросов от факельных установок приходятся на 3 нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия: AO «СНПС-Актобемунайгаз», TOO «КазахойлАктобе» и ТОО «Аман Мунай».

Кроме этого, одними из основных загрязнителей атмосферного воздуха Актюбинской области являются выхлопные газы от передвижных источников.

2. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Актобе.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Актобе проводятся на 6 постах наблюдения, в том числе на 3 постах ручного отбора проб и на 3 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 14 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3) взвешенные частицы РМ-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) сероводород; 9) формальдегид; 10) хром; 11) бензол; 12) этилбензол; 13) толуол; 14) ортоксилол.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1 Место расположения постов наблюлений и определяемые примеси

| № | Отбор проб | Адрес поста | Определяемые примеси |
|---|-------------------------|--|---|
| 1 | | Авиагородок 14, район аэропорта | |
| 2 | ручной отбор проб | ул. Белинский 5, район Жилгородка | взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, формальдегид, хром, сероводород, |
| 3 | | ул. Ломоносова 7, район ЖД вокзала | бензол, этилбензол, толуол, ортоксилол. |
| 4 | В | ул. Рыскулова 4, район Шанхай | оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород |
| 5 | непрерывном режиме – | ул. Есет батыра 109 | оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород |
| 6 | каждые 20 минут | ул. Жанкожа батыра 89, район Курмыш | взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода |

Помимо стационарных постов наблюдений в городе Актобе действует передвижная лаборатория, с помощью которой измерение качества воздуха

проводится дополнительно по 3 точкам города по 7 показателям: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота; 6) сероводород; 7) формальдегид.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Актобе за октябрь 2025 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением СИ=3,9 (повышенный уровень) и **НП=6%** (повышенный уровень) по диоксиду азота в районе поста №2.

В загрязнение атмосферного воздуха основной вклад вносит сероводород (количество превышений ПДК за месяц: 3 случая), диоксид азота (количество превышений ПДК за месяц: 143 случая), оксид углерода (количество превышений ПДК за месяц: 4 случая)

Максимально-разовая концентрация сероводорода составила 3,9 ПДК_{м.р.}, диоксид азота – 1,7 ПДК_{м.р.}, оксид углерода – 1,3 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточная концентрация диоксида азота – 1,3 ПДКс.с.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.

Таблица 2 **Характеристика загрязнения атмосферного воздуха**

| | Средняя концентрация | | Максимально- разовая концентрация | | НΠ | Число случаев превышения ПДК _{м.р.} | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|------|--|---------------------|-------------------|
| Примесь | мг/м ³ | Кратно сть ПДКс.с. | мг/м ³ | Кратнос ть ПДК _{м.р.} | % | >ПДК | >5 ПДК втомчи | >10 ПДК сле |
| | | г. Ак | тобе | | | | | |
| Взвешенные частицы (пыль) | 0,0012 | 0,0078 | 0,1000 | 0,2000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Взвешенные частицы РМ-2,5 | 0,0013 | 0,0383 | 0,0015 | 0,0094 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Взвешенные частицы РМ-10 | 0,0015 | 0,0245 | 0,0015 | 0,0050 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Диоксид серы | 0,0025 | 0,0497 | 0,0050 | 0,0100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Оксид углерода | 0,6613 | 0,2204 | 6,5594 | 1,3119 | 0,06 | 4 | 0 | 0 |
| Диоксид азота | 0,0522 | 1,3059 | 0,3355 | 1,6775 | 3,03 | 143 | 0 | 0 |
| Оксид азота | 0,0265 | 0,4420 | 0,3515 | 0,8788 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Сероводород | 0,0003 | | 0,0311 | 3,8875 | 0,06 | 3 | 0 | 0 |
| Формальдегид | 0,0030 | 0,2970 | 0,0050 | 0,1000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Хром (+6) | 0,0003 | 0,2259 | 0,0006 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Бензол | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Этилбензол | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Толуол | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ортоксилол | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

2.1. Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений г. Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха города Актобе ведутся с помощью передвижной лаборатории на 3 точках: $mочка N 21 - n. Kupnuчный, район СШ N 218; <math>mочка N 2 - n. Achый, 41 \ pasьesd, возле школы-гимназии N 241; <math>moчка N 23 - Bamыc 2, paйон СШ N 264.$

На передвижной лаборатории определяются **7 показателей**: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) сероводород; 3) формальдегид; 4) оксид азота; 5) диоксид серы; 6) диоксид азота; 7) оксид углерода. (Таблица 3).

 Таблица 3

 Результаты экспедиционных измерений качества атмосферного воздуха

| | п. Кирп | ичный | | |
|---------------------------|--------------------|--------|--|--|
| Определяемые примеси | Точка №1 | | | |
| | MIT/M ³ | пдк | | |
| Взвешенные частицы (пыль) | 0,0084 | 0,0280 | | |
| Сероводород | 0,0044 | 0,5500 | | |
| Формальдегид | 0,0054 | 0,1080 | | |
| Оксид азота | 0,0061 | 0,0153 | | |
| Диоксид серы | 0,0054 | 0,0108 | | |
| Диоксид азота | 0,0043 | 0,0215 | | |
| Оксид углерода | 5,4815 | 1,0963 | | |

Максимально-разовая концентрация оксида углерода -1,1 ПДКм.р., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

2.2 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Хромтау.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Хромтау проводятся на 1 посту наблюдения.

В целом по городу определяется до 4 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) сероводород.

В таблице 4 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 4 Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

| № Отбор проб | Адрес поста | Определяемые примеси |
|--|----------------|--|
| в непрерывном режиме – каждые 20 минут | Ул. Горького 9 | диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород |

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г.Хромтау за октябрь 2025 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **низкий**, он определялся значением $\mathbf{C}\mathbf{H}=\mathbf{1,7}$ (низкий уровень) по оксиду углерода и $\mathbf{H}\Pi=0\%$ (низкий уровень).

Максимально-разовая концентрация сероводорода — 1,6 ПДК $_{\text{м.р.}}$, оксида углерода — 1,7 ПДК $_{\text{м.р.}}$, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 5.

Таблица 5

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

| жарактеристика загрязнения атмосферного воздуха | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------------------------|--|------|------|-----------|------------|---|--|
| | _ | едняя нтрация | Максимально- разовая концентрация | | | | | | сло случа евышени ПДК _{м.р.} | |
| Примесь | MΓ/M ³ | Кратность ПДКс.с. | MΓ/M ³ | _{мг/м³} Кратность ПДК _{м.р.} | | >пдк | >5 ПДК | >10 ПДК | | |
| | | | 11 | | | | втом чис. | пе | | |
| | | | г. Хромтау | | | | | | | |
| Диоксид серы | 0,0038 | 0,0765 | 0,3867 | 0,7734 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| Оксид углерода | 0,0779 | 0,0260 | 8,4357 | 1,6871 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | | |
| Диоксид азота | 0,0010 | 0,0250 | 0,0010 | 0,0050 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| Сероводород | 0,0010 | | 0,0131 | 1,6375 | 0,09 | 2 | 0 | 0 | | |

2.3 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Кандыагаш.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Кандыагаш проводятся на 1 посту наблюдения.

По городу определяется 4 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) сероводород.

В таблице 6 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

 Таблица 6

 Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

| Ŋ | Отбор проб | Определяемые примеси | |
|---|--|----------------------|--|
| | в непрерывном режиме – каждые 20 минут | Ул. Жабаева 64А | диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород |

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г.Кандыагаш за октябрь 2025 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **низкий**, он определялся значением **СИ=1,3** (низкий уровень) по сероводороду и НП=0% (низкий уровень).

Максимально-разовая концентрация сероводорода — 1,3 $\Pi \coprod K_{\text{м.р.}}$, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали $\Pi \coprod K$.

Среднесуточная концентрация диоксида азота – 1,8 ПДКс.с.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 7.

Таблица 7

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

| | - | Средняя концентрация | | лально- овая трация | ΗП | П Число случаев превышения ПДК _{м.р.} | | |
|----------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------|--|-----------|------------|
| Примесь | мг/м ³ | Кратность ПДК _{с.с.} | мг/м ³ | Кратно сть ПДК _{м.р.} | % | >пдк | >5 ПДК | >10 ПДК |
| | | г.Кандь | іагаш | 11/-ДТСМ.р. | | F | втом чи(| |
| Диоксид серы | 0,0104 | 0,2076 | 0,4094 | 0,8188 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Оксид углерода | 0,0176 | 0,0059 | 2,1547 | 0,4309 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Диоксид азота | 0,0734 | 1,8347 | 0,1717 | 0,8585 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Сероводород | 0,0018 | | 0,0106 | 1,3250 | 0,45 | 10 | 0 | 0 |

2.4 Мониторинг качества атмосферного воздуха в п. Шубарши

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории п. Шубаршы проводятся на 1 посту наблюдения.

На точке наблюдения определяется 4 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) сероводород.

В таблице 8 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 8 Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

| N | отбор проб | Адрес поста | Определяемые примеси |
|---|--|---------------|--|
| | в непрерывном режиме – каждые 20 минут | ул.Геолог 25Д | диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород |

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п.Шубарши за октябрь 2025 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **высокий** он определялся значением **СИ**=6,8 (высокий уровень) по сероводороду и НП=11% (повышенный уровень).

Максимально-разовая концентрация диоксида серы — 5,3 ПДК $_{\text{м.р.}}$, сероводорода — 6,8 ПДК $_{\text{м.р.}}$, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточная концентрация диоксида серы – 2,1 ПДКс.с.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 9.

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Таблица 9

| | _ | цняя трация | Максимально- разовая концентрация | | разовая | | разовая | | НΠ | пре | ло случ евышен ПДК _{м.р.} | ия |
|----------------|-------------------|----------------------|---|----------------------------------|---------|------|-----------|------------|----|-----|--|----|
| Примесь | мг/м ³ | Кратность ПДКс.с. | мг/м ³ | Кратность ПДК _{м.р.} | % | >пдк | >5 ПДК | >10 ПДК | | | | |
| | | | | | | | втом чис. | пе | | | | |
| | | | п.Шубар | ши | | | | | | | | |
| Диоксид серы | 0,1034 | 2,07 | 2,6424 | 5,28 | 4,48 | 100 | 1 | 0 | | | | |
| Оксид углерода | 0,0244 | 0,01 | 2,2420 | 0,45 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Диоксид азота | 0,0147 | 0,37 | 0,1706 | 0,85 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Сероводород | 0,0032 | | 0,0542 | 6,78 | 11,38 | 254 | 3 | 0 | | | | |

2.5 Мониторинг качества атмосферного воздуха в п.Кенкияк

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории п.Кенкияк проводятся на 1 посту наблюдения.

На точке наблюдения определяется 3 показателя: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота.

В таблице 10 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 10 *Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси*

| J | νō | Отбор проб | Адрес поста | Определяемые примеси |
|---|----|--|-------------------------|--|
| | | в непрерывном режиме – каждые 20 минут | ул. Алтынсарина 11 Б | диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота. |

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п.Кенкияк за октябрь 2025 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как низкий, он определялся значением СИ=1,3 (низкий уровень) по диоксиду азота и НП=0% (низкий уровень).

Максимально-разовая концентрация диоксида азота – 1,3 Π Д $K_{M,p,}$ концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточная концентрация диоксида азота – 1,6 ПДКс.с.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 11.

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Таблица 11

| | _ | дняя трация | Максимально- НП разовая концентрация | | | сло случ евышен ПДК _{м.р} | КИН | |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----|--|-----------|------------|
| Примесь | мг/м ³ | / | | Кратность ПДК _{м.р.} | % | >пдк | >5 ПДК | >10 ПДК |
| | | | | | | | втомчи | сле |
| | | | п.Кенки | як | | | | |
| Диоксид серы | 0,0037 | 0,0738 | 0,3307 | 0,6614 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Оксид углерода | 0,2756 | 0,0919 | 1,4228 | 0,2846 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Диоксид азота | 0,0642 | 1,6044 | 0,2551 | 1,2755 | 0,3 | 6 | 0 | 0 |

Выводы:





Как видно из графика, за октябрь 2021-2025 гг. наблюдался повышенный уровень загрязнения, Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит сероводород.

Метеоусловия

Большую часть октября область находилась под влиянием антициклона, погода носила устойчивый характер. В первой декаде на большей части территории наблюдалась ясная и маловетреная погода. Ночные температуры достигали -2...-7 °C, возможны слабые заморозки в отдельных районах, дневные температуры составляли +15...+20 °C. Осадков не наблюдалось, преобладала антициклональная сухая погода.

Во второй декаде по области прошли дожди, связанные с прохождением атмосферных фронтов, наблюдались порывы юго-восточного ветра 15-20 м/c, дневные температуры составляли $+15...+20 \, ^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады сохранялась антициклональная устойчивая погода. Во второй половине декады по области прошли дожди, порывы юго-восточного ветра достигали 15 м/с. 31 октября на юге области наблюдалась гроза. Средняя температура месяца близка к климатической норме, осадки распределялись неравномерно.

3. Мониторинг качества поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Актюбинской области проводились на **19** створах **12** водных объектов (реки Елек, Каргалы, Эмба, Темир, Орь, Актасты, Косестек, Ойыл, Улькен Кобда, Кара Кобда, Ыргыз, озеро Шалкар).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 42 физико-химических показателей качества: *температура*, взвешенные вещества, прозрачность, водородный показатель (pH), растворенный кислород, БПК $_5$, ХПК, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы.

Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Актюбинской области

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 3

| наименование | класс качества воды | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| водного объекта | октябрь 2024 год | октябрь 2025 год | параметры | единица измерения | концентрац ия |
| река Елек | - | 4 класс (загрязнен ные) | фенолы | мг/л | 0,0011 |
| река Каргалы | - | 4 класс (загрязнен | взвешенн ые | мг/л | 13,27 |

| | | ные) | вещества | | |
|-------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------------|--------|
| | | , | фенолы | мг/л | 0,0012 |
| | | | ХПК | мг/л | 19,005 |
| | | 3 класс | магний | мг/л | 26,5 |
| река Эмба | _ | (умеренно | сульфаты | мг/л | 144 |
| pena omoa | | загрязненн ые) | аммоний- ион | мг/л | 0,9 |
| | | | медь | мг/л | 0,0035 |
| | | | ХПК | мг/л | 18,23 |
| | | 3 класс | магний | мг/л | 30 |
| _ | | (умеренно | сульфаты | мг/л | 134 |
| река Темир | - | загрязненн | аммоний- | | |
| | | ые) | ион | мг/л | 0,78 |
| | | , | медь | мг/л | 0,0035 |
| | | | ХПК | мг/л | 18,12 |
| | | | взвешенн | | 10,12 |
| | | | ые | мг/л | 16,01 |
| | | 3 класс | вещества | 1121791 | 10,01 |
| | | (умеренно | магний | мг/л | 34 |
| река Орь | - | загрязненн | сульфаты | мг/л | 144 |
| | | ые) | аммоний- | | |
| | | , | ИОН | мг/л | 0,81 |
| | | | медь | мг/л | 0,004 |
| | | | хром (6+) | мг/л | 0,029 |
| | | 4 класс | взвешенн | | |
| река | - | (загрязнен | ые | $_{ m M\Gamma}/_{ m J}$ | 12,83 |
| Актасты | | ные) | вещества | | |
| | - | , | фенолы | мг/л | 0,0014 |
| река | | 4 класс | взвешенн | | , |
| Косестек | | (загрязнен | ые | мг/л | 12,2 |
| | | ные) | вещества | 1011 / 51 | 12,2 |
| | | | ХПК | мг/л | 17,61 |
| | | 3 класс | магний | мг/л | 33 |
| | | (умеренно | сульфаты | мг/л | 134 |
| река Ойыл | - | загрязненн | аммоний- | | |
| | | ые) | ион | мг/л | 0,67 |
| | | ŕ | медь | мг/л | 0,005 |
| | | | ХПК | мг/л | 18,13 |
| | | 3 класс | магний | мг/л | 33 |
| река Улькен Кобда | | (умеренно | сульфаты | мг/л | 115 |
| | _ | загрязненн | аммоний- | / | 0.01 |
| | | ые) | ион | мг/л | 0,81 |
| | | | медь | мг/л | 0,003 |
| | | | ХПК | мг/л | 18,93 |
| река Кара Кобда | - | 3 класс | магний | мг/л | 24 |
| | | (умеренно | сульфаты | мг/л | 144 |
| | | загрязненн | аммоний- | мг/л | 0,64 |
| | | ые) | ион | | · |
| | | | медь | мг/л | 0,003 |

| | | | ХПК | мг/л | 18,84 |
|--------------|----|----------------------|----------|----------|-------|
| река Ыргыз - | | 3 класс (умеренно | магний | мг/л | 29 |
| | _ | | сульфаты | мг/л | 144 |
| | | загрязненн | аммоний- | мг/л | 0,79 |
| | ые | ые) | ИОН | M11 / J1 | 0,79 |
| | | | медь | мг/л | 0,004 |

За октябрь 2025 года реки Эмба, Темир, Орь, Ойыл, Улькен Кобда, Кара Кобда, Ыргыз относятся к 3 классу, реки Елек, Каргалы, Актасты, Косестек относятся к 4 классу.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах Актюбинской области являются ХПК, магний, сульфаты, аммоний-ион, медь, хром (6^+) , взвешенные вещества, фенолы, хлориды.

За октябрь 2025 года на территории Актюбинской области случаев ВЗ не обнаружено.

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

4. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма-излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7 метеорологических станциях (Актобе, Караул-Кельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабулак).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы в Актюбинской области находились в пределах 0,05–0,18 мкЗв/ч (норматив—до 5 мкЗв/ч). В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,11 мкЗв/ч.

Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области проводилась на метеостанциях Актобе, Караул-Кельды, Шалкар путем пятисуточного отбора проб воздуха горизонтальными планшетами.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы Актюбинской области колебалась в пределах 1,2-2,2 Бк/м². Средняя величина плотности выпадений составила 1,7 Бк/м², что не превышает предельнодопустимый уровень.

5. Химический состав атмосферных осадков на территории Актюбинской области

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 6 метеостанциях (Актобе, Аяккум, Жагабулак, Мугоджарская, Новороссийское, Шалкар). Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ, в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).

В пробах осадков преобладало содержание сульфатов 13,41%, гидрокарбонатов 44,30%, хлоридов 10,10%, ионов кальция 13,75%, ионов натрия

6,40%, ионов магния 3,70% и ионов калия 2,77%.

Наибольшая общая минерализация отмечена на MC Аяккум — 119,30 мг/л, наименьшая — 19,47 мг/л на MC Жагабулак.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась в пределах от 34,3 мкСм/см (МС Жагабулак) до 181,7 мкСм/см (МС Аяккум).

Кислотность выпавших осадков находится в пределах от 6,13 (МС Жагабулак) до 7,79 (МС Аяккум).

6. Состояние загрязнения почв тяжелыми металлами по Актюбинской области за октябрь (осенний период) 2025г

За октябрь месяц в городе Актобе в пробах почв содержание цинка находилось в пределах 1,4 - 2,3 мг/кг, меди - 0,21 - 0,34 мг/кг, хрома - 0,06 - 0,13 мг/кг, свинца - 0,13 - 0,2 мг/кг, кадмия - 0,05 - 0,1 мг/кг.

В пробах почвы отобранных в Актюбинской области на территории школы № 16, ул. Тургенева, район авиагородка, район Железнодорожного вокзала, район завода АЗФ содержание цинка, меди (предельно допустимой концентрации) не превышает значения - ПДК. Хром - 0,010 - 0,021 ПДК, свинец - 0,004 - 0,006 ПДК.

Все определяемые тяжелые металлы находились в пределах нормы.

Приложение 1



Карта мест расположения постов наблюдения и метеостанции г. Актобе




Карта места расположения точки отбора п. Кирпичный, район СШ №18



Карта места расположения точки отбора п. Ясный, район школы-гимназии №41



Карта места расположения точки отбора на Батыс-2, район СШ №64



Карта места расположения поста наблюдения г. Хромтау



Карта места расположения поста наблюдения г. Кандыагаш



Карта места расположения поста наблюдения п. Шубарши



Карта места расположения поста наблюдения п. Кенкияк

Информация о качества поверхностных вод Актюбинской области по створам

| водный объект и створ | характеристика физико-химических параметров | | | |
|--|--|--|--|--|
| река Елек | Температура воды водородный пока растворенного в вод | отмечена в пределах $5.7 - 9.5$ °C, затель $7.8 - 8.4$, концентрация е кислорода $6.77 - 7.64$ мг/дм ³ , БПК ₅ 1.01 ачность 21 см, запах 0 баллов во всех | | |
| 0,3 км выше города Алга, 1 км выше шламовых прудов Актюбинского хим. завода | 4 класс | Фенолы – 0,0012 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов не превышает фоновый класс. | | |
| 15 км ниже города Алга, 0,5 км ниже выхода подземных вод | 3 класс | $X\Pi K - 17,83 \text{ мг/дм}^3.$ $Mагний - 33 \text{ мг/дм}^3.$ $Cульфаты - 158 \text{ мг/дм}^3.$ $Aммоний - ион - 1,02 \text{ мг/дм}^3.$ $Mедь - 0,002 \text{ мг/дм}^3.$ $Φактическая концентрация X\Pi K, магний, аммоний-ион, медь и сульфатов не превышает фоновый класс.$ | | |
| 0,5 км выше города Актобе, 8,0 км выше Новороссийского моста, 11,2 км выше впадения р.Карагалы | 4 класс | Взвешенные вещества — 11,28 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенные вещества превышает фоновый класс. | | |
| 4,5 км ниже города Актобе, 1,5 км ниже внадеше р. Дженишке 0,5 км выше выхода подземных вод | 4 класс | Взвешенные вещества — 11,23 мг/дм ³ . Аммоний-ион — 1,15 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенные вещества не превышает фоновый класс. Фактическая концентрация аммоний-иона превышает фоновый класс. | | |
| 20 км ниже города Актобе, 2,0 км ниже с. Георгиевка, 0,5 км ниже выхода подземных вод. | 4 класс | Хром (6^+) – 0.052 мг/дм ³ . Фенолы – 0.0013 мг/дм ³ . Фактические концентрации хрома (6^+) , фенолов не превышают фоновый класс. | | |
| 1,0 км на юго-восток п.Целинный, на левом берегу р. Елек. | 3 класс | $X\Pi K - 19,12 \text{ мг/дм}^3.$ Магний $- 35 \text{ мг/дм}^3.$ Сульфаты $- 144 \text{ мг/дм}^3.$ Аммоний-ион $- 0,88 \text{ мг/дм}^3.$ Медь $- 0,002 \text{ мг/дм}^3.$ Хром $(6^+) - 0,038 \text{ мг/дм}^3.$ Фактические концентрации магния, аммоний-иона, меди, хрома (6^+) не превышает фоновый класс. Фактическая концентрация $X\Pi K$, сульфатов превышает фоновый класс. | | |
| река Каргалы | Температура воды отмечена 7° С, водородный показатель $8,3$ концентрация растворенного в воде кислорода $7,41$ мг/дм ³ БПК ₅ $1,08$ мг/дм ³ , запах -0 балл. | | | |
| п. Каргалинский, в западной части поселка в 1 км ниже | 4 класс | Взвешенные вещества — 13,27 мг/дм 3 . Фенолы — 0,0012 мг/дм 3 . | | |

| впадения правого притока р. Бутак: | T | Фактическая концентрация взвещенных веществ превышает фоновый класс. Фактическая концентрация фенолов не превышает фоновый класс | | |
|------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| река Эмба | показатель 7,8 – 8,0 | Гемпература воды отмечена $9.8-10.3$ °C, водородный показатель $7.8-8.0$ мг/дм ³ , концентрация растворенного в воде кислорода $7.2-13$ мг/дм ³ , БПК ₅ $1.07-1.1$ мг/дм ³ , запах | | |
| 270 6 1.0 | O Oalliob BO BCEX CIB | | | |
| п. Жагабулак, 1,0 км на | | $X\Pi K - 19,1 \text{ мг/дм}^3.$ | | |
| северо-запад отп. Жагабулак | | Магний — 24 мг/дм ³ . | | |
| | | Сульфаты – 144 мг/дм ³ . | | |
| | | Аммоний-ион солевой -0.94 мг/дм^3 . | | |
| | 3 класс | $Mедь - 0.003 \text{ мг/дм}^3.$ | | |
| | 6 101000 | Фактические концентрации ХПК, | | |
| | | магния, аммоний-иона, меди не | | |
| | | превышают фоновый класс. | | |
| | | Фактические концентрации сульфатов | | |
| | | превышают фоновый класс. | | |
| п. Сага, 1,0 км к юго-западу | | $X\Pi K - 18,91 \text{ мг/дм}^3.$ | | |
| от поселка | | Магний — 29 мг/дм^3 . | | |
| | | Сульфаты -144 мг/дм 3 . | | |
| | | Аммоний солевой -0.86 мг/дм^3 . | | |
| | 3 класс | $Mедь - 0.004 \text{ мг/дм}^3.$ | | |
| | | Фактические концентрации ХПК, | | |
| | | магния, аммоний-иона, меди не | | |
| | | превышают фоновый класс. | | |
| | | Фактические концентрации сульфатов | | |
| | | превышают фоновый класс. | | |
| | Температура воды | отмечена в пределах 9 °C, водородный | | |
| река Темир | показатель 7,7 – 7 | ,9, концентрация растворенного в воде | | |
| | кислорода 7,76 – 12, | 9 мг/дм 3 , БПК $_5$ 1,02 $-$ 1,03 мг/дм 3 , запах $-$ | | |
| | 0 баллов во всех ств | opax. | | |
| | | $X\Pi K - 18,12 \text{ мг/дм}^3.$ | | |
| | | Магний -32 мг/дм^3 . | | |
| | | Сульфаты — 134 мг/дм^3 . | | |
| с.Покровское, вс. | | Аммоний-ион -0.88 мг/дм^3 . | | |
| Покровское, в 400 м ниже | 3 класс | $Mедь - 0.004 \text{ мг/дм}^3.$ | | |
| впадения левого притока р. | 3 KJIACC | Фактические концентрации ХПК, | | |
| Чилисай | | аммоний-иона, меди не превышают | | |
| | | фоновый класс. | | |
| | | Фактические концентрации магния, | | |
| | | сульфатов превышают фоновый класс. | | |
| | | $X\Pi K - 18,34 \text{ мг/дм}^3.$ | | |
| | | Взвешенные вещества – 14,63 мг/дм ³ . | | |
| | | Магний -28 мг/дм 3 . | | |
| с. Ленинское, в 9 км ниже | | Сульфаты -134 мг/дм 3 . | | |
| селения, в 2 км ниже устья | 2 | Аммоний-ион -0.68 мг/дм^3 . | | |
| левобережного притока р. | 3 класс | Медь -0.003 мг/дм^3 . | | |
| Кульден-Темир | | Фактические концентрации ХПК, | | |
| • | | магния, аммоний-иона, меди не | | |
| | | превышают фоновый класс. | | |
| | | Фактические концентрации взвешенных | | |
| | | | | |

| | | веществ и сульфатов превышают фоновый класс. | |
|--|--|--|--|
| | | 7,6 °C, водородный показатель – 7,6, | |
| река Орь | концентрация растворенного в воде кислорода $13,7$ мг/дм ³ , БПК ₅ $1,17$ мг/дм ³ , прозрачность 21 см, запах 0 балл. | | |
| с. Бугетсай, 0,3 км ниже села, | | $X\Pi K - 18,12 \text{ мг/дм}^3.$ | |
| 0,2 км ниже впадения р. Богетсай | | Взвешенные вещества $-16,01$ мг/дм ³ . Магний -34 мг/дм ³ . | |
| Borcican | | C ульфаты — 144 мг/дм 3 . | |
| | | Аммоний-ион -0.81 мг/дм 3 . | |
| | | Медь -0.004 мг/дм^3 . | |
| | 3 класс | Хром $(6^+) - 0.029 \text{ мг/дм}^3$. Фактические концентрации ХПК, | |
| | | Фактические концентрации XПК, взвешенных веществ, аммоний-иона, | |
| | | меди, хрома (6^+) не превышают | |
| | | фоновый класс. | |
| | | Фактические концентрации магния, | |
| | Температура воли с | сульфатов превышают фоновый класс. отмечена 6,6 °C, водородный показатель – | |
| река Косестек | | растворенного в воде кислорода – 7,39, | |
| P | $Б\Pi K_5 - 1,10 \text{ мг/дм}^3,$ | | |
| п. Кос-Естек, в юго-западной | | Фенолы -0.0014 мг/дм^3 . | |
| части села примерно в 1 км | | Взвешенные вещества — $12,2 \text{ мг/дм}^3$. | |
| выше устья левого притока | 4 класс | Фактические концентрации фенолов и | |
| без названия, в 2 км ниже слияния рек Тарангул и | | взвешенных веществ не превышают фоновый класс. | |
| Айтпайка | | 40.022m m.m. | |
| | 1 01 | тмечена 6,0 °C, водородный показатель – | |
| река Актасты | | растворенного в воде кислорода $-7,60$ мг/дм 3 , запах 0 балл. | |
| п. Белогорка, на | | Взвешенные вещества – 12,83 мг/дм ³ . | |
| северовосточной окраине | 4 | Фактическая концентрация взвешенных | |
| поселка, в 9 км ниже слияния притоков Тересбутак и | 4 класс | веществ не превышает фоновый класс. | |
| Теренсай, составляющих | | | |
| Актасты | | | |
| | | отмечена 14 °C, водородный показатель – | |
| река Ойыл | | растворенного в воде кислорода $-7,41$ мг/дм ³ , запах 0 балл. | |
| п. Уил, на северо-восточной | М17ДМ°, D11 K 5 — 1,14 | мг/дм ⁻ , запах о балл. ХПК – 17,61 мг/дм ³ . | |
| окраине поселка в 92 м выше | | Магний — 33 мг/дм ³ . | |
| автодорожного мост | 3 класс | Сульфаты — 134 мг/дм^3 . | |
| | | Аммоний-ион -0.67 мг/дм^3 . | |
| | | Медь -0.005 мг/дм^3 . | |
| | | Фактические концентрации XПК, магния, аммоний-иона, меди не | |
| | | превышают фоновый класс. | |
| | | Фактические концентрации сульфатов | |
| | T. | превышают фоновый класс. | |
| река Улькен Кобда | концентрация раств | 10,8 °C, водородный показатель 7,8, оренного в воде кислорода 7,66 мг/дм 3 , розрачность 21 см, запах 0 балл. | |

| п. Кобда, 1 км к юго-востоку | | $X\Pi K - 18,13 \text{ мг/дм}^3.$ |
|------------------------------|--|---|
| от окраины с. | | Магний - 33 мг/дм 3 . |
| Новоалексеевка, в 400 м ниже | 3 класс | Аммоний-ион -0.81 мг/дм ³ . |
| железобетонного | | Сульфаты – 115 мг/дм^3 . |
| автодорожного моста | | $Mедь - 0.003 \text{ мг/дм}^3$ |
| - | | Фактические концентрации ХПК, |
| | | аммоний-иона, меди не превышают |
| | | фоновый класс. |
| | | Фактические концентрации сульфатов и |
| | | магния превышают фоновый класс. |
| | | 10 °C, водородный показатель – 7,4, |
| река Кара Кобда | | оренного в воде кислорода $-7,39$ мг/дм ³ , |
| | БПК ₅ $- 1,06$ мг/дм ³ , | запах 0 балл. |
| | | |
| п. Альпасай, 360 м к востоку | | $X\Pi K - 18,93 \text{ мг/дм}^3.$ |
| от поселка Альпасай и в 18 | 3 класс | Магний — 24 мг/дм^3 . |
| км от слияния с рекой Сары - | | Сульфаты — 144 мг/дм^3 . |
| Хобда | | Аммоний солевой -0.64 мг/дм^3 . |
| | | Медь – 0.003 мг/дм^3 . |
| | | Фактические концентрации ХПК, |
| | | магний, аммоний солевой, медь не |
| | | превышают фоновый класс. |
| | | Фактические концентрации сульфаты |
| | T | превышают фоновый класс. |
| | | 15 °C, водородный показатель 7,9, |
| река Ыргыз | | оренного в воде кислорода 12,4 мг/дм ³ , |
| ш с | БПК ₅ 1,84 мг/дм ³ , за | |
| с. Шенбертал, в 8 км от | | $X\Pi K - 18,84 \text{ мг/дм}^3$. |
| селения и в 1,2 км от | 2 2000000 | Магний — 29 мг/дм ³ . |
| железобетонного моста | 3 класс | Сульфаты — 144 мг/дм^3 . |
| | | Аммоний солевой -0.79 мг/дм^3 . |
| | | Медь -0.004 мг/дм^3 . Фактические концентрации ХПК, |
| | | . 1 |
| | | магний, аммоний солевой, медь не превышают фоновый класс. |
| | | превышают фоновый класс. Фактические концентрации сульфаты |
| | | превышают фоновый класс. |
| | | превышают фоновый класс. |

Приложение 3

Результаты качества поверхностных вод озер на территории Актюбинской области

| Nº | наименование ингредиентов | единицы измерения | октябрь 2025 год озеро Шалкар |
|----|------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1 | Визуальные наблюдения | | |
| 2 | Температура | °C | 10 |

| 3 | Водородный показатель | | 8,0 |
|----|-----------------------|--------------------|-------|
| 4 | Растворенный кислород | $M\Gamma/дM^3$ | 7,41 |
| 5 | Запах воды | балл | 0 |
| 6 | $Б\Pi K_5$ | мг/дм ³ | 1,10 |
| 7 | ХПК | $M\Gamma/дM^3$ | 19,10 |
| 8 | Взвешенные вещества | $M\Gamma/дM^3$ | 12,13 |
| 9 | Гидрокарбонаты | мг/дм ³ | 183 |
| 10 | Жесткость | мг-экв. | 6,3 |
| 11 | Минерализация | $M\Gamma/дM^3$ | 606 |
| 12 | Натрий + калий | мг/дм ³ | 65 |
| 13 | Сухой остаток | мг/дм ³ | 900 |
| 14 | Кальций | мг/дм ³ | 84 |
| 15 | Магний | $M\Gamma/дM^3$ | 25 |
| 16 | Сульфаты | $M\Gamma/дM^3$ | 139 |
| 17 | Хлориды | мг/дм ³ | 110 |
| 18 | Фосфат | мг/дм ³ | 0,028 |
| 19 | Фосфор общий | $M\Gamma/дM^3$ | 0,030 |
| 20 | Азот нитритный | мг/дм ³ | 0,006 |
| 21 | Азот нитратный | мг/дм ³ | 0,009 |
| 22 | Железо общее | $M\Gamma/дM^3$ | 0,020 |
| 23 | Аммоний солевой | мг/дм ³ | 1,06 |
| 24 | Свинец | мг/дм ³ | 0,001 |
| 25 | Медь | мг/дм ³ | 0,002 |
| 26 | Цинк | мг/дм ³ | 0,005 |
| 27 | АПАВ /СПАВ | мг/дм ³ | 0,009 |
| 28 | Фенолы | мг/дм ³ | 0,001 |
| 29 | Нефтепродукты | мг/дм ³ | 0,01 |

Приложение 4

Справочный раздел

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществв воздухе населенных мест

| воздухе населенных мест | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|--|--|
| Наименование | Значения П | Класс | | | |
| примесей | максимально разовая | средне- суточная | опасности | | |
| Азота диоксид | 0,2 | 0,04 | 2 | | |
| Азота оксид | 0,4 | 0,06 | 3 | | |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 | | |
| Бенз/а/пирен | = | 0,1 мкг/100 м ³ | 1 | | |
| Бензол | 0,3 | 0,1 | 2 | | |
| Бериллий | 0,09 | 0,00001 | 1 | | |
| Взвешенные вещества (частицы) | 0,5 | 0,15 | 3 | | |
| Взвешенные частицы РМ 10 | 0,3 | 0,06 | | | |
| Взвешенные частицы РМ 2,5 | 0,16 | 0,035 | | | |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,1 | 2 | | |
| Кадмий | = | 0,0003 | 1 | | |

| Кобальт | - | 0,001 | 2 |
|-------------------|-------|--------|---|
| Марганец | 0,01 | 0,001 | 2 |
| Медь | - | 0,002 | 2 |
| Мышьяк | - | 0,0003 | 2 |
| Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Свинец | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Серная кислота | 0,3 | 0,1 | 2 |
| Сероводород | 0,008 | - | 2 |
| Оксид углерода | 5,0 | 3 | 4 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,05 | 0,01 | 2 |
| Фтористый водород | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |
| Цинк | - | 0,05 | 3 |

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года №КР ДСМ-70. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан Завгуста 2022 года № 29011

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение | Показатели | Оценка за месяц |
|----------|---------------|------------|-----------------|
| I | Низкое | СИ | 0-1 |
| | | НП, % | 0 |
| | | ИЗА | 0-4 |
| II | Повышенное | СИ | 2-4 |
| | | НП, % | 1-19 |
| | | ИЗА | 5-6 |
| III | Высокое | СИ | 5-10 |
| | | НП, % | 20-49 |
| | | ИЗА | 7-13 |
| IV | Очень высокое | СИ | >10 |
| | | НП, % | >50 |
| | | ИЗА | >14 |

РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

| Категор | Назначение/ти | Классы водопользования | | | | | |
|-----------------|---------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ия (вид) | почистки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| водополь | | класс | класс | класс | класс | класс | класс |
| зования | | | | | | | |
| Рыбохозяйственн | Лососевые | + | + | - | - | - | - |
| oe | Карповые | + | + | - | - | - | - |
| водопользование | | | | | | | |

| Хозяйственно- питьевое водопользование | Простая водоподготов ка | + | + | - | - | - | - |
|---|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|
| | Обычная водоподготовка | + | + | + | - | - | - |
| | Интенсивная водоподготов ка | + | + | + | + | 1 | - |
| Рекреационное водопользование (культурно-бытовое) | | + | + | + | - | - | - |
| Орошение | Без подготовки | + | + | + | + | - | _ |
| Орошение Промышленность | Отстаивание в картах | + | + | + | + | + | + |
| : | | + | + | + | + | _ | - |
| технологические цели, процессы охлаждения | | | | | | | - |
| гидроэнергетика | | + + | + + | + + | + + | + | + |
| Добыча полезных ископаемых | | + | + | + | + | + | + |
| транспорт | | + | + | + | + | + | + |

Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР MCX №70 от20.03.2024)

Норматив радиационной безопасности*

| Нормируемые величины | Пределы доз | | |
|----------------------|---|--|--|
| Эффективная доза | Население | | |
| | 1 мЗв в год в среднем за любые | | |
| | последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв | | |
| | в год | | |

^{*«}Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

Нормативы предельно-допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву

| Наименование вещества | Предельно-допустимая концентрация (далее - ПДК) мг/кг в почве |
|-----------------------|---|
| Свинец | 32,0 |
| Хром | 6,0 |

^{*} Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № ҚР ДСМ-32

АДРЕС:

ГОРОД АКТОБЕ УЛ. АВИАГОРОДОК 14 В ТЕЛ. 8-(7132)-22-85-72.

E MAIL:HIMLABACGM@MAIL.RU