Филиал РГП «Казгидромет» по Костанайской области Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

# ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

октябрь 2025 год

	СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
	Предисловие	3
1	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
2	Состояние качества атмосферного воздуха	4
3	Состояние качества поверхностных вод	12
4	Результаты мониторинга качества поверхностных вод	12
5	Радиационная обстановка	13
6	Химический состав атмосферных осадков	14
7	Состояние качества почвенного покрова на территории Костанайской области	14
	Приложение 1	15
	Приложение 2	19
	Приложение 3	22

#### Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Костанайской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

#### Оценка качества атмосферного воздуха Костанайской области

#### 1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Согласно наблюдений Департамента охраны общественного здоровья основными источниками загрязнения воздушного бассейна в городах области являются предприятия тепло энергии, промышленности и автотранспорта. В сельских населенных пунктах загрязнения атмосферного воздуха наблюдаются от стационарных источников.

В области количество стационарных источников выбросов загрязняющих веществ по области составило 15262 единиц, из них организованных 8 517, оборудованных очистными сооружениями 1 820 единиц. Объем общих промышленных выбросов в атмосферу составил — 118 338 тонн.

#### 2. Мониторинг качества атмосферного воздуха города Костанай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории города Костанай – на 2 постах ручного отбора проб и на 2 автоматических станциях.

В целом по городу определяется 7 показателей: 1) взвешенные частицы (nыль); 2) взвешенные частицы PM-2,5; 3) взвешенные частицы PM-10;4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси				
		г. Костан	ай				
1	ручной	ул. Каирбекова, 379; жилой район	взвешенные частицы (пыль), диоксид				
3	отбор проб	ул. Дощанова, 43, центр города	серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота.				
2	в непрерывно м режиме —	ул.Бородина район дома № 142	взвешенные частицы (пыль), оксид углерода, диоксид и оксид азота,				
4	каждые 20 минут	угол ул. Маяковского- Волынова	мощность эквивалентной дозы гамма излучения				

Помимо стационарных постов наблюдений в Костанайской области действует передвижная экологическая лаборатория, с помощью которой измерение качества воздуха проводится дополнительно по 5 точкам области (Приложение 1) по 7 показателям: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота; 6) сероводород; 7) озон.

## 2.1 Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха г. Костанай за октябрь 2025 года.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как *высокий*, определялся значениями СИ

равным 5,0 (высокий уровень) по диоксиду азота и НП = 8 % (повышенный) по оксиду азота в районе поста ПНЗ №2 (ул. Бородина, район дома №142).

Среднемесячные концентрации диоксида азота  $-2,3\,\Pi$ Д $K_{c.c.}$ , концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали  $\Pi$ ДK.

Максимально-разовые концентрации диоксида азота -5.0 ПДК<sub>м.р.</sub>, оксида азота -2.25 ПДК<sub>м.р.</sub>, взвешенных частиц РМ-10-2.84 ПДК<sub>м.р.</sub>, взвешенных частиц РМ-2.5-2.57 ПДК<sub>м.р.</sub>, оксид углерода 1.45 ПДК<sub>м.р.</sub>, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 2).

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не обнаружены.

Таблица 2 **Характеристика загрязнения атмосферного воздуха** 

		Средняя концентрация (Q <sub>мес.</sub> )		Максимальная разовая концентрация $(Q_{\scriptscriptstyle M})$		Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		
Примесь	мг/м <sup>3</sup>	Кратность превышен ия ПДКс.с	мг/м <sup>3</sup>	Кратность превышен ия	%	>пдк	>5ПДК	>10 ПДК
		1111 117,110.0		ПДК м.р			В том числе	
			г. Костанай					
Взвешенные вещества	0,0000	0,000	0,0000	0,00	0	0		
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0311	0,889	0,4113	2,57	0	0		
Взвешенные частицы РМ-10	0,0393	0,655	0,8507	2,84	0	62		
Оксид углерода	0,3296	0,110	7,2685	1,45	0	10		
Диоксид азота	0,0952	2,381	1,0000	5,00	7	169		
Оксид азота	0,0474	0,789	0,8985	2,25	7	171		
Диоксид серы	0,0306	0,613	0,0630	0,13	6	10		

#### Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в октябре изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения в сентябре месяце за последние пять лет оценивался как повышенный в 2021-2024 и 2025 годах, низкий в 2023-2022 году.

#### Метеорологические условия

В октяябре отмечалась активная циклоническая деятельность. Наблюдалась преимущественно неустойчивая погода, часто отмечался ливневой дождь. В отдельные дни под влиянием малоградиентного барического поля отмечалась малооблачная погода, без осадков, со слабым ветром.

07,08,09,10,24,26,27,28,29 октября метеорологические условия по г. Костанай в ночное время способствовали накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

#### 2.2 Мониторинг качества атмосферного воздуха города Рудный.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории города Рудный проводятся на 2 автоматических станциях.

В целом по городу определяется 5 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) оксид азота 5) сероводород.

В таблице 3 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 3 **Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси** 

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
		г. Рудны	й
5	в непрерывн	угол ул. Молодой Гвардии - 4- ый переулок	взвешенные частицы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород,
6	ом режиме – каждые 20 минут	Проспект Комсомольский, рядом с мечетью	мощность эквивалентной дозы гамма излучения

## Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха г. Рудный за октябрь 2025 года.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как *повышенный*, определялся значениями НП = 1,4% (повышенный уровень) и СИ равным 1 (повышенный уровень) по оксиду углерода в районе поста ПНЗ №5 (ул. Молодой Гвардии/4-й переулок).

Среднемесячные концентрации диоксида азота  $-6,41~\Pi \text{Д} \text{K}_{\text{c.c.}}$  концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали  $\Pi \text{Д} \text{K}$ .

Максимально-разовые концентрации оксида углерода — 1,36 ПДК<sub>м.р.</sub>, диоксид азота - 1,0 ПДК<sub>м.р.</sub>, оксид азота - 1,37 ПДК<sub>м.р.</sub>, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК. (таблица 4).

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не обнаружены.

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Таблица 4

	Средняя концентрация (Q <sub>мес.</sub> )		Максимальная разовая концентрация ( $Q_{\scriptscriptstyle M}$ )				исло случаев ышения ПДК <sub>м.р.</sub>	
Примесь	мг/м <sup>3</sup>	Кратность превышения ПДК <sub>с.с</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность превышения ПДК м.р	%	>пдк	>5ПДК	>10 ПДК
		ПДКе.с		11/ДК м.р			Втом	числе
			г. Рудный					
Взвешенные частицы	0,0	0,06	0,13	0,45	0	0	0	0

Оксид углерода	2,24	0,75	6,80	1,36	1	17	0	0
Диоксид азота	0,26	6,41	0,20	1,00	0	0	0	0
Оксид азота	0,03	0,52	0,55	1,37	0	0	0	0

#### Выводы:

За последние годы (2021-2025гг.) уровень загрязнения атмосферного воздуха в октябре изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения за последние пять лет оценивался как повышенный в 2021 и 2022 и 2024 годах, низкий в 2023 и 2025 годах.

# 2.3 Мониторинг качества атмосферного воздуха города Житикара за с октябрь 2025 года.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Житикара — на 1 автоматической станции. В целом определяется 4 показателя: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) озон. В таблице 5 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 5 Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
		г. Житика	пра
1	в непрерывн ом режиме – каждые 20 минут	микрорайон 2, в районе гостиницы Октябрь	диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, озон

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха г. Житикара за октябрь 2025 года.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как *повышенный*, определялся значением СИ равным 2,77 (повышенный уровень) по оксиду углерода и НП равным 0% (низкий уровень).

Среднемесячные концентрации диоксида азота — 3,13 ПДКс.с., диоксида серы — 1,15 ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации озона -2,38 ПДК<sub>м.р</sub>, диоксида азота -2,77 ПДК<sub>м.р</sub> концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК. (таблица 6).

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не обнаружены.

Таблица 6

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха Максимальная Число случаев Средняя разовая превышения ПДКм.р. концентрация (Омес.) концентрация (Qм) % Кратност Примесь Кратность >5 >10  $M\Gamma/M^3$  $M\Gamma/M^3$ >ПДК превышения превыше ПДК ПДК ПДКс.с ния ПДК м.р г. Житикара 0,0010 0,00 0,0010 0,00 0,045 0 0 Оксид углерода 0,0577 0,0647 0,13 0,000 Диоксид серы 1,15 0 0 0 Диоксид азота 0,1252 3,13 0.5546 2,77 0,224 5 0 0 0,18 0,3800 0.090 Озон 0.0053 2.38

#### 2.4 Мониторинг качества атмосферного воздуха города Аркалык

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Аркалык — на 1 автоматической станции. В целом определяется 4 показателя: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) озон. В таблице 7 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 7

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	MICCIO	расположения постов наолюде	ии и определиемые примеси
№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
		г. Аркалі	ык
1	в непрерывн ом режиме – каждые 20 минут	ул. Ш. Жанибека, в районе дома 87	диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, озон

## Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха г. Аркалык за октябрь 2025 года.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как *повышенный*, определялся значением СИ =3,0 (повышенный уровень) и НП равным 3% (повышенный уровень) по диоксиду серы.

Среднемесячные концентрации диоксида азота -1,74 ПДКс.с., диоксида серы -3,12 ПДКс.с., озон-1,18 ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации диоксида серы — 3,03 ПДК<sub>м.р.</sub>, диоксида азота -1,67 ПДК<sub>м.р.</sub>, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 8).

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не обнаружены.

Таблица 8

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Средняя концентрация ( $Q_{\text{мес.}}$ )		Максимальная разовая концентрация ( $Q_{M}$ )		НП	Число случае превышения ПД			
Примесь	мг/м <sup>3</sup>	Кратность превышения ПДКс.с	мг/м <sup>3</sup>	Кратность превышения ПДК <sub>м.р</sub>	%	> ПДК	>5ПДК	>10 ПДК
			г. Аркалы	к				
Оксид углерода	0,2116	0,07	4,4980	0.90	0,000	0	0	0
Диоксид серы	0,1558	3,12	1,5136	3,03	2,823	63	0	0
Диоксид азота	0,0696	1,74	0,3342	1,67	0,134	3	0	0
Озон	0,0353	1,18	0,1475	0,92	0,000	0	0	0

## 2.5 Мониторинг качества атмосферного воздуха г. Лисаковск за октябрь 2025 года.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Лисаковск — на 1 автоматической станции.

В целом определяется 4 показателя: 1) диоксид серы;2) оксид углерода;3) диоксид азота;4) озон.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (таблица 9).

Таблица 9

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	микрорайон 3, строение 23В	диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, озон

# Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха г. Лисаковск за октябрь 2025 года.

По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.4), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как *низкий*, определялся значениями СИ равным 1,0 (низкий) по диоксиду азота и НП равным 0% (низкий).

Среднемесячные концентрации диоксида азота — 2,27 ПДКс.с., диоксида серы — 5,58 ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации диоксида азота -1,00 ПДК<sub>м.р</sub>, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК. (таблица 6).

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не обнаружены.

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

	Средняя концентрация (Q <sub>мес.</sub> )			Максимальная разовая концентрация (Q <sub>м</sub> )		Число случае превышения ПД		
Примесь	мг/м <sup>3</sup>	Кратность превышения	мг/м <sup>3</sup>	Кратность превышения	%	>пдк	>5ПДК	>10 ПДК
		ПДКс.с		ПДК м.р			Втомч	нисле
			г. Лисаково	ск				
Оксид углерода	0,0209	0,01	1.7001	0,34	0	0	0	0
Диоксид серы	0,2792	5.58	0,4899	0,98	0	0	0	0
Диоксид азота	0,0909	2,27	0,1991	1,00	0	0	0	0
Озон	0,0252	0.84	0.0719	0.45	0	0	0	0

## 2.5Мониторинг качества атмосферного воздуха поселка Карабалык за октябрь 2025 года.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в поселке Карабалык — на 1 автоматической станции. В целом определяется 2 показателя: 1) диоксид серы; 2) сероводород. В таблице 9 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 9

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
		п. Карабал	<b>іык</b>
13	в непрерывн ом режиме – каждые 20 минут	ул. Гагарина, 40 «А»	диоксид серы, сероводород

## Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха п. Карабалык за октябрь 2025 года.

По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.3), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как *повышенное*, определялся значением СИ =2,1 (повышенный уровень) по сероводороду и  $H\Pi$ =0% (низкий).

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации сероводорода - 2,1 ПДК<sub>м.р.</sub>, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.(таблица 10).

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не обнаружены.

Таблица 10

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

	Средняя концентрация (Q <sub>мес.</sub> )		Максимальная разовая концентрация ( $Q_{\scriptscriptstyle M}$ )		НП		сло случа ішения П,	
Примесь	мг/м <sup>3</sup>	Кратность превышения ПДК <sub>с.с</sub>	MΓ/M <sup>3</sup>	Кратность превышения ПДК м.р	%	>пдк	>5ПДК	>10 ПДК
		11/ДКе.е					Втом	числе
п. Карабалык								
Диоксид серы	0,0035	0,07	0,0243	0,0	0,000	0	0	0
Сероводород	0,0012	0,33	0,0171	2,1	0,045	1	0	0

#### Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в октябре изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения в октябре месяце за последние пять лет оценивался как низкий в 2021,2022,2023, 2025 годах, повышенный в 2024 годах.

## Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений в городе Костанай.

Наблюдение за загрязнением воздуха в городе Костанай проводились в точке ((Точка №1 – улица Узкоколейная; точка №2 – район ТРЦ «Кустанай Плаза»).

Измерялись концентрации взвешенных частиц (пыль), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода и озона.

Максимально-разовые концентрации составили в пределах 1,23-1,30 ПДК $_{\text{м.р.}}$ , концентрации остальных загрязняющих веществ находились в пределах допустимой нормы (таблица 11).

Таблица 11 Максимальные концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений в городе Костанай

Определяемые примеси	Точки отбора					
	N	<b>№</b> 1		<u>6</u> 2		
	qm мг/м <sup>3</sup>	qm/ПДК	qm мг/м <sup>3</sup>	qт/ПДК		
Взвешенные частицы (пыль)	0,03	0,06	0,04	0,07		
Диоксид азота	0,01	0,04	0,01	0,050		
Диоксид серы	0,16	0,312	0,02	0,042		
Оксид углерода	0,75	0,15	0,96	0,19		
Оксид азота	0,01	0,03	0,01	0,02		
Сероводород	0,01	1,30	0,01	1,23		
Озон	0,01	0,08	0,01	0,06		

## 5. Мониторинг качества поверхностных вод на территории Костанайской области.

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Костанайской области проводились на 16 створах 11 водных объектов (реки Тобыл, Айет, Тогызак, Уй, Обаган, Желкуар, Торгай, водохранилища Шортанды, Амангельды, Каратомар и

Жогаргы Тобыл).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 37 физико-химических показателей качества: визуальные наблюдения, температура воды, растворенный кислород, водородный показатель, взвешенные вещества, цветность, прозрачность, запах, расход и уровень воды, БПК5, ХПК, главные ионы солевого состава, биогенные (соединения азота, фосфора, железа, кремний, фториды) и органические вещества (нефтепродукты, СПАВ, летучие фенолы), тяжелые металлы (никель, марганец, медь, цинк, свинец).

## 6. Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Костанайской области.

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом: Таблица 3

Наименование	Класс в	сачества воды		Ед.	Концент
водного объекта	Октябрь 2024	Октябрь 2025	Параметры	изм.	рация
		6 класс	Хлориды	мг/л	861,78
р. Тобыл		(высоко	Минерализация	мг/л	2425,58
		загрязненные)	Магний	мг/л	100,46
р. Айет		4 класс	Минерализация	мг/л	1396,9
		(загрязненные)	Цинк	мг/л	0,014
			Никель		0,073
			Взвешенные вещества	мг/л	29,8
р. Обаган		6 класс	Минерализация	мг/л	2363,6
		(высоко	хлориды	мг/л	486,4
		загрязненные)			
р. Тогызак		5 класс (очень	Взвешенные вещества	мг/л	40,5
***		загрязненные	7	,	40.0
р. Уй		б класс	Взвешенные вещества	мг/л	49,9
		(высоко			
р. Желкуар		загрязненные) 5 класс (очень	Взвешенные вещества	мг/л	37,7
		загрязненные)	Минерализация	мг/л	1792,2
			Сульфаты	мг/л	672,4
р. Торгай		4 класс	БПК5	мг/л	3,72
		(загрязненные)	Цинк	мг/л	0,012
		4 класс	Взвешенные вещества	мг/л	39,5
Вдхр. Каратомар		(загрязненные)	Цинк	мг/л	0,022
Dava Warana		6 класс	Взвешенные вещества	мг/л	55,2
Вдхр. Жогаргы Тобыл		(высоко			
I OODIJI		загрязненные)			

	6 класс	Взвешенные вещества	мг/л	40,5
Вдхр. Аманкельды	(высоко			
	загрязненные)			
Вдхр. Шортанды	6 класс	Хлориды	мг/л	597,7
	(высоко			
	загрязненные)			

По состоянию на октябрь 2025 год качество поверхностных вод рек Торгай, Айет и водохранилища Каратомар соответствует 4 классу качества, качество вод рек Тогызак, Желкуар соответствует 5 классу качества, качество вод рек Тобыл, Уй, Обаган и водохранилищ Жогаргы Тобыл, Амангельды, Шортанды соответствует 6 классу качества.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах Костанайской области являются  $БПК_5$ , взвешенные вещества, минерализация, магний, марганец, никель, цинк, хлориды.

#### Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения

За октябрь 2025 года на территории Костанайской области случаев ВЗ не обнаружено.

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

#### 5. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Костанай, Карабалык, Карасу, Житикара, Караменды, Сарыколь) и на 4-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Костанай (ПНЗ№2; ПНЗ№4), Рудный (ПНЗ №5; ПНЗ №6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,07-0,18 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Житикара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,3-2,0 Бк/м². Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,6 Бк/м², что не превышает предельно-допустимый уровень.

## 6. Химический состав атмосферных осадков на территории Костанайской области

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на метеостанции Костанай.

В пробах осадков преобладало содержание сульфатов 19,2 %, хлоридов 16,4 %, гидрокарбонатов 32,7 %, нитратов 2,8 %, аммония 3,1 %, натрия 9,5 %, калия 3,6 %, магния 3,3 %, ионов кальция 9,5 %.

Величина общей минерализации составила 34,4 мг/л, электропроводимости -57.3 мкСм/см.

Кислотность выпавших осадков имеет характер нейтральной среды (6,7).

## 7. Состояние качества почвенного покрова на территории Костанайской области

**В городе Костанай** в пробах почвы, отобранных в различных районах, содержания свинца находились 8,05-21,20 мг/кг, меди -0,27-1,75 мг/кг, хрома -0,46-0,63 мг/кг, цинка -10,6-14,6 мг/кг, кадмия -0,12-0,69 мг/кг.

**В поселке Варваринка** в районе лодочной переправы, территории школы, въезда в поселок, насосной станции и районе отвалов АО «Варваринская» в пробах почв концентрации кадмия 0,18-0,35 мг/кг, свинца 6,65-21,45 мг/кг, цинка 5,88-10,40 мг/кг, меди 0,38-1,12 мг/кг и хрома находились в пределах 0,31-0,64 мг/кг и не превышали допустимую норму.

**В поселке Житикара** в районах улицы Павлова (сш. №2), территории Парка культуры и отдыха им. Джамбула, парка Победы, центрального сквера, а также в районе улицы Партизанская концентрации кадмия 0,10-0,18 мг/кг, свинца 5,30-12,20 мг/кг, цинка 7,86-13,65 мг/кг, меди 0,40-1,25 мг/кг и хрома находились в пределах 1,06-3,40 мг/кг.

На территории Парка культуры и отдыха им. Джамбула концентрация хрома составила 0,03 ПДК.

**В городе Аркалык** в пробах почвы, отобранных в районе улицы Мира Аркалыкской районной больницы (АРБ), средней школы №1, в районе автодороги на г. Есиль, угол улиц Горбачева — 8 марта, в районе промзоны АО «Алюминьстрой» (на расстоянии 500 м) содержание тяжелых металлов находилось в пределах 0,13 — 19,11 мг/кг.

В районе автодороги на г. Есиль концентрация хрома составила 0,07 ПДК.

**В городе Лисаковск** в пробах почвы, отобранных на территории парка Победы, СШ №1, улицы Строительная (район железнодорожного вокзала -10м), улицы Больничная (Молочный завод ТОО "ДЭП"), ул. Тобольская р-н Мед центра "Мирас" концентрации меди 0.70-1.75 мг/кг, кадмия 0.10-0.23 мг/кг, свинца 5.75-10.10 мг/кг, цинка 14.20-21.12 мг/кг и хрома находились в пределах 1.18-4.70 мг/кг.

На территории СШ №1 концентрация хрома составила 0,03 ПДК.

**В городе Рудный** в пробах почвы, отобранных в различных районах, содержания свинца находились в пределах 4,10-22,55 мг/кг, меди -1,00-1,85 мг/кг, хрома 1,01-2,96 мг/кг, цинка -5,11-14,28 мг/кг, кадмия -0,15-0,80 мг/кг.

#### Приложение 1



Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Костанай




Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Рудный



Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха городу Лисаковск




Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха городу Житикара



Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха городу Аркалык




Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха поселку Карабалык



Схема расположения пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха по г. Костанай при эпизодических наблюдениях




Схема расположения пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха по г. Костанай при эпизодических наблюдениях



Схема расположения пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха по г. Костанай при эпизодических наблюдениях

#### Приложение 2

# Информация о качестве поверхностных вод в Костанайской области по створам

Водный объект и створ	Характеристика физик	о-химических параметров			
река Тобыл	температура воды отм	• •			
P	1 **	онцентрация растворенного в воде			
		$\Gamma/\pi$ , БПК <sub>5</sub> – 0,34-5,04 мг/л, цветность			
	_	врачность – 27,0-30,0 см, запах – 0			
	балла во всех створах.				
п. Аккарга, 1 км к ЮВ от села	6 класс (высоко	Минерализация – 6359 мг/л,			
в створе г/п	загрязненные)	хлориды — 3126,7 мг/л, магний —			
2 CIESPO IVII		304 мг/л, кальций $-350,7$ мг/л,			
		сухой остаток – 5100 мг/л.			
		Фактическая концентрация			
		кальция, хлоридов, минерализации,			
		магния, сухого остатка не			
	превышает фоновый класс.				
с. Гришенка, 0,2 км ниже села	6 класс (высоко Хлориды – 424 мг/л. Фактичес				
в створе г/п	загрязненные) концентрация хлоридов превыша				
-	,	фоновый класс.			
г.Костанай, Управление	6 класс (загрязненные)	Взвешенные вещества – 44,2 мг/л.			
горводоканала 1 км выше	, 2	Фактическая концентрация			
сброса		взвешенных веществ превышает			
_		фоновый класс.			
г.Костанай, 4 км ниже города	4 класс (загрязненные)	Цинк $-0.015$ мг/л, минерализация $-$			
г.Костанай		$1410,9 \text{ мг/л},  \text{БПК}_5 - 4,59 \text{ мг/л}.$			
с. Введенка, 0,6 км. к В от	4 класс (загрязненные)	Цинк – 0,018 мг/л.			
поселка в створе г/п	, 1				
река Айет	температура воды соста	вила 9,0 °C, водородный показатель			
	8,05, концентрация раст	гворенного в воде кислорода – 5,13			
	мг/л, БПК $_5$ – 0,95 мг/л, цветность – 6,6 градуса, прозрачность				
	-30,0 см, запах $-0$ балла.				
с. Варваринка, 0,2 км выше		Минерализация – 1396,9 мг/л, цинк			
села в створе г/п	4 класс (загрязненные)	-0,014 мг/л, никель $-0,073$ мг/л,			
1	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			

	T	20.0 /			
		взвешенные вещества — 29,8 мг/л. Фактическая концентрация минерализации и взвешенных веществ превышает фоновый класс. Фактическая концентрация цинка и никеля не превышает фоновый класс.			
река Обаган	температура воды составила 6,0 °C, водородный показатель 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода $-5,13$ мг/л, БПК <sub>5</sub> $-3,12$ мг/л, цветность $-15,2$ градусов, прозрачность $-27,0$ см, запах $-0$ балла.				
п. Аксуат, 4 км к В от села в створе г/п	6 класс (высоко загрязненные)	Минерализация — 2363,6 мг/л, хлориды — 486,4 мг/л. Фактическая концентрация, минерализации и хлоридов не превышает фоновый класс.			
река Тогызак	температура воды на уровне 5,4-12,6 °C, водородный показатель 8,13-8,29, концентрация растворенного в водо кислорода — 11,71-11,87 мг/л, БПК <sub>5</sub> — 4,01-4,31 мг/л цветность — 8,9 градуса, прозрачность — 27,0-28,0 см, запах — 0 балла.				
ст. Тогузак, 1,5 км СЗ ст. Тогузак, в створе г/п	5 класс (очень загрязненные)	Взвешенные вещества — 38,8 мг/л. Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.			
п. Михайловка, 1,1 км. СВ от села в створе г/п	4 класс (загрязненные)	ные) Цинк – 0,017 мг/л, БПК $_5$ – 4,31 мг/л			
река Уй	температура воды составила 7,0 °C, водородный показатель — 8,26, концентрация растворенного в воде кислорода — 12,21 мг/л, БПК <sub>5</sub> — 3,73 мг/л, цветность — 6,2 градусов, прозрачность — 27,0 см, запах — 0 балл.				
с. Уйское, 0,5 км к В от с. Уйское, в створе г/п		Взвешенные вещества — 49,9 мг/л. Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.			
река Желкуар	– 8,06, концентрация ра	вила $-9,0$ °C, водородный показатель створенного в воде кислорода $-10,8$ мг/л, цветность $-8,6$ градусов, ах-0 балла.			
п. Чайковское, 0,5 км к ЮВ от села в створе г/п	5 класс (очень загрязненные)	Взвешенные вещества — 37,7 мг/л, сульфаты — 672,4 мг/л, минерализация — 1792,2 мг/л. Фактическая концентрация взвешенных веществ, сульфатов, минерализации превышает фоновый класс.			
река Торгай	температура воды составила — $10.0^{\circ}$ С, водородный показатель — $8.06$ , концентрация растворенного в воде кислорода — $7.33$ мг/л, БПК <sub>5</sub> — $3.72$ мг/л, прозрачность — $27.0$ см.				
п. Торгай, в черте села	4 класс (загрязненные) БПК5 $-3,72$ мг/л, цинк $-0,012$ мг/л.				
водохранилище Аманкельды	температура воды составила $10.2$ °C, водородный показатель $-8.14$ , концентрация растворенного в воде кислорода $-6.3$ мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> $-3.87$ мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность $-27.0$ см.				
г.Костанай, 8 км к ЮЗ от	6 класс (высоко	Взвешенные вещества – 40,5 мг/л.			

г.Костанай	загрязненные)	Фактическая концентрация			
	,	взвешенных веществ превышает			
		фоновый класс.			
водохранилище Каратомар	температура воды соста	вила 10,0 °C, водородный показатель			
	– 8,24, концентрация рас	створенного в воде кислорода – 7,18			
	$M\Gamma/дM^3$ , $Б\Pi K_5 - 3.0 M\Gamma/дM^3$	$^{3}$ , прозрачность – 27,0 см.			
с.Береговое, 3,6 км к ЮЗ от	4 класс (загрязненные)	Взвешенные вещества – 39,5 мг/л,			
гидросооружения вдхр.		цинк – 0,022 мг/л. Фактическая			
		концентрация взвешенных веществ			
		превышает фоновый класс.			
		Фактическая концентрация цинка			
	не превышает фоновый класс.				
водохранилище Жогаргы		вила 12,0 °C, водородный показатель			
Тобыл		астворенного в воде кислорода 8,5			
	$M\Gamma/дM^3$ , $B\Pi K_5 - 1,82 M\Gamma/дM$	м <sup>3</sup> , прозрачность – 26,0 см.			
7		77.2			
г.Лисаковск, 5 км к 3 от	\ .	Взвешенные вещества – 55,2 мг/л.			
г.Лисаковск	загрязненные)	Фактическая концентрация			
		взвешенных веществ превышает			
	фоновый класс.				
водохранилище Шортанды		вила 8,4 °C, водородный показатель			
	<ul><li>− 7,85, концентрация растворенного в воде кислорода − 7,33</li></ul>				
	$M\Gamma/дM^3$ , $Б\Pi K_5 - 0,66 M\Gamma/дM^3$ , прозрачность – 28,0 см.				
г.Житикара, в районе моста	6 класс (высоко	Хлориды – 597,7 мг/л.			
	загрязненные)				

### Приложение 3

#### Справочный раздел

# Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществв воздухе населенных мест

Наименование	Значения П	ДК, мг/м3	Класс	
примесей	максимально разовая	средне- суточная	опасности	
Азота диоксид	0,2	0,04	2	
Азота оксид	0,4	0,06	3	
Аммиак	0,2	0,04	4	
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м <sup>3</sup>	1	
Бензол	0,3	0,1	2	
Бериллий	0,09	0,00001	1	
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3	
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06		
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035		
Хлористый водород	0,2	0,1	2	
Кадмий	-	0,0003	1	
Кобальт	-	0,001	2	
Марганец	0,01	0,001	2	
Медь	-	0,002	2	
Мышьяк	-	0,0003	2	
Озон	0,16	0,03	1	

Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фтористый водород	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

<sup>«</sup>Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (СанПин №168 от 28 февраля 2015 года)

#### Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение атмосферного воздуха	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, %	0-1 0
II	Повышенное	СИ НП, %	2-4 1-19
III	Высокое	СИ НП, %	5-10 20-49
IV	Очень высокое	СИ НП, %	>10 >50

Инструктивно-методический документ «Организация и проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Республики Казахстан» (Приложение 1 к приказу №624-Ө от 15.07.2025)

## Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

			Класс	Классыводопользования			
Категория водопользования	Назначение/тип очистки	1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс	6 класс
Функционированиеводных экосисте м	-	+	+	-	-	-	-
D51	Лососевые	+	+	-	-	-	-
Рыбоводство/охранаихтиофауны	Карповые	+	+	+	-	-	-
37	Простаяобработка	+	+	-	-	-	-
Хозяйственно- питьевоеводоснабжение	Нормальнаяобработка	+	+	+	-	-	-
питьевоеводоснаожение иводоснабжениепредприятий пищевой промышленности	Интенсивнаяобработка	+	+	+	-	-	ı
Культурно- бытовоеводопользование	Туризм, спорт, отдых,купание	+	+	+	-	-	-
	Безподготовки	+	+	+	+	-	-
Орошение	Прииспользованиикартотстаива ния	+	+	+	+	+	-
Промышленноеводопользование	Технологическиепроцессы, процессы охлаждения	+	+	+	+	+	1
Гидроэнергетика		+	+	+	+	+	+
Водный транспорт		+	+	+	+	+	+
Добыча полезныхископаемых		+	+	+	+	+	+

Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №275-П от 14.11.2024)

#### Норматив радиационной безопасности\*

Нормируемые величины	Пределы доз
Эффективная доза	Население
	1 мЗв в год в среднем за любые
	последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв
	в год

<sup>\*«</sup>Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

## ФИЛИАЛ РГП «КАЗГИДРОМЕТ» ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

АДРЕС:

ГОРОД КОСТАНАЙ УЛ. О. ДОЩАНОВА, 43 ТЕЛ./ФАКС: 8(7142)50-26-49, 50-34-29 E-MAIL:LAB\_KOS@METEO.KZ