

Краткий агрометеорологический обзор за 3-ю декаду декабря 2025 года.

В третьей декаде декабря на юге и юго-востоке республики аномалия температуры воздуха была выше нормы на 2...5°C. В районах возделывания озимой пшеницы осадки выпали в основном около и больше нормы. Озимые зерновые культуры в основном находились в состоянии зимнего покоя.

В Алматинской области в районах возделывания озимой пшеницы минимальная температура воздуха составила минус 14...19°C, а минимальная температура узла кущения озимой пшеницы была в пределах 0°C. В районах возделывания озимой пшеницы осадки выпали 2-6 мм или 23-70% от нормы, растения находились под снежным покровом высотой 3-10 см. В районах, где снежный покров составляет менее 5 см, сильные морозы могут повлиять на прохождение перезимовки озимых культур, промерзание почвы достигает глубины 6-17 см.

В области Жетісу в районах возделывания озимых зерновых культур минимальная температура воздуха составила минус 15...18°C. Высота снежного покрова 7-15 см, местами до 23 см, почва промерзла до глубины 12 см. Осадки выпали в количестве 10-17 мм или 86-113% от нормы.

В Жамбылской области на посевах озимой пшеницы минимальная температура воздуха составила минус 7...14°C и минимальная температура почвы на глубине залегания узла кущения минус 2°C. Снег в основном растаял, отмечался лишь местами до 1-2 см. Осадки выпали в Кордайском, Меркенском и Шусском районах 12-14 мм, или 108-148% от нормы.

В районах возделывания озимых зерновых культур Туркестанской области минимальная температура воздуха составила минус 5...9°C, минимальная температура узла кущения озимой пшеницы была в пределах 0°C, почва в основном была талая, снег растаял. В окрестности метеостанции Шымкент на фоне положительных температур воздуха в конце декады наблюдалось возобновление вегетации озимой пшеницы. Осадки в количестве 16-23 мм выпали на большей части, местами до 28-32 мм, что составило 82-114% от нормы.

Агрометеорологические условия на юге и юго-востоке республики для зимовки озимых были удовлетворительными. Низких значений температуры воздуха и почвы, опасных для зимующих культур, не наблюдалось.

На последний день декады скот на пастбищах выпасался повсеместно. В Алгинском районе Актюбинской области, в Жаныбекском районе Западно-Казахстанской области и в Аркалыкском районе Костанайской области скот перевели на стойловое содержание, в Мангистауском районе Мангистауской области животноводы подкармливают поголовье скота.

На пастбищах мерзлая дернина наблюдается в Жамбылском и Балхашском районах Алматинской области, в Кызылкогинском районе Атырауской области, в Жаныбекском и Акжайыкском районах Западно-Казахстанской области, в

Аркалыкском районе Костанайской области, в Мангистауском районе Мангистауской области и в Улытауском районе области Улытау, на северо-западе отмечается сырая дернина.

На конец декады пастбища слабо стравлены на большей части Актюбинской области и на отдельных пастбищах Западно-Казахстанской, Кызылординской областей. Умеренно стравлены пастбища в Балхашском районе Алматинской области, в Курмангазинском районе Атырауской области, в Каратальском районе области Жетісу, в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области и в Аркалыкском районе Костанайской области. Сильно стравлены пастбища в Жамбылском районе Алматинской области, в Жаныбекском и Сырымском районах Западно-Казахстанской области и в Актогайском районе Карагандинской области.

2025 ж ыпдың ж елтоқсан айының 3-ші онкүндігіне қысқаша агрометеорологиялық шолу.

Желтоқсанның үшінші онкүндігінде республиканың оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында ауа температурасының ауытқуы нормадан 2...5°C жоғары болған. Күздік бидай себілетін аудандарда жауын-шашын көбінесе нормаға жуық және одан көп жауған. Күздік дәнді бидай көбінесе қысқы тыныштықта болған.

Алматы облысының күздік бидай өсірілетін аудандарда ауаның минималды температурасы минус 14...19°C, ал бидайдың түптену түйіні тереңдігіндегі топырақтың минималды температурасы 0°C шамасында болған. Күздік бидай өсірілетін аудандарында жауын-шашын 2-6 мм түскен немесе нормадан 23-70%, өсімдіктер биіктігі 3-10 см қар жамылғысының астында болған. Қар жамылғысы 5 см төмен аудандарда қатты аяз күздік дақылдардың қыстап шығуына әсер етуі мүмкін, топырақтың қатуы 6-17 см тереңдікке жетеді.

Жетісу облысында күздік дәнді бидай өсіретін аудандарында ауаның минималды температурасы минус 15...18°C құраған. Қар жамылғысының биіктігі 7-15 см, кей жерлерде 23 см дейін, топырақ 12 см тереңдікке дейін қатқан. Жауын-шашын 10-17 мм мөлшерінде түскен немесе норманың 86-113%.

Жамбыл облысында күздік бидай егістігінде ауаның минималды температурасы минус 7...14°C және бидайдың түптену түйіні тереңдігіндегі топырақтың минималды температурасы минус 2°C болған. Қар көбінесе еріген, тек кей жерлерде 1-2 см дейін байқалған, жауын-шашын Қордай, Мерке және Шу аудандарында 12-14 мм жауған немесе норманың 108-148%.

Түркістан облысында күздік дәнді дақылдар өсіретін аудандарында ауаның минималды температурасы минус 5...9°C, бидайдың түптену түйіні тереңдігіндегі топырақтың минималды температурасы 0°C шамасында болған, топырақ көбінесе жібіп, қар еріген. Шымкент метеостанциясының маңайында оң ауа температурасынан онкүндіктің соңында күздік бидай вегетациясының қайта

өсіп-өнуі байқалған. Мөлшері 16-23 мм жауын-шашын облыстың көп бөлігінде жауған, кей жерлерде 28-32 мм дейін түскен, бұл норманың 82-114% құраған.

Республиканың оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында агрометеорологиялық жағдайлар күздік бидайдың қыстауына қанағаттанарлық болған. Қыстайтын дақылдар үшін қауіпті ауа мен топырақ температурасының төмен мәндері байқалмаған.

Онкүндіктің соңғы күні жайылымдарда мал тегіс жайылған. Ақтөбе облысының Алға ауданында, Батыс Қазақстан облысының Жәнібек ауданында және Қостанай облысының Арқалық ауданында малдарды қораларда ұстауға ауыстырған, Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданында малшылар мал басын азықтандыруда.

Жайылымдарда дымқыл шым Алматы облысының Жамбыл және Балқаш аудандарында, Атырау облысының Қызылқоға ауданында, Батыс Қазақстан облысының Жәнібек және Ақжайық аудандарында, Қостанай облысының Арқалық ауданында, Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданында және Ұлытау облысының Ұлытау ауданында байқалған, солтүстік-батыста дымқыл шым байқалған.

Онкүндіктің соңында Ақтөбе облысының басым бөлігінде және Батыс Қазақстан, Қызылорда облыстарының жеке жайылымдарында жайылымдар әлсіз тапталған. Алматы облысының Балқаш ауданында, Атырау облысының Құрманғазы ауданында, Жетісу облысының Қаратал ауданында, Батыс Қазақстан облысының Ақжайық ауданында және Қостанай облысының Арқалық ауданында жайылымдар бірқалыпты тапталған. Алматы облысының Жамбыл ауданында, Батыс Қазақстан облысының Жәнібек және Сырым аудандарында және Қарағанды облысының Ақтоғай ауданында жайылымдар қатты тапталған.