

Краткий агрометеорологический обзор за 1 декаду января 2026 года.

В первой декаде января на юге и юго-востоке республики аномалия температуры воздуха была выше нормы на 2...4°C. В районах возделывания озимой пшеницы осадки выпали в основном меньше нормы. Озимые зерновые культуры находились в состоянии зимнего покоя.

В Алматинской области в районах возделывания озимой пшеницы минимальная температура воздуха составила минус 8...11°C, минимальная температура узла кущения озимой пшеницы была минус 6°C. В районах возделывания озимой пшеницы осадки были незначительными, лишь в Жамбылском районе осадки выпали больше нормы, растения находились под снежным покровом высотой 4-9 см. В районах, где снежный покров составляет менее 5 см, сильные морозы могут привести к повреждению слабо развитых растений на посевах озимой пшеницы. Промерзание почвы достигает глубины 19-44 см.

В области Жетісу в районах возделывания озимых зерновых культур минимальная температура воздуха составила минус 13...19°C. Высота снежного покрова составляет 10-18 см., местами до 21 см, глубина промерзания почвы 19 см. Осадки выпали меньше нормы.

В Жамбылской области на посевах озимой пшеницы минимальная температура воздуха составила минус 5...8°C и минимальная температура почвы на глубине залегания узла кущения плюс 3°C. Снег в основном растаял, на конец декады почва промерзла до глубины 2-9 см, местами до 16 см. Осадки выпали меньше нормы.

В районах возделывания озимых зерновых культур Туркестанской области минимальная температура воздуха составила минус 5...8°C, минимальная температура на глубине узла кущения озимой пшеницы минус 3°C, почва в основном была талая, лишь местами почва промерзла до глубины 4-6 см, снег растаял. Осадков выпало меньше среднегодовых значений.

Агрометеорологические условия на юге и юго-востоке республики для зимовки озимой пшеницы были удовлетворительными. Низких значений температуры воздуха и почвы, опасных для зимующих культур, не наблюдалось.

На последний день декады скот выпасался на большей части пастбищ, лишь в Алгинском районе Актюбинской области, в Сырымском и Жанибекском районах Западно-Казахстанской области и в Аркалыкском районе Костанайской области скот остается на стойловом содержании, в Мангистауском районе Мангистауской области животноводы подкармливают поголовье скота.

На пастбищах мерзлая дернина наблюдается в Жамбылском и Балхашском районах Алматинской области, в Жанибекском и Сырымском районах Западно-Казахстанской области, в Аркалыкском районе Костанайской области и в Улытауском районе Улытауской области, на северо-западе и на отдельных

пастбищах Западно-Казахстанской и Мангистауской областей отмечается сырая дернина.

На конец декады пастбища слабо стравлены на большей части Актюбинской области, умеренно стравлены в отдельных районах Мангистауской, Алматинской и Западно-Казахстанской областей, сильно стравлены пастбища на большей части Западно-Казахстанской области, а также в Жамбылском районе Алматинской области и в Актогайском районе Карагандинской области.

2026 ж ыпдың қаңтар айының 1 онкүндігіне қысқаша агрометеорологиялық шолу.

Қаңтардың бірінші онкүндігінде республиканың оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында ауа температурасының аномалиясы нормадан 2...4°C жоғары болған. Күздік бидай өсірілетін аудандарда жауын-шашын нормадан аз түскен. Күздік дәнді бидай қысқы тыныштықта болған.

Алматы облысында күздік бидай өсіретін аудандарда ауаның минималды температурасы минус 8...11°C, күздік бидайдың түптену түйіні тереңдігіндегі топырақтың минималды температурасы минус 6°C болған. Күздік бидай өсіретін аудандарында жауын-шашын аз болған, тек Жамбыл ауданында жауын-шашын нормадан көп жауған, өсімдіктер биіктігі 4-9 см қар жамылғысының астында болған. Қар жамылғысы 5 см төмен аудандарда қатты аяз әлсіз дамыған күздік бидай егістіктеріне зақым келтіруі мүмкін. Топырақтың қатуы 19-44 см тереңдікке жетеді.

Жетісу облысында күздік дәнді бидай өсіретін аудандарында ауаның минималды температурасы минус 13...19°C құрадған. Қар жамылғысының биіктігі 10-18 см, кей жерлерде 21 см дейін, топырақтың қату тереңдігі 19 см. Жауын-шашын нормадан аз түскен.

Жамбыл облысында күздік бидай егістіктерінде ауаның минималды температурасы минус 5...8°C және бидайдың түптену түйіні тереңдігіндегі топырақтың минималды температурасы минус 3°C болған. Қар көбінесе еріген, онкүндіктің соңында топырақ 2-9 см тереңдікке дейін қатқан, кей жерлерде 16 см дейін, жауын-шашын нормадан аз болған.

Түркістан облысының күздік дәнді бидай өсіретін аудандарында ауаның минималды температурасы минус 5...8°C, бидайдың түптену түйіні тереңдігіндегі топырақтың минималды температурасы минус 3°C болған, топырақ көбінесе еріген, тек кей жерлерде топырақ 4-6 см тереңдікке дейін қатқан, қар еріген. Жауын-шашын көпжылдық орташа мәннен аз болған.

Республиканың оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында күздік бидайдың қыстауына орын алған агрометеорологиялық жағдайлар қанағаттанарлық болған. Қыстайтын дақылдар үшін қауіпті ауа мен топырақ температурасының төмен мәндері байқалмаған.

Онкүндіктің соңғы күні жайылымдардың басым бөлігінде мал жайылымда болған, тек Ақтөбе облысының Алға ауданында, Батыс Қазақстан облысының Сырым және Жәнібек аудандарында және Қостанай облысының Арқалық ауданында малдар қораларда ұсталған, Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданында малшылар мал басын азықтандыруда.

Жайылымдарда дымқыл шым Алматы облысының Жамбыл және Балқаш аудандарында, Батыс Қазақстан облысының Жәнібек және Сырым аудандарында, Қостанай облысының Арқалық ауданында және Ұлытау облысының Ұлытау ауданында байқалады, солтүстік-батыста және Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстарының жеке жайылымдарында шым дымқыл болған.

Онкүндіктің соңында Ақтөбе облысының басым бөлігінде жайылымдар әлсіз тапталған, бірқалыпты тапталған Маңғыстау, Алматы және Батыс Қазақстан облыстарының жеке аудандарында, жайылымдар қатты тапталған Батыс Қазақстан облысының басым бөлігінде, сондай-ақ Алматы облысының Жамбыл ауданында және Қарағанды облысының Ақтоғай ауданында.