

Краткий агрометеорологический обзор за 1 декаду февраля 2026 года.

В первой декаде февраля на юге и юго-востоке республики аномалия температуры воздуха была выше нормы плюс 4...7°C. В районах возделывания озимой пшеницы осадки выпали в основном около нормы, в области Жетісу больше нормы. В Туркестанской области на отдельных участках наблюдаются всходы озимых пшеницы и ячменя (в окрестностях метеостанции Казыгурт, Шымкент), фаза 3-го листа озимой пшеницы отмечены в Алматинской (Аккайнар) и Туркестанской (Шымкент) областях.

В Алматинской области в районах возделывания озимой пшеницы минимальной температуры воздуха наблюдалось минус 7...10°C, минимальная температура узла кущения озимой пшеницы минус 2°C. В районах возделывания озимой пшеницы количество осадков составила около нормы 6-8 мм (80-114% от нормы). Высота снежного покрова была 2-12 см, глубина промерзания почвы 29-40 см.

В области Жетісу в районах возделывания озимых культур минимальная температуры воздуха составила минус 13...17°C. Осадки выпали больше нормы 11-20 мм (182-200% от нормы), высота снежного покрова 3-26 см, глубина промерзания почвы 22-53 см.

В Жамбылской области на посевах озимой пшеницы минимальная температура воздуха составила минус 3...10°C и минимальная температура почвы на глубине залегания узла кущения 0°C. Осадков в основном выпало около и больше нормы 6-29 мм (82-169% от нормы).

В районах возделывания озимых зерновых культур Туркестанской области минимальная температура воздуха составила минус 1...7°C, минимальная температура на глубине узла кущения озимой пшеницы минус 1°C. Осадков выпало в основном около и больше среднегодовых значений 19-41 мм (86-158% от нормы).

В связи с повышением температуры воздуха в Жамбылской и Туркестанской областях снежный покров и промерзание почвы отсутствует.

По результатам определения жизнеспособности зимующих культур (озимая пшеница) по состоянию на 20 января в Алматинской области процент погибших растений составил 4-18%, в Жамбылской области 3-20% и в Западно-Казахстанской области 4-12%.

Агрометеорологические условия на юге и юго-востоке республики для зимовки озимых были удовлетворительными, однако частые оттепели на юге (до 4 суток) при чередовании дневных положительных температур с ночными отрицательными температурами воздуха могут привести к повреждению слабо развитых растений.

На последний день декады скот выпасался на большей части пастбищ, в Алгинском районе Актюбинской области, в Сырымском, Жаныбекском районах Западно-Казахстанской области. В Аркалыкском районе Костанайской области скот продолжает оставаться на стойловом содержании, в Каратальском районе

области Жетісу, в Мангистауском районе Мангистауской области животноводы подкармливают поголовье скота.

Мерзлая дернина наблюдается на пастбищах в Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, а также на отдельных пастбищах в Карагандинской, Мангистауской областях, *сырая* дернина отмечалась на пастбищах в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Улытауской областях.

На конец декады пастбища *слабо* стравлены на большей части Актюбинской области, *умеренная* стравленность отмечается на отдельных пастбищах в Мангистауской, Алматинской, Костанайской областях, *сильно* стравлены пастбища на большей части Западно-Казахстанской области и на отдельных пастбищах в Карагандинской области.

2026 ж ыпдың ақпан айының 1 онкүндігіне қысқаша агрометеорологиялық шолу.

Ақпанның бірінші онкүндігінде республиканың оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында ауа температурасының аномалиясы нормадан жоғары плюс 4...7°C болған. Күздік бидай өсірілетін аудандарда жауын-шашын көбінесе нормаға жуық жауған, Жетісу облысында нормадан көп. Түркістан облысында жеке учаскелерде күздік бидай мен арпаның (Қазығұрт, Шымкент) көктеуі орын алған, күздік бидайдың 3-ші жапырақ фазасы Алматы (Аққайнар) және Түркістан (Шымкент) облыстарында байқалған.

Алматы облысында күздік бидай өсірілетін аудандарда ауаның минималды температурасы минус 7...10°C, күздік бидайдың түптену түйіні тереңдігіндегі топырақтың минималды температурасы минус 2°C болған. Күздік бидай өсірілетін аудандарында жауын-шашын мөлшері шамамен 6-8 мм (нормадан 80-114%) құраған. Қар жамылғысының биіктігі 2-12 см, топырақтың қату тереңдігі 29-40 см болған.

Жетісу облысында күздік дәнді бидай өсірілетін аудандарда ауаның минималды температурасы минус 13...17°C құраған. Жауын-шашын нормадан 11-20 мм (нормадан 182-200%) көп түскен, қар жамылғысының биіктігі 3-26 см, топырақтың қату тереңдігі 22-53 см.

Жамбыл облысында күздік бидай алқаптарында ауаның минималды температурасы минус 3...10°C және топырақтың түптену түйіні тереңдігіндегі минималды температурасы 0°C болған. Жауын-шашын көбінесе норма шамасында және одан көп болған 6-29 мм (нормадан 82-169%).

Түркістан облысының күздік дәнді бидай өсіретін аудандарында ауаның минималды температурасы минус 1...7°C, күздік бидайдың түптену түйіні тереңдігінің минималды температура минус 1°C болған. Жауын-шашын көбінесе орташа көпжылдық мәндерге жуық және одан да көп болған 19-41 мм (нормадан 86-158%).

Жамбыл және Түркістан облыстарында ауа температурасының жоғарылауына байланысты қар жамылғысы мен топырақтың қатуы байқалмаған.

Қыстайтын дақылдардың (күздік бидай) қысқа төзімділігін анықтау нәтижелері бойынша 20 қаңтардағы жағдай бойынша Алматы облысында үсікке

шалдыққан өсімдіктердің пайызы 4-18%, Жамбыл облысында 3-20% және Батыс Қазақстан облысында 4-12% құраған.

Республиканың оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында орын алған агрометеорологиялық жағдайлар қанағаттанарлық болған, алайда күндізгі ауаның оң температурасы түнгі теріс ауа температурасымен ауысқан кезде оңтүстікте жиі жылымықтың болуы (4 күнге дейін) әлсіз дамыған өсімдіктерге зиян келтіруі мүмкін.

Онкүндіктің соңғы күні жайылымдарының басым бөлігінде мал жайылған, Ақтөбе облысының Алға ауданында, Батыс Қазақстан облысының Сырым, Жәнібек аудандарында, сондай-ақ Қостанай облысының Арқалық ауданында малдарды қораларда ұстау жалғасуда, Жетісу облысының Қаратал ауданында, Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданында мал өсірушілер мал басын азықтандыруда.

Қатқақ шым Алматы, Батыс Қазақстан, Қостанай облыстарының жайылымдарда, сондай-ақ Қарағанды, Маңғыстау облыстарының жеке жайылымдарында байқалады, дымқыл шым Ақтөбе, Батыс Қазақстан және Ұлытау облыстарының жайылымдарында байқалған.

Онкүндіктің соңында Ақтөбе облысының басым бөлігінде жайылымдар нашар тапталған, Маңғыстау, Алматы, Қостанай облыстарының жеке жайылымдарының бірқалыпты тапталған, Батыс Қазақстан облысының басым бөлігінде және Қарағанды облысының жеке жайылымдары қатты тапталған.